

Nº 57


BIBLIOTHEK

S. W. Schaufuss.

@

QL573

G78



New York  
State College of Agriculture  
At Cornell University  
Ithaca, N. Y.

Library

QL 573.G78

**Monographia coleopterorum micropterorum**



3 1924 018 337 836

est


## DATE DUE

~~MAY 02 1990~~

## RETURN TO

ENTOMOLOGY LIBRARY  
Cornell University

Cornell University  
Ithaca, N. Y.





MONOGRAPHIA  
COLEOPTERORVM  
MICROPTERORVM

AVCTORE

I. L. C. GRAVENHORST  
DOCTORE PHILOSOPHIAE IN ACADEMIA  
GEORGIA AVGVSTA GOTTINGENSI.

---

GOTTINGAE

TYPIS HENRICI DIETERICH.


1806.

@  
QL573  
G78

@46343

Wey 20 July 1857

A V C T O R.





---

## P R A E F A T I O.

Quod iam anno 1802. edidi *Systema Coleopterorum Micropterorum* artificiale naturali quidem, quatenus fieri poterat, adaequare tentabam; saepius autem exceptiones obstabant mihi probantes, naturam vincula systematis artificialis haud tolerare, et inuito me eogebat, speciem quamdam a reliquis conspeciebus, quibus natura eam associauerat, remouere, iubente forsan caractere singulo, quem, secundum rugulas systematis artificialis, ad hoc genus distinguendum et designandum adoptaueram. Hac inconuenientia motus, systemati illi artificiali naturale iuxtapponam, quo quisque nexum naturalem inter genera et species Coleopterorum Micropterorum perspiciat.

Quanto diligentius autem leges studeo, quibus natura in formandis corporibus organicis agit, tanto euidentius mihi patet, naturam forsan nullum genus, in sensu hodierno, agnoscere. Multa genera, quae, quamdiu paucae tantummodo species eorum existerent, ipso toto caractere externo seu habitu naturali

rali vulgo sic dicto longe inuicem remota erant, serius, simulac plures species proferebantur, magis magisque appropinquabantur, donec tandem confinia eorum vix dum designari poterant, nec nisi vnico forsan caractere distinctiuo, quo totus character externus minime exprimebatur, genera ista distinguebantur; nunc autem, regulis systematis naturalis sublatis, systema artificiale locum eius occupabat. Haec experientia in Coleopterorum Micropterorum systemate quoque mihi se obtulit: E generibus receptis *Stenus* solummodo, *Oxyporus*, *Piestus* et *Lomechusa* finibus adhuc satis praecisis contenti sunt ita vt primo statim intuitu, e habitu naturali externo, definiri possint. Reliqua autem genera omnia, immediate vel mediate, vnum per alterum, inter se cohaerent, et quaedam eorum adeo in alia Coleopterorum genera, a systemate Micropterorum exclusa, transeunt. Tabula affinitatum, opusculo huic adnexa, magis reddet perspicuum quod dixi, quodque in ipso textu, scilicet in generis cuiusque praemis, clarius exponam; vbi characteres etiam explicabo, quibus haec genera artificialiter seiungi atque distingui possunt; genera enim requisitum sunt necessarium in systemate corporum naturalium. — Redeo iterum ad  
*Stenum,*

*Stenum*, *Oxyporum*, *Piestum* et *Lomechusam*: Vidimus, haec genera, collatione cum reliquis, paucas tantum species comprehendere; et, ex analogia, credo, me haud errare, si coniicio, illa genera, specierum numero crescente, generibus quoque aliis, a quibus adhuc satis distant, adpropinquatum iri, donec tandem cum his confluent nec nisi forsan vnico quodam caractere distinguenda erint.

Generum dispositioni et definitioni, in hoc opusculo commutatis et, vti spero, emendatis, plurium specierum diagnoses, descriptiones, comparationes et synonyma emendatas et auctas, nec non species multas novas, quarum numerus valde increuit, addidi.

Praecipue hic etiam illarum mentionem facio specierum, ad quas collectionem *Boscianam* allegavi; scimus enim, *Fabricium*, in scriptis suis entomologicis, hanc collectionem saepius citauisse, et *Boscius* ipse professus est, *Fabricium* ipsum species plurimas illius collectionis vel denominauisse vel iam denominatas probauisse. Vbi ergo coleopteron quoddam, etiam a *Fabricio* iam descriptum, e collectione *Bosciana* citatum est, Entomologis persuasum esse potest, me insectum illud ipsum descripsisse, quod etiam *Fabricius* ante oculos habuit.

Iter,

Iter, per Galliae et Germaniae partem institutum, praecipue autem commoratio Parisiis diuturnior, opportunitatem mihi praebuerunt, multa noua, ad historiam naturalem spectantia, inuestigandi; et beneuolentiae Entomologorum plurium Parisiensium erga me, Entomologorum iam diu celebratorum, e quibus *Bosc, Olivier, Brongniart, Latreille, Desmarest* hic nominare mihi liceat, cum aditum liberum ad collectiones priuatas Insectorum egregias quam humanissime sponte mihi offerrent, Entomologiae sectatores descriptiones multarum nouarum Micropteroꝝ specierum debent. — Redux in patriam multis nouis animalium speciebus auctas inueniebam collectiones Zoologicas Comit<sup>is</sup> *de Hoffmannsegg* et Dom. Professoris *Hellwig*, nunc in vn<sup>am</sup> coniunctas collectionem eamque vn<sup>icam</sup> sui generis, quae forsan omnes aemulas, tam numero specierum insectorum quam ordine systematico et exactitudine in tribuendis nominibus generalibus specialibusque, antecellit. Scimus omnes, Comitem illustrissimum, itineribus, per maximam Europae partem, cognitionis naturae causa, institutis celebrem, studio indefatigabili et temporis atque opum impensis optime de cultura totius historiae naturalis meruisse; hic etiam libellus entomologicus



gicus debet ei quasdam species nouas et elegantes, imprimis e numero micropterorum exoticorum.

Præcipue autem in collectione Dom. Professoris *Knoch*, fautoris mei aestumatissimi, qui prae aliis systema huius coleopterorum familiae, studiis et scrutationibus summis elaborauit, materiem plurimam huius Micropterorum Monographiae inueni; et magna multitudo specierum nouarum, quae, post editionem tentaminis mei primi systematis Micropterorum, in solo ducatu Brunsvicensi, temporis adeo breuis lapsu, repertae sunt, probat sane, quantopere cultura historiae naturalis horum animalculorum alibi adhuc neglecta sit; haud enim me hercule verisimile est, solum brunsvicense prae caeteris prouinciis multitudine adeo stupenda micropterorum frequentatum esse. Quare omnes scrutatores entomologiae et insectolegas haud satis urgere possum, ne his quoque insectis attentionem suam recusent; respondeo, eos pro labore et studiis impensis premium exoptatum laturos esse. Haud quidem negari potest, quod etiam e hoc opusculo satis perspicue patet, nullum forsan coleopterorum genus tantis obnoxium esse difficultatibus, nullumque scrutationem desiderare profundiore quam haec coleopterorum

rorum familia; huiusmodi vero difficultates ipsae potius calcar esse debent, quo Entomologus verus, cui perfectio scientiae cordi est, incitetur, quam frenum, quo retineatur ab inuestigatione intima horum insectorum, nam “per aspera ad astra” tendimus. Non nisi viribus iunctis spes nos arridet eo perueniendi quo in his etiam coleopterorum generibus aequilibrium cum reliquis restitui possit.

Hac occasione non possum non diligentiae et zelo Domini *Dahl*, vnius expertissimorum et felicissimorum e nostris infectolegis, publice meritas agere gratias. Frequentibus et saepe laboriosis excursionibus per prata sylvas et montes Ducatus Brunsvicensis non solum, tam in reliquis quam etiam et praecipue in his insectorum generibus, magnam vim novarum specierum, quibus imprimis collectiones Knochianae, Hoffmannseggio-Hellwigianae et mea propria insigniter locupletatae sunt, apprehendit, sed etiam omnia, quae de vitae modo horum insectorum observare poterat, exactissime annotavit; hasque annotationes mecum communicavit. Cum vero haec insecta, quotquot eorum Dom. *Dahl* possidet, curis Dom. Prof. *Knoch* accuratissime examinata et nominata sint, Entomologi, qui eum adirent, hac via species exactissime determinatas sibi procurare

curare possent. E propria experientia ego affirmare possum, Dominum *Dahl* in his negotiis maxima affabilitate et fide agere.

Denique etiam Domino *Sturm* Norimbergae, qui mecum Coleoptera Microptera sua beneuole communicauit, gratias hic habeo publicas. Debemus ei plures nouas species et varietates.

\*

\*

Scripta autorum, quibus, praeter illa in *Monographia Micropteriorum Brunsvicensium* pag. XXI. recensita, in hac *Monographia* usus sum, haec sunt;

1. *Fabr. Eleuth.*

*Ioh. Christ. Fabricii* etc. *Systema Eleutheratorum* etc. Tomus II. Kiliae 1801. 8. (*Staphylinus* p. 589. *Stenus* p. 602. *Oxyporus* p. 604. *Paederus* p. 608).

2. *Herbst Nat. d. K.*

*Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten von Carl Gustav Jablonsky, fortgesetzt von Ioh. Friedr. Wilh. Herbst, — Die Käfer* Th. 1-9. Berlin, 1785 — 1801. 8.

3. *Ljungh. St.*

*Monographia Stenorum*, auctore *Suenone Ingemaro Ljungh*, in *Archiv für die systematische Naturgeschichte*, herausgegeben von Dr. Friedr. Weber und Dr. D. M. H. Mohr. B. I. St. 1, Leipzig 1804. 8. (pag. 59).

4. *M.*

*Coleoptera Microptera Brunsvicensia nec non Exoticorum* quotquot exstant in collectionibus Entomologorum Brunsvicensium, in genera familias et species

species distribuit Dr. I. L. C. Gravenhorst, Brun-  
swigae, 1802. 8.

5. Panzer ad Schaefferum.

*Systematische Nomenclatur über Herrn Dr. Jacob  
Christian Schäffers Abbildungen regensburgischer  
Insekten, von Dr. Georg Wolfgang Franz Pan-  
zer, Erlangen, 1804. 4.*

6. Schaeffer Inf. Ratisb.

D. Jacobi Christiani Schaefferi Icones Insectorum  
circa Ratisbonam indigenorum etc, Vol. I-III.,  
Regensburg 1766. 4.

\*

\*

Priusquam ad Systema ipsum transeo hic  
*Adnotationes quasdam ad Prolegomena Mo-  
nographiae Micropteriorum de anno 1802,*  
(vide n. 4.) praemitto.

Ad p. XV. partem inferiorem.

Forma et proportio partium oris haud  
obsolete et semper inuariabilis sunt. Quod  
ad formam, observavi, palporum articulum  
ultimum *Astrapaei* (nunc *Staphylini Vlmi*)  
triangularem magis minusue contrahi et arti-  
culo ultimo ovato palporum *Staphylinorum*  
familiae primae (nunc quintae) similem fieri.  
Proportio mandibularum et palporum in spe-  
ciebus quibusdam *Oxytelorum* et *Staphyli-  
norum* variat (e. g. in *O. picei* et *carinati*, *St.  
castanopteri* et *erythropteri* individuis).

Ad p. XIX. part. sup.

Quamquam series punctorum thoracis *Sta-  
phylinis* familiae tertiae (nunc primae), ra-  
tione



tionem numeri punctorum constantissimae esse solent, species attamen quaedam sunt incertae aut spuriae vel intermediae, quibus puncta ista mutabiliora sunt, vti observationes continuatae crebriores et recentiores me docuerunt (e. g. varietates spuriae *St. varians atrati* etc.). In familia quarta autem (nunc secunda) numerus punctorum, numerum senarium excedens, inconstantior est (e. g. in *St. ochraceo, elongato*).

Ad p. XIX. part. inf.

Diagnosis allegata *Oxyteli caelati* eo commutanda est: "*O. caelatus* foveis duabus dorsalis" (nam foveae laterales prorsum fere evanescent et omnibus *Oxytelis* eadem sunt) "arcuatis, thorace transverso." Plurimi enim reliqui *Oxyteli* numero vel forma fovearum thoracis distinguuntur.

Ad p. XXV. part. sup.

Corpus brevissimum et globuliforme est *Tachyporo granulum*, speciei novae.

Ad p. XXX. part. med.

*Staphylinus stenoides*, nova species, habitu valde singulari, ad tertiam attamen (nunc primam) familiam *Staphylinorum* referenda, caput habet ubique punctis crassioribus impressum, *Stenorum* capiti simile, cum omnibus reliquis huius familiae *Staphylinis* caput  
medio

medio laeuiffimum, lateribus tantummodo punctum fit.

Ad p. XXXI. part. inf.

*Oculi Staphylini stenoidis* oculis micropterorum, de quibus nomen ducit, fimiles profilientes magni funt, reliquis Staphylinis autem planiores.

Ad p. XXXIII. part. med.

*Articuli medii antennarum* vel funt campanulati, vel pateraeformes, vel latere interiore subincuruo-elongati; ex his *antennae ferratae* constructae folo *Staph. dilatato* inter omnes Micropterorum fpecies propriae funt.

Ad p. XXXV. part. inf.

*Staphylinus dilatatus* antennis ferratis ab omnibus Micropteris diftinctus, articulo vltimo antennarum haud parabolice obtufo, fed ouato, a reliquis huius familiae Staphylinis maioribus differt.

Ad p. XXXVIII. part. inf.

*Calliceri mandibulae* eadem funt forma vt in reliquis Aleocharis.

Ad p. XL.

*Palpi anteriores Stenis folis triarticulati* effe videntur; omnibus reliquis Micropteris quadriarticulati. *Articulus vltimus* quibusdam *subuliformis* interdum ab articulo penultimo valido recipitur, plurimis attamen Micropteris

Micropteris semper exsertus est. Nunquam ego hunc articulum in *Paederis* deprehenderam, quo inductus ut crederem, Paederos hoc articulo carere, characterem praecipuum distinctiuum generis de absentia eius desumebam. Tandem autem in collectione *Latreilleana* Parisiis, inter multa alia huius generis specimina, vnicum videbam *Paederi orbiculati* indiuiduum articulo quarto palporum anteriorum subuliformi exserto; et nunc me convictum confiteor, *Paederos* quoque *palpis anterioribus quadriarticulatis, articulo ultimo subuliformi*, instructos esse. Persingulare autem et notatu dignum est, Microptera huius generis articulum vltimum palporum anteriorum semper fere in penultimum abscondere, quod nunquam in reliquis Micropteris, quorum palpi acuminati sunt, obseruatur.

*Proportio palporum*, ratione longitudinis et crassitie, haud semper eadem est. Longissimi sunt et graciles *Stenis* et *Staphylino stenoidi*, nec non *Aleocharis* quibusdam (e. g. *Al. excusae*, speciei nouae). *Staphylinis familiae primae* (nunc *quintae*) nec non *Staph. Vlmi* et *tenui* e familia tertia (nunc prima) crassiores quam reliquis Staphylinis. *Euaestheto*, generi nouo, longi et clauati.

Ad p. XLIV. part. sup.

Loco *canaliculae marginalis Staphylino dilatato* puncta minuta impressa sunt.

Ad p. XLV. part. inf.

*Thorax conicus* i. e. basi latus, apicem versus valde angustatus, inter omnia Microptera soli *St. fulgenti* proprius est.

Ad p. XLVI. part. med.

De *seriebus punctorum thoracis* supra in adnotatione ad p. XIX. quaedam iam monui.

Ad p. XLVII. part. med.

*Staphylino stenoidi* thorax est in angulis apicis multipunctus, praeterea punctis quibusdam sparsis maioribus impressus, seriebus autem dorsalibus sexpunctis.

Ad p. LVII. part. med.

*Oxytelis* minoribus tibiae sunt multo graciliores et minus spinosae quam maioribus, tibiis attamen Aleochararum semper validiores.

Ad p. LIX. part. inf.

*Vnguis*, seu quintus tarforum articulus, cum apice articuli quarti cohaerere solet; *Pinophilo* (nunc *Lathrobio latipede*) autem basi articuli quarti insertus est.

---



---

## GENVS I.

### TACHYPORVS.

Sub hoc genus nunc comprehenduntur illa Col. Microptera, quae olim in fam. II. Tachypororum et fam. I. Tachinorum segregaueram. Licet enim palpis differant, itaque, secundum regulas systematis strenue artificialis discernenda esse videantur, habitu attamen toto communis inter se congruunt et a reliquis cogenerebus differunt, quam quod combinationem eorum suscipere non auderem — *Corpus* conuexum nitidum laeue; *caput* retractum; *thorax* convexus transversus; *coleoptra* connexa, abdominis magnam partem tegentia; omnes hae partes trunci, arctius cohaerentes, praebent, vel omnes vel partim coniunctae, characteres, quibus natura hoc genus a reliquis distinxit.

### FAMILIA I.

*Corpus* globosum.

*Caput* retractum, longitudine triplo fere latius. Ore producto; palpis anticis acuminatis, articulo ultimo minutissimo. Antennae capite thoraceque longioribus; arti-

A

culo

culo 1 crassissimo, 2 paulo minore, ambo-  
bus autem multo crassioribus quam reli-  
qui, 3-7 gracilibus, vix sensim crescenti-  
bus, 8-11 crassioribus, ultimo ouato acuto.

*Thorax* conuexus, longitudine quadruplo fere  
latior, apicem versus paulo angustatus.

*Coleoptra* conuexa, lateribus rotundata, tho-  
race latiora et duplo longiora; elytris qua-  
dratis.

*Abdomen* breue, acutum, sub coleoptera om-  
nino fere retractum.

Haec familia vnam modo speciem continet,  
quae quidem transitum ad *Scaphidia* ostendit,  
sed nullo modo cum eis confundi potest.  
Corpus globosiusculum conuexum, partibus  
trunci arctius cohaerentibus, et coleoptra ab-  
dominis maximam partem tegentia *Tachypo-*  
*ris* huius familiae cum *Scaphidiis* quidem com-  
munia sunt; his vero elytra sunt apicem ver-  
sus sensim angustata, apice ipso obtuso nec  
truncato. Elytra autem truncata sunt omnium  
*Microptero*rum character communis. Praeter-  
ea autem *scaphidiis* sunt palpi filiformes, *Ta-*  
*chyporis* huius familiae autem acuminati.

A *Tachyporis* familiae sequentis haec fa-  
milia corpore magis sphaeroideo et, quod inde  
sequitur, capite thorace coleoptrisque multo  
latioribus differt.

1. *T. granulum*, nitidus, niger; coleoptris interdum fuscis seu fusco-castaneis;

Long.  $\frac{1}{3}$  —  $\frac{2}{3}$  lin.

Caput antennis fuscis.

Thorax marginibus lateralibus interdum subpallescentibus.

Habitat, tempore verno et aestiuo, sub foliis deciduis et sub muscis ad radices arborum, haud frequens.

## FAMILIA II.

Complectitur omnia illa Microptera, quae olim familiam II. Tachypororum constituebant. Corpus eis est nitidum conuexum, quamuis non globosum, ut in fam. I, et partes corporis angustiores sunt; thorax transversus. A familiae tertiae speciebus haec familia, statura minore, nitore splendidior, coloribus plerumque viuidioribus, thorace convexiore, elytris glaberrimis, palpis semper acuminatis, qui illis filiformes sunt, praecipue differt. Habitant etiam rarius et, ut videtur, cum oua pariunt, in simo.

Sunt quaedam *Aleocharae* e familia IV, e.g. *Al. palpalis* et *minuta*, quae facilius pro Tachyporis huius familiae, *Tachyporo pediculario* affinis, haberi possunt; sed thorax harum Aleochararum apicem versus gibbulosior

est, basi autem minus arcte cum coleoptriis cohaeret, angulis baseos scilicet magis rotundatis; abdomen Aleochararum haud setis adeo rigidis ut in *Tachyporis* vestitum est; palpi autem et labrum in *Aleocharis* allegatis longiores sunt. —

*Tibiae spinosae* in maioribus quidem *Tachyporis* distinctae sunt; in minoribus autem spinae sensim sensimque se subducunt, et tibiae interdum setis singulis tenuibus vestitae sunt, quod etiam in *Aleocharis* maioribus observamus.

2. *T. pedicularius*, (M. p. 133.), nitidus, obscuro-fuscus, subgriseo-sericans; ore, antennis, pedibusque testaceis.

Long.  $\frac{3}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  l.

*Caput* nitidissimum, nigrum. Antennis, capituli thoracisque longitudine, extrorsum crassioribus.

*Thorax*, magnitudine coleoptrorum, transversus, apicem versus angustatus, conexus, nitidus, nigro-fuscus, sub-griseo-sericans; margine summo baseos magis minusue diaphano testaceo.

*Abdomen* pilosellum; pilis apicem versus crebrioribus et rigidioribus; nigro-fuscum, nitidum, sub-griseo-sericans; marginibus segmentorum diaphano-subtestaceis.

Habi-

Habitat Brunsvigae, sub gramine.

3. *T. truncatellus* brevis, crassus, nitidus, rufotestaceus; oculis abdomineque obscurioribus.

Long. vix. 1 lin.

Caput obscuro-rufum; palpis antennisque pallidioribus; oculis fuscis.

Thorax et coleoptra rufa, pilis tenuissimis subgriseo-sericantibus vestita.

Abdomen pilosum, fuscum, marginibus segmentorum pallidioribus.

Ratione nitoris subsericantis et staturae *T. pediculario* affinis est. Cum *T. nitidulo* haud confundi potest, ob staturam crassiorem atque conuexiorem et nitorem subsericantem; quibus characteribus etiam, praeter paruitatem, a varietatibus pallidis *T. analis* differt.

Habitat Brunsvigae, locis arundinosis.

*T. truncatellus* Knoch.

4. *T. bipunctatus* M. p. 133.

5. *T. binotatus* M. p. 132.

6. *T. binaulatus* M. p. 132. *T. bipustulatus*.

7. *T. cellaris* M. p. 131.

*Staphylinus* 20 Geoffr. Hist. St. *maculatus* Fourcr. Ent. Par. n. 20. a *T. cellari* non nisi colore nigro, qui in hoc obscuro-fuscus esse solet, differre videtur.

8. *T. pubescens* M. p. 130.

Var.



*Var. fusca*, sericans; antennis pedibus elytrisque rufis. — Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

*Var. corpore nigricante*; antennis fuscis articulis 2 primis et 2 ultimis rufis. — Habitat Norimbergae — *Sturm*.

*Var. statura paulo latiore*, long. 2 lin. coleoptris castaneo-rufescentibus. — Habitat Parisiis — *Bosc*.

9. *T. crassus* M. p. 190.

10. *T. analis* M. p. 129.

11. *T. saginatus* nitidus niger; palpis, antennis, thorace, elytris, pedibusque rufis seu obscuro-castaneis.

Long. 2 lin.

*Caput* nigerrimum, nitidissimum, palpis et antennis rufis seu obscuro-castaneis.

*Thorax* testaceo-rufus seu obscuro castaneus, nitidissimus, leuissimus.

*Coleoptra* rufo-castanea, basi et lateribus interdum paulo obscuriora.

*Scutellum* nigrum.

*Abdomen* nigrum; segmentorum marginibus dorso pallidioribus.

Habitat Brunsvigae — *Knoch*.

Notitiam hic addo Dom. Prof. *Knochii*, cui huius speciei individua duo debeo: "*T. saginatus* primo intuitu *T. chrysomelinus* bene sagi-

saginata esse posset, sed magnitudo eius insignior, antennae crassiores, habitatio constanter hanc speciem distinguunt."

12. *T. chrysomelinus* M. p. 128.

Hunc *Tachyporum* Paykull cum *T. anali* copula iunctum vidit — Payk. Mon. St. p. 79.

*Tachyporum* teneo, medium tenentem inter *T. analem* et *chrysomelinum*. Statura nec non partium forma ac proportionem ambobus similis est; colore autem testaceo, oculis, elytrorum basi, abdomine pectoreque nigris. Caput ergo testaceum, oculis nigris, a *T. anali*; abdominis pectoris et baseos elytrorum colorem nigrum a *T. chrysomelino* habet. — Hic forsitan e copula illorum ortus est.

*Tachyporus* alter collectionis meae, huic omnino similis, totus autem testaceus, oculis solummodo nigris, varietas iunior vnius alterius esse videtur. — Conf. *St. dispar* Payk. Mon. St. n. LIV. var. ε, rufoscaurus, capite nigro.

13. *T. marginatus* M. p. 127.

*St. dispar* Payk. var. ♂.

*Oxyporus dimidiatus* Fb. El. p. 607.?

14. *T. lateralis* M. p. 127.

15. *T. abdominalis* M. p. 127.

16. *T. ruficollis* M. p. 128.

Variat

Variat coleoptris totis nigris; coleoptris nigris, margine summo apicis diaphano-testiaceo; coleoptris rufo-fuscescentibus, margine laterali et apicali, interdum etiam praeterea macula discoidali, nigricantibus, statura reliquis paulo minore. Dom. Prof. *Knoch* hanc varietatem pro specie peculiari declarat, cui atamen haud assentire possum.

*Dahl* huius specimina plura legit Brunsvigae, ad radices salicum, tempore autumnali.

17. *T. transversalis*, nitidus niger; thorace, (apice elytrorum) pedibus, antennis et ore testaceis.

*Long.*  $1\frac{1}{4}$  l.

*Caput* nigrum. Antennis, capitis thoracisque longitudine, rufo-fuscis; ore rufo-testaceo, palpis anticis obscurioribus.

*Thorax* rufo-testaceus, margine apicis et baseos nigricante.

*Coleoptra* quadrata; vel nigra, apice obsolete diaphano-testacea; vel seminigra semitestacea

*Abdomen* pilosellum, nigrum, marginibus segmentorum pallidis.

*Pedes* testacei.

Statura gracilis *T. nitiduli*. A. *T. pusillo* colore et statura paulo graciliore, a *T. ruficollis* statura multo graciliore differt.

Habitat

Habitat Brunsvigae, sub foliis deciduis, locis  
vmbrosis — *Dahl*.

*T. transuersalis* Knoch.

18. *T. pusillus* nitidus, niger; coleoptris fuscis;  
basi antennarum, thoracislateribus, pedibusque  
pallidioribus.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* nigrum. *Antennis*, longitudine ca-  
pitis thoracisque, fuscis; articulis 2 primis rufis.  
*Palpis* anticis fuscis, basi pallidioribus.

*Thorax* longitudine duplo fere latior, api-  
cem versus angustior; niger; lateribus, impri-  
mis basin versus, diaphano-subtestaceis.

*Coleoptra* quadrata, fusca, margine laterali  
paulo obscuriore; vel (in varietate huius spe-  
ciei minore, quam Dom. *Sturm* mecum com-  
municavit; long: 1 l.) nigricantia, apice sub-  
diaphano-testacea.

*Abdomen* coleoptris duplo longius, apicem  
versus angustatum, pilosellum, nigrum.

*Pedes* piceo-testacei, capitibus femorum  
obscurioribus.

Statura huius *Tachypori* paulo crassior est  
quam in *T. nitidulo* et *transuersali*, paulo  
autem gracilior quam in reliquis cospeciebus.  
Praeterea etiam elytrorum punctura subtilis-  
sima minus distincta et colore a *T. nitidulo*  
differt.

Habitat

Habitat Brunsvigae, lectus in muscis ad quercuum truncos — *Dahl*.

*T. pusillus* — *Knoch*.

19. *T. capillaricornis* antennis gracilibus, filiformibus, ciliatis; nitidus, nigro-fuscus, labio et pedibus pallidioribus.

*Statura* crassiuscula.

*Long.* 1 lin.

*Caput* nitidissimum, thorace triplo minus, nigro-fuscum, labio testaceo; antennis, capitis thoracisque longitudine, gracilibus, articulis duobus primis crassioribus clauatis, reliquis elongato-ouatis aequalibus, setis duabus vel tribus lateralibus, in ultimo articulo etiam apicalibus, in articulo primo et secundo longioribus, vestitis.

*Thorax* longitudine latior, nigro-fuscus, punctis 2 ante marginem lateralem, quorum alterum in angulo apicis alterum in angulo baseos positum est, punctisque 2 dorsalibus ante marginem apicalem, impressus.

*Coleoptra* quadrata, leuia, punctis attamen 4 vel 5 obsoletissimis, in seriem longitudinalem disci dispositis, impressa.

*Abdomen* coleoptris duplo longius, nigro-fuscum, ano pallidiore.

*Pedes* picci.

Habitat



Habitat Brunsvigae, haud frequens — Dom. Dahl eum mecum communicavit.

*T. capillaricornis* — Knoch.

20. *T. nitidulus* M. p. 126. nitidus, rufescens; oculis, abdomineque fuscis; pedibus testaceis.

Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Coleoptra* subtilissime puncta, plerumque planiuscula, interdum vero etiam subconvexiuscula.

Statura paulo minore et graciliore quam *T. pusillus*.

In collectione *Bosciana*, Parisiis, vidi huius Tachypori varietatem pallide testaceam, oculis nigris, longitudine 1 lin. sub nomine *Oxyporus testaceus* Fabr. quem in M. p. 142. ad *T. corticinum* citavi.

*Specimina intermedia*, inter *T. nitidulum* et *pusillum*, ratione magnitudinis, staturae et coloris, medium inter illos tenent.

Long. 1 —  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* nigrum; palpis et antennis testaceo-vel fusco-rufescentibus.

*Thorax* fuscus seu rufescens, marginibus lateralibus autem semper pallidioribus.

*Coleoptra* quadrata, rufa, vel rufo-fusca, margine laterali obscuriore.

*Abdomen* nigrum, marginibus segmentorum pallidioribus.

Varia-

Varietates minores pallidiores sunt et *T. nitidulo* propiores; maiores autem obscuriores et *T. pusillo* propiores.

*Oxyporus Hypnorum* Fbr. El. p. 607. n. 22.

*Tachypus nitidulus* M. p. 126.

Habitat in quisquiliis, tempore verno.

21. *T. limbatus* niger, nitidus; pedibus pallidioribus; thoracis marginibus omnibus, elytrorum margine laterali et apicali flavis.

Long.  $1\frac{2}{3}$  lin.

Caput nigrum; antennarum articulo primo testaceo.

Thorax marginibus omnibus, apicali autem obsolete, lateralibus distinctissime, flavis.

Colcoptra limbo laterali et apicali flavo, margine attamen laterali summo ipso nigro.

Pedes fuscii; capitibus femorum obscurioribus.

Habitat Parisiis — e collectione *Latreilleana*, ubi specimen tantummodo unicum exstabat.

Habitu, partiumque forma ac proportione, nec non corpore subtilissime et confertissime obsolete puncto *T. suturali* (M. p. 144.) affinis; differt autem palpis acuminatis.

### FAMILIA III.

Hi *Tachypori*, olim *Tachini* familiae I. thorace transverso, palpis filiformibus etc. a familia

milia praecedente, cuius characteres distinctiui conferendi sunt, satis differunt. A *Tachinis*, statura latiore, thorace transverso, haud punctis maioribus dorsalibus impresso, elytris laevibus, distinguuntur.

22. *T. suturalis* M. p. 144.

Hic *Tachyporus* habitat etiam Parisiis; vidi eum in collectionibus Latreilleana et Bosciana, ubi *Oxyporo suturali*, in Panzeri Fauna exhibito, similis est.

23. *T. marginalis* M. p. 192.

24. *T. collaris* M. 143.

25. *T. immaturus* M. 142.

Sub nomine *Oxyporus brunneus* Fabr. quem ego ad hunc *Tachyporum* allegavi, in collectione Bosciana *T. marginatum* vidi.

26. *T. corticinus* M. p. 141.

27. *T. marginellus* M. 143. nitidus, niger; antennarum basi, thoracis margine laterali, coleopterorum margine laterali et apicali, pedibusque testaceis.

Long.  $1\frac{2}{3}$  lin.

Caput nigrum; palpis et antennis fusciscentibus; his, capitis thoracisque longitudine, basi rufo-testaceis.

Thorax niger, margine laterali testaceo; margine quoque baseos summo pallidiore.

Cole-

*Coleoptra* latitudine longiora, nigra; margine apicali et striga laterali, ab humero usque ad marginem apicalem, cum quo confluit, deducta, testaceis.

*Abdomen* nigrum.

*Pedes* piceo testacei.

Confer species 2 sequentes.

28. *T. sinetarius* M. p. 141. nitidus, niger; humero et margine apicali coleoptrorum, pedibusque rufo-testaceis.

*Long.* 2 —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* nigrum; antennis et palpis nigrofuscis.

*Thorax* longitudine multo latior, niger, summis marginibus lateralibus plerumque obsolete fuscescentibus.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, nigra; macula humerali et margine apicali distincte rufo-testaceis.

*Abdomen* nigrum.

*Pedes* rufo-fusci; femoribus posticis obscurioribus.

Statura *T. marginelli* (n. 26.), differt autem thoracis lateribus paulo rotundioribus et colore.

Habitat Brunsvigae, sub gramine in pratis, tempore aestivo — *Dahl*.

*Variat* rarius elytrorum humero et margine apicali obsolete rufescentibus.

*T. ca-*

*T. castaneus* M. 140. varietas est *T. fimetarii*, coleoptris fuscescentibus, humero attamen et apice semper paulo pallidioribus.

*T. sordidus* M. p. 141. varietas huius *Tachypori* esse videtur.

29. *T. laticollis* M. p. 141. nitidus niger; coleoptris fuscis; pedibus et antennarum basi pallidioribus.

*Long.*  $1\frac{3}{4}$  l.

*Caput* nigrum; palpis fuscis. Antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscescentibus; articulis 2 primis pallidioribus.

*Thorax* longitudine duplo latior, niger; marginibus lateralibus obsolete pallidioribus.

*Coleoptra* quadrata, nigro-fusca, humeris et apice pallidiora.

*Abdomen* nigrum, segmentorum marginibus fuscis.

*Pedes* rufo-fusci.

Hic *Tachyporus* latitudine a conspeciebus minoribus huius familiae differt.

*Species intermedia* inter *T. laticollem* et *fimetarium* est *T. niger* nitidus; pedibus et coleoptris nigro-fuscis; humero apiceque elytrorum subpallidioribus; tarsis pallidioribus; thorace lato *T. laticollis*; coleoptris autem latitudine longioribus *T. fimetarii*.

Huius



Huius speciei intermediae individua quaedam prehendebantur in fruticibus prope Brunsvigam — *Dahl*.

*T. niger*, nitidus, thoracis et coleoptrorum marginibus lateralibus, nec non coleoptrorum margine apicali, pedibusque testaceis.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* nigrum. Antennis obscuro-fuscis, articulo primo interdum paulo pallidiore.

*Thorax* niger, marginibus lateralibus testaceis, qui color autem distinctior est quam in *T. funetario*, minus autem distinctus quam in *T. marginello*.

*Coleoptra* nigra seu nigro-fusca; striga laterali, ab apice humerorum versus marginem testaceum apicalem, quem tamen haud attingit, deducta.

*Abdomen* nigrum.

*Pedes* rufo-testacei, femoribus posticis paulo obscurioribus.

E descriptione huius *Tachypori* adparet, eum medium tenere inter *T. funetarium* et *marginellum*; at utroque est minor.

30. *T. pullus* M. p. 140.

Hunc *Tachyporum* *Sturm* mecum communicavit sub nomine *Oxyporus rufipes* *Fabr.* et *Panzeri*, cum quo etiam congruere videtur.

*Ox.*

*Ox. rufipes* Fabr. Ent. S. O. n. 21.

— — — Panzer Fn. G. H. 27. t. 20.

31. *T. memnonius* M. p. 192.

32. *T. signatus* M. p. 139.

*Caput* nigrum, palpis et antennis fuscis;  
articulo harum primo rufo-testaceo.

*Coleoptra* nigra seu nigro-fusca, margini-  
bus summis laterum et apicis pallidioribus.

*Pedes* fusci seu rufo-testacei.

33. *T. bicolor* nitidus niger; macula thoracis  
lateralis rufa; elytris rufis, marginibus nigris.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lin.

Habitu partiumque forma ac proportionem

*T. rufipedis* (n. 35).

*Caput* nigrum; palpis et antennis fusces-  
centibus, harum articulo primo pallidiore.

*Thorax* niger, macula marginali rufa vel  
margine laterali basin versus latissime rufo.

*Coleoptra* rectangula, ochraceo-rufa, mar-  
gine suturali apicali et laterali nigro.

*Abdomen* nigrum, ano pallidiore.

*Pedes* rufo-fusci vel fusci, femoribus ob-  
scurioribus.

E collectione Brongniartiana et Latreilleana.

34. *T. fimbriatus* M. p. 191.

35. *T. rufipes* M. p. 137. niger, nitidus; cole-  
optris pedibusque fuscescentibus seu castaneis.

B

*Long.*

*Long.* 2 —  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, palpisque fuscis seu fuscescentibus; articulo primo antennarum interdum reliquis obscuriore, interdum pallidiore, apice attamen semper fusco.

*Thorax* niger, summis marginibus lateralibus basin versus subfuscescentibus; transversus, nec vero longitudine duplo latior, sed angustior quam in *T. humerali* (n. 36.).

*Coleoptra* latitudine paulo longiora; elytris vel castaneis seu fuscescentibus, vel disco obscuriore.

*Abdomen* nigrum; segmentorum marginibus interdum fuscis.

*Pedes* rufi, seu castanei, seu fusci.

Varietates, coleoptris obscuris, forsan e mixtione cum *T. signato* (n. 32.) ortum ducunt.

*Oxyporus rufipes* Pz. ad *Tach. pullum* (n. 30.) citatus est.

De Geer Mem. St. n. 11. haud *T. rufipedem* sed *T. humeralem* descripsisse videtur.

*T. rufipes*? niger, nitidus; pedibus, elytris, thoracis margine laterali, antennis et ore rufescentibus.

*Longitudo et habitus T. rufipedis*; statura autem paulo angustiore, abdomine apicem versus

versus angustato, incisione segmenti penultimi etc. differt.

*Caput* nigrum; palpis atque antennis rufescentibus; his articulo primo obscuriore; mandibulis testaceis.

*Thorax* niger, margine laterali paululum rufescente.

*Coleoptra* rectangular; elytris rufis, disco obscuriore.

*Abdomen* apicem versus angustatum; segmento penultimo infra profunde inciso.

Specimen unicum huius *Tachypori*, qui varietas *T. rufipedis* esse videtur, exstat in collectione *Hellwigio - Hoffmannseggiana*.

36. *T. humeralis* M. p. 136. nitidus, niger; antennis, elytris, pedibus, et thoracis marginibus rufis.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

*Caput* nigrum. Antennis, capitis thoracisque longitudine, rufo-fuscis; articulo primo pallidiore. Palpis rufescentibus seu fuscis.

*Thorax* niger, longitudine duplo latior, lateribus rotundatis, apice paulo angustior; marginibus, imprimis lateralibus, rufis seu rufo-testaceis.

*Scutellum* et *coleoptra* castanea.

*Abdomen* nigrum, marginibus segmentorum rufo-fuscis.

*Pedes castanei.*

A speciebus confinibus hic *Tachyporus*, thorace latiore et thoracis marginibus rufis vel rufo-testaceis, distinguitur.

*Var. coleoptris obscurioribus forsan e copula cum T. signato oritur.*

*Species intermediae* interdum occurrunt, quae, ratione proportionis et coloris, medium tenent inter *Tach. humeralem* et *T. rufipedem*.

*Var. T. humeralis* nigra; palpis, antennarum basi, thoracis marginibus omnibus, elytris pedibus et segmentorum marginibus castaneorufis; long. 3 linearum — in collectione *Bosciana* sub nomine *Oxyporus marginatus* *Fbr.* exstabat. — Confer. *T. marginatus* *M.* p. 127. et huius *Monographiae* n. 23. *T. im-maturus*.

*De Geer* Mem. St. n. 11.

37. *T. batychrus* *M.* p. 191.

38. *T. pallipes* nitidus, niger; basi antennarum, thoracis margine laterali, macula elytrorum humerali, pedibusque testaceis seu testaceo-rufis.

Long. 3 lin.

Caput nigrum; palpis et antennis fulcis, his articulo primo testaceo.

*Thorax*



*Thorax* margine laterali, saepius autem obsoleto, pallido.

*Coleoptra* quadrata, subtilissime puncta; elytrorum macula humerali distinctiore vel obsoletiore, interdum basi tota vel testacea vel rufescente.

*Abdomen* segmento penultimo vel sinuato vel integro.

E collectione *Latreilleana*.

39. *T. bipustulatus* M. p. 135.

*Caput* huius *Tachypori* haud thorace plus triplo longius est, sed plus tripla breuius. —  
Lapsum illum scriptorium loco citato emendes quaeso.

40. *T. subterraneus* M. p. 135.

---

## GENVS II.

## TACHINVS.

Hoc genus complectitur familiam primam *Tachypororum* et familiam secundam *Tachinorum*. Hae familiae, quas anno 1802 proposui, species continent Micropterorum non nisi palpis acuminatis et filiformibus differentes, omnibus autem reliquis characteribus genericis, *statura* graciliore, *capite* ovato vel subovato, *thorace* haud transverso, sed suborbiculato, apicem versus angustiore, congruentes. Longe plurimis speciebus *elytra* sunt laevia, bi-vel tricrenato-striata; striis plerumque distinctis, rarius in puncta magis minusve obsoleta evanescentibus. — Paucis *elytra* punctis crebris impressa sunt, uti *Staphylinis* familiae primae; et cum hae species palpos etiam habent filiformes, hoc genus cum *Staphylinis* iungere videntur. Sunt attamen semper characteres, quibus hi *Tachini* a *Staphylinis* distingui possunt: *Antennarum articulus ultimus* *Tachinis* nunquam lunato-seu parabolice truncatus est, uti *Staphylinis* familiae primae, sed apice acutus. *Thorax* quidem thoraci illorum *Staphylinorum* similis est, basi attamen semper latior et truncatus, haud rotundatus, apicem versus angus-

angustior quam in *Staphylinis*; caret etiam seriebus punctorum, nec nisi punctis 2 vel 4 dorsalibus, rarius 2 vel 3 lateralibus impressus est, quae autem nunquam in series disposita sunt. — A *Tachyporis* hoc genus corpore graciliore; *thorace* haud transuerso, sed suborbiculato, punctis quibusdam maioribus impresso; nec non sculptura seu punctura *elytrorum* bene distingui potest.

*Familia I.* complectitur *Tachinos palpis acuminatis*;

*Familia II.* *Tachinos palpis filiformibus.*

#### FAMILIA I.

Continet *Tachyporos* *fam. I. M. p. 125.*

1. *T. dissimilis* M. p. 125. haud est *Oxyporus rufipes* Pz. (confer. *Tachyporus pullus* n. 30.)

*T. nitidus* niger; antennarum basi, pedibus, et coleoptrorum margine apicali pallidis; coleoptris punctis.

*Long.* 2 lin.

*Caput* ouatum, *thorace* duplo minus, nigrum; palpis antennisque fulcescentibus; his, capitis thoracisque longitudine, filiformibus, articulo 1 et 2 pallidior.

*Thorax* orbiculatus, apicem versus angustior; punctis 2 dorsalibus et 2 ante marginem apicis, angulos apicis versus (vt in plurimis huius

huius generis speciebus) impressus; niger seu nigro-rufus.

*Coleoptra* quadrata, nigra seu fusco-nigra, margine apicali testaceo; subtiliter et confertim puncta, pilosella.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, pilosellum, apicem versus angustatum, nigrum, segmentis ultimis margine subfuscescente.

*Pedes* testacei seu piceo-testacei.

Habitat etiam Norimbergae — *Sturm*.

2. *T. 4 punctulus* niger, nitidus; pedibus pallidioribus; coleoptris punctis.

*Long.*  $1\frac{3}{4}$  lin.

Habitu, statura, partiumque forma proportionem et puncturam omnino *T. dissimilis* (n. 1.); capite attamen orbiculato et colore differt.

Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

3. *T. splendidus* nitidus, fuscus; coleoptris antennisque pallidioribus; thorace pedibusque testaceis.

*Long.* 2 lin.

*Statura* paulo gracilior *T. melanocephalo* (n. 7.)

*Caput* thorace triplo minus, latitudine longius, apicem versus angustatum; nigrum, apice sub-testaceum. Antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis; articulis 2 primis testaceis. Palpis testaceis.

*Tho.*

*Thorax* testaceus, punctis 2 dorsalibus ante marginem apicalem impressus.

*Coleoptra* obscu-ro-seu rufo-castanea, seu rufa; circa scutellum et margine laterali deflexo plerumque nigricantia, interdum vestigiis quibusdam linearum duarum longitudinalium impressa.

*Abdomen* pilosum, nigrum; marginibus segmentorum pallidis.

*Pedes* testacei; capitibus femorum obscuris.

*T. splendidus* — *Knoch*.

*Varietatem* minimam huius speciei, a maioribus individuis non nisi statura paulo graciliore, longitudine  $1\frac{1}{4}$  linearum, et antennis paulo brevioribus et crassioribus se distinguentem, Dom. Prof. *Knoch*. pro specie peculiari habet eique dedit nomen *T. 2 notatus*. Hanc vero differentiam specialem eo minus concedere possum, cum ambae varietates varietate sequente Norimbergensi iungantur.

Habitat Brunsvigae, locis arundinosis humidis, lectus primo vere — *Dahl*.

*T. simillimi* *T. splendide*, longitudine tantum  $1\frac{1}{2}$  lin: coleoptris testaceo-rufis, circa scutellum et margine laterali deflexo nigricantibus, specimina duo *Sturm* mecum communicavit.

Haec varietas habitat Norimbergae.

4. *T. lepidus* nitidus niger (thorace elytrisque interdum obscuro-castaneis); pedibus, ore et antennarum basi fusco-rufescentibus.

*Long.* 2 lin.

*Statura* *T. praecedentis*; colore autem punctura et capite magis orbiculato differt.

*Caput* thorace triplo minus, suborbiculatum, nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis, basi rufescentibus; ore fusco-rufescente, palporum anticorum articulo penultimo clauato fusco.

*Thorax* nigricans, interdum obscuro-castaneus; punctis quibusdam, subtilibus, 3-5, lateralibus, ordine indeterminato positis, duobusque dorsalibus, ante marginem apicalem, impressus.

*Elytra* nigra, vel nigro-aut rufo-castanea, circa scutellum obscuriora; seriebus duabus punctorum longitudinalibus, altera disci 6-9 puncta, altera marginali obsoletiore, impressa.

*Abdomen* coleoptris plus triplo longius, pilosellum, nigrum, marginibus segmentorum subpallescentibus.

*Pedes* vel piceo-testacei, femorum capitibus fuscis; vel rufo fusci, femoribus nigro-fuscis.

*Habitat* Norimbergae — *Sturm*; et Brunsvigae, lectus sub gramine ad fossas in pratis — *Dahl*.

*T. le-*



*T. lepidus* — Knoch.

5. *T. punctus*, nitidus rufus; capite abdomine, pectore, margineque elytrorum laterali nigris.

Long. 2 lin.

Caput nigrum, palpis rufis. Antennis fuscis; articulis 2 primis rufis, ultimo orbiculato acuto

Elytra striis punctorum tribus, vna scilicet marginali, duabus discoideis, obsoletis impressa; rufa, disco et margine laterali nigricantibus.

Abdomen nigrum, ano pallido.

Pedes testacei, femoribus et femorum capitibus obscurioribus.

E collectione *Latreilleana*.

*T. alter*, huic simillimus, thorace autem nigro, punctis elytrorum obsoletioribus et parcioribus, statura paulo minore, existat etiam in collectione *Latreilleana*.

## FAMILIA II.

6. *T. striatus* M. p. 146.

Thorax punctis duobus ad marginem apicalem impressus.

7. *T. melanocephalus* M. p. 144.

Thorax interdum punctis 2 ad marginem apicalem impressus.

Var. I. 3, elytris, basi testaceis, apice nigris; long. 2 lin.

8. *T.*

8. *T. nanus*, nitidus, nigricans; coleoptris fuscescentibus, pedibus antennisque piceo-testaceis.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* ovatum, apicem versus subangustius; fuscum. Ore antennisque testaceis; his capite longioribus, extrorsum crassioribus.

*Thorax* nigro-fuscus, punctis 2 dorsalibus impressus.

*Coleoptra* quadrata, obsolete 4 crenato-friata, nigro-fusca, humeris et angulo exteriori apicis subpallidioribus.

*Abdomen* nigrum, marginibus segmentorum rufescentibus.

*Habitat?*

9. *T. bicolor* rufus; antennis extrorsum obscurioribus; pectore, abdomine elytrorumque angulo exteriori apicali nigris.

*Long.* 3 lin.

*Habitu*, partiumque forma et proportionem *T. melanocephali* maximi; statura autem maiore et colore obscuriore.

*Caput* suborbiculatum, ore producto, rufum; oculis nigris. Antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis; articulis 2 primis rufo-testaceis.

*Elytra* linea una disci crenata impressa, rufa; angulo apicis exteriori toto, ab humeris fere usque ad suturae apicem, nigro.

*Pedes*

*Pedes* rufo-testacei.

E collectione *Hellwigio-Hoffmannseggiana*.

Habitat in Borussia — *Hellwig*.

10. *T. tristis*, nitidus, niger; antennis pedibusque rufis.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* paruum, suborbiculatum, nigrum, palpis antennisque rufis.

*Thorax* niger, apice subobscurorufo micans.

*Elytra* nigra, summo apicis et suturae margine rufo; bistriata, striis disci parallelis, interna obsoletiore, externa puncta seu crenata.

Habitat in Borussia — *Hellwig*.

E collectione *Hellwigio-Hoffmannseggiana*.

11. *T. axillaris*, nitidus niger; femoribus anterioribus et antennarum basi pallidioribus; elytrorum linea longitudinali testacea.

*Long.* 3 lin.

*Statura* et partium forma atque proportione

*T. striati*; colore autem, magnitudine, nec non defectu lineae punctorum disci elytrorum differt.

*Caput* nigrum; antennarum articulo primo, articuli ultimi apice, labioque rufescentibus.

*Coleoptra* subquadrata, lineis elytrorum deficientibus, relicta solummodo impressione laevi ad elytrorum basin.

*Abdo-*

*Abdomen* nigrum, segmentorum summo apicis margine subrufescente.

*Pedes* nigro-fusci; capitibus femorum femoribusque anticis rufescentibus.

Habitat in America septentr.

*T. axillaris* — *Knoch*.

12. *T. niger* M. p. 193.

13. *T. lunulatus* M. p. 147.

*Thorace* punctis duobus apicis marginalibus impresso.

14. *T. atricapillus* M. p. 143.

*Thorace* punctis 2 marginalibus apicis impresso.

*Staph. atricapillus* Oliv. Ent. St. n. 40. tab. IV. f. 39.

*Varietatem* vidi huius *Tachini* exiguam, long. 2 lin. elytris fufcescentibus, macula humerali obliqua albicante.

15. *T. cinctus* M. p. 193.

16. *T. analis* M. p. 143.

*Thoracæ* punctis 2 dorsalibus, ante marginem apicalem, vt in *T. splendido* (n. 3.) impressus.

*Elytra* striis tribus punctorum, interdum obsoletis, impressa.

*Abdominis* segmentorum margines nunquam fufcescunt; sed segmentum penultimum totum

tum et antepenultimi pars dimidia marginalis rufescunt.

Haec species variat magnitudine et antennarum articulorum vltimorum colore et figura.

*Var. 1* maxima; long.  $4\frac{2}{3}$  lin. Antennis fuscis; tribus vltimis articulis paulo pallidioribus; vltimo reliquis paulo longiore, obtuso ouato; duobus primis testaceis.

*Var. 2* minima; long. vix 3 lin. Antennis fuscis; articulis quatuor primis et vltimo, reliquis triplo longiore, testaceis.

*Var. 3* media; long.  $3\frac{1}{2}$  lin. Antennis fuscis; articulis 3 primis et 2 vltimis testaceis, vltimo reliquis duplo longiore.

Habitat Brunsvigae — Omnes hae varietates lectae sunt, tempore aestiuo, in sylvis, sub foliis deciduis — *Dahl*.

17. *T. merdarius* M. p. 149.

*Varietatem* huius speciei, pectore nigerrimo vidi in collectione *Bosciana*.

18. *T. cernuus*, nitidus niger; pedibus, ore, elytris, segmentorumque marginibus rufescentibus.

Long.  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

*Statura* nec non partium figura et proportionem omnino *T. analis* (n. 16.) varietati minori affinis; haud vero segmentis penultimis rufis, sed omnium segmentorum marginibus fuscescentibus differt.

*Caput*

*Caput* nigrum, ore rufo. Antennis, capit-  
tis thoracisque longitudine, fuscis, articulis 3  
primis rufis; forma et proportionē articulo-  
rum vt in *Tachini analis* varietate prima.

*Thorax* niger seu nigro-castaneus; pun-  
ctis 4 dorsalibus, quorum 2 margini apicali  
propiora, 2 autem medium versus posita  
sunt, impressus.

*Elytra* castanea, circa scutellum obscuriora,  
seriebus tribus punctorum, interdum obsole-  
tissimis, impressa.

*Abdomen* coleoptris plus triplo longius, pi-  
lofellum, nigrum; segmentorum marginibus  
rufo-fuscescentibus.

*T. cernuus* — *Knoch*.

Habitat Brunsvigae — Lectus, tempore  
aestivo, sub muscis, in sylvis — *Dahl*.

19. *T. formosus*, rufus; capite atque abdomine,  
excepto ano, nigris; elytris punctis.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

*Statura* nec non partium forma ac propor-  
tione omnino Tachinorum praecedentium;  
satis autem differt et colore et imprimis ely-  
trorum punctura.

*Caput* nigrum; ore rufo. Antennis filifor-  
mibus, capite thoraceque longioribus, fuscis,  
articulis 2 primis pallidioribus.

*Thorax*



*Thorax* rufo-fuscus; punctis 4 dorsalibus, 2 scilicet apicalibus, ad marginem, 2 autem medium versus, praeterea interdum vno alteroue ad marginem lateralem, impressus.

*Scutellum* rufo-fuscum.

*Coleoptra* rufo-fusca; punctis crebris, licet haud confertissimis, nec in series dispositis, impressa; pilis tenuissimis, haud confertis, oculo bene armato distinguendis vestita.

*Abdomen*, vt in *T. anali* (n. 16.) pilosum, nigrum, segmentis 2 vltimis totis, antepenultimo dimidio rufis.

*Pedes* rufi.

*T. formosus* — *Knoch*.

Lectus cum *T. praecedente* — *Dahl*.

20. *T. inclinans*, niger, nitidus; antennis, palpis, thorace, elytris punctis, pedibus, segmentorumque marginibus rufescentibus.

*Long.*  $3\frac{1}{3}$  — 4 lin.

*Statura*, nec non partium forma ac portione, elytrorumque punctura *T. praecedentis*; differt autem magnitudine, et ano haud rufo, sed segmentorum marginibus rufescentibus.

*Caput* nigrum, orbiculatum; antennis filiformibus, capitis thoracisque longitudine, palpisque rufo-fuscis; mandibulis vel nigris vel rufis.

*Thorax* coleoptris brevior; punctis 4 dorsalibus, 2 scilicet ante marginem apicalem, 2 medium versus positis, et praeterea saepius tribus obsoletioribus lateralibus marginalibus, impressus, rufus.

*Coleoptra* rufo-castanea, crebrius puncta quam in *T.* praecedente, et pilis distinctioribus atque crebrioribus rufo-griscentibus veliata.

*Abdomen* pilosum, nigrum, segmentorum marginibus rufo-fuscescentibus.

*Pedes* rufi. Quibusdam huius speciei individuis tarsi antici breves et dilatati sunt, et articulus primus tarforum mediorum dilatatus; quibusdam tarsi antici multo minus dilatati et tarsi posteriores omnes simplices.

*T. inclinans* — *Knoch*.

Habitat Brunsvigae — Lectus, mense Maii, in sylvis, sub foliis deciduis — *Dahl*.

Haec species et *T. formosus* (n. 19.) confinia designant inter Staphylinos et Tachinos — Confer quae de hac confinitate p. 22. monui.

## GENVS III.

## STAPHYLINVS.

Hoc genus, quod natura a reliquis cogeneribus satis distinxit, habitu communi specierum nunquam sane cum vlllo alio genere Micropteriorum confundetur. Habitus quidem totus communis omnibus speciebus idem est, vix autem character distinctius eruetur sufficiens ad hoc genus ab omnibus reliquis distinguendum. Characteres, qui in Micropteriorum systemate, anno 1802 publicato, Staphylinos designant, hic non adhibere possum, nam *St. Ulmi*, qui illic nouum genus condit, hoc systemate naturali ad Staphylinos redactus est. Nihilominus saltem duos characteres distinctiuos inuestigauī, qui, vel iunctim vel singulatim, soli Staphylinorum generi proprii sunt: *articulum nempe vltimum antennarum parabolice lunatum*, et *series punctorum thoracis*, quibus, in familia secunda, *thorax elongatus* accedit nunquam *punctis confertissimis inordinatis impressus*. Sunt vero Staphylini, quibus characteres, a striis punctorum thoracis et a forma vltimi antennarum articuli desumptos iunctos vidimus, e. g. Staphylini longe plurimi familiae primae; sunt alii, vno alteroue tantummodo praediti; e. g. articulo vltimo an-

tennarum lunato, nec seriebus punctorum thoracis, omnes Staphylini familiarum III, IV et V; seriebus autem punctorum thoracis, nec articulo ultimo antennarum lunato Staphylini familiae II. Praeterea in nullo alio Microptero-  
rum genere *antennae* sunt *ferratae*, quibus *St. dilatatus* a reliquis cospeciebus se distinguit; nec *palpi* *quatuor securidacei* (Oxyporis scilicet palpi solummodo posteriores securidacei sunt) uti plurimis speciminibus *St. Ulmi*.

Sunt quidam Staphylini e familia secunda (*St. fulminans*, *alternans*, *palmula*) quibus nec articulus ultimus antennarum lunatus, nec thorax seriebus punctorum (quamquam punctis paucis) impressus est. Nunquam autem haesitabimus, an hos Staphylinos caeteris, quos fam. II. complectitur, associemus, an non; habitu enim naturali, nec non forma atque proportionem partium plurimum essentialium, omnino cum illis congruunt: thorax elongatus laevis iam sufficit, quo species allegatae a *Lathrobiis* dignoscantur, cum quibus, ob staturam proceriorem filiformem, forsitan confunderentur, si quaedam confusio locum habere possit. *St. pyropterus* caret seriebus dorsalibus punctorum thoracis (quarum vestigia, punctis duobus, ad apicem thoracis sitis, remanent) et puncta serierum lateralium in arcum confluunt; caeterum autem de hac  
specie

specie idem valet, quod modo de aliis quibusdam huius familiae Staphylinis dixi.

De similitudine inter Staphylinos et quaedam alia Micropteroz genera haec monenda sunt: Nemo sane Staphylinum cum alio quouis Microptero confundet; attamen genera indicare me oportet, quibus hoc genus adfinesse videtur — *Lathrobia* a Staphylinis fam. II. corpore depressiore, thorace confuse puncto, pedibus validioribus brevioribus, palpis acuminatis (qui solummodo in *L. latipede* filiformes sunt) differunt. — Ad *Aleocharas* quasdam fam. III. (e. g. ad *Al. collarem*) quidam Staphylini (e. g. *St. elegans* et *thoracicus*) non nisi colore propius accedunt. — *Tachini* forma et proportionem thoracis cum Staphylinis fam. I. quibusdam similitudinem aliquam habent, qua, intuitu primo leui, eo facilius decipi possumus, cum color niger et statura maior, in hoc genere rariores, accedant, e. g. in *T. nigro*. Iam difficilior est *T. inclinans*, *formosus* et *cernuus*, characteribus essentialibus, nec ratione habita coloris, a Staphylinis huius familiae distinguere. Coleoptra eorum nempe puncta et pilosella sunt, ut Staphylinis, nec striis crenatis, ut plurimis Tachinis impressa, sed forma thoracis, deficientibus punctorum seriebus, articulo ultimo antenarum haud parabolice lunato satis differunt.

(Confer

(Confer genus *Tachinorum*). Sunt autem quidam Staphylini (*St. impressus*, et *capucinus*), quibus coleoptra haud puncta sunt, sed crenatosiriata vel punctis paucis impressa, vti Tachinis, cum quibus autem, ob formam vltimi antennarum articuli, thoracis, nec non serierum punctorum thoracis nunquam confundi possunt. —

Quo facilius ordo in hoc genere perspiciqueat, species Staphylinorum in quinque familias distribui.

#### FAMILIA I.

Comprehendit illas huius generis species, quae aliquam cum genere praecedente adfinitatem produnt; omnes ergo Staphylinos familiae quondam tertiae. M. p. 15. — Characteribus autem illic datis haec addo:

*Antennae* *St. dilatati* serratae sunt, articulo vltimo ovato; haud parabolice obtuso, vti longe plurimis huius familiae speciebus, imprimis autem omnibus maioribus esse solet.

*Palpi* *St. Ulmi* plerumque securidacei sunt.

*Coleoptra* longe plurimis huius familiae Staphylinis aenescentia seu viridana sunt, quorum in reliquis huius generis Staphylinis nulum exemplum exstat.

*Thorax* seriebus punctorum discoidalibus impressus esse solet; perpaucis speciebus discus thoracis his seriebus caret.



1. *St. impressus* M. p. 35.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo vel duplo minus, nigrum, nitidum, leve; in angulis baseos punctum, punctis quatuor distinctioribus. *Antennis* et *palpis* fuscis.

*Thorax* orbiculatus, lateribus fere aequo declivius ac in *St. nitido* (n. 5.); punctura etiam *St. nitidi*, seriebus nempe dorsalibus tripunctis, lateralibus obsoletis (rarissime distincte 4 punctis, quod non nisi in unico indiuiduo, a Dom. Sturm mecum communicato, vidi); *coleoptris* paulo brevior; niger.

*Coleoptra* latitudine vix paulo longiora; depilia, marginibus tantum subciliatis; nigro-fusca, margine futuraeque rufis. *Elytris* seriebus 4 longitudinalibus punctorum circiter 7 — 9 impressis; serie prima ad futuram sita; secunda et tertia disci; quarta, ante marginem, ubi elytra deflectuntur, punctis autem obsoletioribus; inter has series interdum puncta quaedam vaga disseminata sunt; pars deflexa elytrorum ipsa subtiliter et confertim puncta est.

*Abdomen* *coleoptris* plus duplo longius, pilosellum, nigrum, aeneo-sericans, marginibus segmentorum rufescentibus.

*Pedes* fusci, *tarsis* anticis dilalatis.

Habitat Norimbergae — Sturm; Brunsvigae — Dahl.

Varie-

*Varietas* huius *Staphylini* est *var. 6. St. nitidi* M. p. 52.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, leue, punctis quibusdam distinctioribus in angulis bascos impressum; antennis fuscescentibus, basi rufescente.

*Thorax* vnus indiuiduorum duorum meae collectionis niger, puncto marginali distincto; puncto vnico laterali, ante marginem apicalem sito; seriebus dorsalibus tripunctis. Alterius indiuidui thorax fusco-niger est; puncto marginali distincto; punctis 2 lateralibus minutis, serierum dorsalium puncto primo minore; secundo et tertio confluentibus ita vt impressionem irregularem forment.

*Coleoptra* quadrata, depilia; margine tantummodo inferiore subciliato. Elytra leuia, serie punctorum 5 vel 6 disci longitudinali, quae autem vix oculo armato se offert, punctis nempe obsoletissimis, impressa; castanea, disco obscuriore.

*Abdomen* vt in *St. impresso*, nigrum autem, marginibus segmentorum rufescentibus!

*Pedes* rufi.

2. *St. Capucinus*, nitidus, niger; pedibus rufescentibus; elytrorum disco vage puncto; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

*Long.* 3 lin.

A *St. praecedente*, colore et magnitudine, a reliquis autem *Staphylinis elytrorum punctura* differt.

*Caput* orbiculatum, thorace minus, leue; punctis 4 interocularibus, 2 occipitalibus impressum; nigrum, palpis et antennis fuscescentibus, his capite paulo longioribus.

*Thorax*, vt in *St. nitido* (n. 5.) 3, 2, 1 punctus.

*Coleoptra* quadrata, thorace paulo maiora, nuda vel vix pilosella; margine laterali multipuncta; disco punctis paucioribus impressa.

*Abdomen* pilosum, nigrum, subaeneo-variis, summis segmentorum marginibus fuscescentibus; segmento penultimo subtus inciso.

*Pedes* fusci, tarsis anticis subdilatatis.

Habitat in America septentr.

*St. capucinus* — Knoch.

3. *St. xantholoma* niger, nitidus; elytris opacis, margine laterali testaceo; thorace subquadrato, seriebus dorsalibus tripunctis.

Long. 3 lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, punctis perpaucis maioribus impressum, nigrum; oculis parvis; palpis antennisque fuscescentibus, his capitis et thoracis longitudine, articulo ultimo obtusiusculo.

*Thorax* subquadratus, coleoptris duplo fere minor; puncto marginali et punctis serierum dorsa-

dorsalium tribus distinctis; serie laterali deficiente.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, opaca, subtilissime puncta, vix depilia, margine apicali fimbriata; nigra, margine laterali testaceo.

*Abdomen* nigrum; lineis duabus dorsalibus longitudinalibus subobsoletis, nec non ventre griseo-sericantibus.

*Pedes* fulcescentes.

Habitat Rostochii — *Karsten*, qui eum sub nomine *St. lateralis* cum *Hellwigio* communicavit.

*St. xantholoma* — *Hellwig*.

4. *St. lateralis* M. p. 35.

*Varietas* coleoptrorum margine laterali obsolete rufo habitat Parisiis — *Latreille*.

*Varietas* altera; Long.  $4\frac{1}{2}$  lin. Caput nigrum; palpis et antennarum fuscarum articulo primo rufis — *Thorax* seriebus dorsalibus 3 punctis, puncto marginali vno. — *Abdomen* nigrum, ano pallescente. — *Pedes* obscuro-fusci, tarsis pallidioribus. — Habitat Parisiis — *Bosc*.

5. *St. nitidus* M. p. 31.

Microptera, quae, loco citato, sub hac specie, qua varietates recensui, colore et magnitudine satis differunt, ut discrimen accuratius sane requirant. Forsan remotissimae  
varie-

varietates sunt species peculiare, quae, copula inter se iunctae, varietates intermedias genuerunt. Varietates ideo praecipuas hic accuratius recensere et describere mihi propositum est. Disquisitionibus et observationibus reiteratis et multiplicatis, lapsu temporis diiudicari poterit, an hae varietates remotiores species sint genuinae, an nihil aliud quam varietates vnius eiusdemque speciei.

*Varietas tota nigra.*

*Long.* 4 lin.

*Caput* orbiculatum seu subovatum, latitudine paulum longius; thorace minus. Mandibulis magis minusue validis. Antennis nigricantibus seu fufcescentibus.

*Pedes* fufcescentes; femoribus interdum obscurioribus.

Huc pertinent varietates 1 et 2 M. p. 32.

Differentia magnitudinis capitis eiusque formae, et fortitudinis mandibularum, nullo modo adhiberi potest ad nouam speciem condendam. Haec enim differentia in multis aliis coleopterorum et ipsorum micropterorum speciebus obseruatur, et forsan etiam differentiae sexuali respondet.

*Varietas nigra, elytris castaneis.*

*Long.* 5 — 6 lin.

*Caput*

*Caput* orbiculatum, maius minusue, semper autem thorace minus.

Huc pertinet varietas 12 M. p. 32.

Omnes vero reliquae varietates, quarum, pagina citata, mentio facta est, exceptis varietatibus 6, 8, 13, de quibus infra quaedam adhuc monebo, vel e copula harum duarum (quae pro speciebus peculiaribus statui possunt) ortae sunt, characteribus patris et matris mixtis; vel sunt individua modo e pupa prorupta, nondum colore perfecto imbuta, quod in omnibus reliquis infectis, modo e pupa enatis, obleruari potest. Differentia magnitudinis autem effecta esse potest causis aliis externis, quibus larua magnitudinem perfectam nasci haud potuit.

Dixi in descriptione *St. nitidi* M. p. 31., thoracem plerumque puncto tantum vno alteroue maiore, rarius seriebus dorsalibus tripunctis impressum esse; quod autem secus se habet: Series enim tripunctae dorsale nunquam defunt, quamuis puncta saepe adeo subtilia sint, vt vix oculo armato detegi possint. Positio horum punctorum haec est: Primum ante marginem anteriorem, tertium in medio thoracis (apici attamen paulo propius quam basi), secundum inter primum et tertium, interuallis aequalibus ab utroque. Rarius  
tertium



tertium illud, in medio thoracis positum, interuallo maiore a duobus primis distat et multo distinctius illis est. Hanc positionem autem non nisi in indiuiduo var. 12. vnico, quod posideo, obseruaui.

*Varietas* 6 M. p. 32., ad *St. impressum* relata est (n. 1).

*Varietas* 8 M. p. 32. propria species esse videtur, de qua infra, sub nomine *St. articillus* (n. 19.).

*Varietas* 13 M. p. 32. peculiaris quoque species, *St. tenellus* (n. 18.) est.

*Varietas* noua *St. nitidi* est nigra; antennis fuscis, basi rufis; palpis, pedibus, segmentorumque marginibus rufis. — Habitat Norimbergae — *Sturm*.

Haud raro in collectionibus hanc vel illam *St. nitidi* varietatem sub nomine *St. fulgidus* reperi, e. g. in collectione *Bosciana* *St. nitidum* nigrum; antennis, pedibus, elytris, ano, segmentorumque marginibus rufis; caeteris autem *St. nitido* similem; nec non alium *Staphylinum*, a *D. Sturm* sub nomine *St. fulgidus* mecum communicatum, quem pro varietate 12 *St. nitidi* agnoui.

*Geoffroy* (Hist. St. n. 11.) *Staphylinum* descripsit, quem M. p. 33. ad *St. nitidum* allegauit. *Fourcroy* (Ent. Par. St. n. 11.) eum

*St.*

*St. fulvopterus* nominavit. Graüter autem hæreo, an sit verus *St. nitidus*. Longitudo ei tribuitur tantum 3 linearum; descriptio autem valde brevis est: "Niger, nitens; pedibus antennis coleoptrisque testaceis (couleur maron); elytris punctatis præcipue a specie præcedente (*St. fulvipede* et *ambiguo*) differt. Venter nigro-fuscus." — An forsan *St. corrufcus*?

6. *St. molochinus*, niger, nitidus, abdomine obscuro-aenescente; antennis palpis tarsis elytrisque castaneis; thorace seriebus dorsalibus 3-punctis.

Long.  $3\frac{1}{2}$  —  $4\frac{1}{2}$  lin.

A. *St. nitido* satis differt thorace haud dilatato, elytris brevioribus et multo gracilius punctis, abdomine vario-aenescente.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, punctis interocularibus 2 vel 3, et 3 pone oculos distinctis impressum, nigrum; antennis filiformibus, capite paulo longioribus, palpisque rufescentibus.

Thorax magnitudine coleoptrorum, orbiculatus; seriebus dorsalibus semper 3 punctis, (punctis vt in *St. nitido* et reliquis, quorum thorax seriebus dorsalibus 3 punctus est, positis); punctis marginalibus et lateralibus vel duobus vel solummodo vnico.

Cole-

*Coleoptra* quadrata, obscuro-castanea, subtilissime puncta, et pilis tenuissimis vestita.

*Abdomen* coleoptris quadruplo longius, nigrum, coloribus variis subaenescens.

*Pedes* vel nigro-fusci, tarsis rufescentibus; vel rufo-fusci, tarsis pallidioribus.

Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

*St. molochinus* — *Knoch*.

7. *St. Ulmi* M. p. 199. *Astrapaeus Ulmi*.

*St. ulmineus* Fabr. El. St. n. 28.

*Astrapaeus Ulmi* Panzer. Fn. G. H. 88. t. 4.

8. *St. laticollis* M. p. 173.

9. *St. moesius* nitidus, niger; palpis antennisque obscuro-fuscis; pedibus rufo-fuscis; capite ovato; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

Long. 3 — 4 lin.

*Caput* ovatum, thorace duplo fere angustius; antennis capite duplo fere longioribus.

*Thorax* coleoptris paulo angustior, seriebus 5, 3, 2 punctis. Interdum punctorum dorsalium vnum alterumue subtilius est, ita vt facile oculos fugere possit; interdum etiam vnum alterumue supernumerarium est; vnde euenit, vt series dorsales vel e 4 vel e 6 punctis compositae videri possint.

*Coleoptra* quadrata, subpilosella, interdum subaenescens.

*Pedes*

*Pedes* fulci, *tarsis* gracilibus.

Habitat in America septentrionali — *Knoch*.

*St. moestus* — *Knoch*.

10. *St. fuliginosus* M. p. 34.

11. *St. tristis* M. p. 34. nitidus, niger; seriebus dorsalibus tripunctis; capite, oculis magnis, et inter oculos serie transversali 5 vel 6 punctorum impresso.

*Long.* 4 — 5 lin.

*Caput* thorace minus, latitudine paulo longius, nigerrimum, nitidissimum, leue; punctis 2 vel 3 distinctioribus in angulis baseos, nec non 5 vel 6 inter oculos positis impressum. Haec puncta, inter oculos posita, seriem formant transversalem, ita ut haec series, in medio frontis, intervallo paulo maiore interrumpatur; rarius horum punctorum duo perassinia sunt vel confluunt in punctum unicum, ita ut series e punctis quinque consistet. Caeterum autem haec punctorum series characterem praebet, quo haec species bene a speciebus confinis distingui potest, quod in speciminibus quinque, quae possideo, probatum inveni. — Oculi sunt magni; antennae, capite paulo longiores, graciliores quam in *St. nitido* (n. 5.), vel omnino nigrae, vel basi aut omnino rufae sunt; palpi vel rufescentes vel nigricantes.

*Thorax*

*Thorax* orbiculatus, vix paulo angustior quam in *St. nitido*, nigerrimus, nitidissimus, coleoptrorum magnitudine; punctura vt in *St. nitido*.

*Coleoptra* quadrata, nitidula, subtiliter et confertim puncta; pilis brevissimis, interdum ipso armato oculo vix conspicuis, tecta.

*Abdomen*, coleoptris plus triplo longius, subtilissime punctum, nitidulum, nigrum; coloribus aeneis magis minusue micans; segmentis vltimis vel integris vel ventre sinuatis, penultimo autem semper multo profundius quam antepenultimum.

*Pedes* nigri; tarsis fuscis, anticis dilatatis.

Habitat Brunsvigae — Captus, tempore vernali, ad fossas, sub lapidibus — *Dahl*. — Habitat etiam Parisiis, vbi in collectione *Bosciana* varietatem huius *Staphylini* antennis totis ochraceo-rufis vidi.

*St. tristis* Fabr. Ent. Syst. St. n. 21., niger, thorace obscuro-aeneo, elytris pubescentibus obscurioribus. — Habitat in Dania; Mus. Dom. de Schestedt — Paulo maior *St. polito*. Antennarum articulus primus apice ferrugineus. Caput leue, atrum. Thorax levis, nigro-aeneus nitidulus. Elytra pubescentia obscuriora. Corpus nigrum.

12. *St. ruficornis*, nitidus, niger; abdomine aeneo-vario; palpis, antennis, pedibusque rufis; capite ovato, oculis magnis.

Long. 4 lin.

Statura graciliore, capite parvo, thorace haud dilatato etc. a *St. praecedente* differt; statura maiore, abdomine breviori aeneo etc. a *Staph. attenuato* (n. 31).

Caput ovatum, thorace brevius et multo angustius, nigrum; antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufis; oculis magnis oblongis.

Thorax coleoptorum magnitudine, seriebus dorsalibus tripunctis, puncto marginali uno; punctis subtilibus.

Coleoptra nitidula, quadrata, fuscescentia, subpilosella, confertissime subtilissimeque puncta.

Abdomen, ut in *St. praecedente*, coloribus aeneis micans; rarius opacum nigrum, segmentorum marginibus ventre rufescentibus.

Habitat Parisiis — Latreille.

13. *St. scitulus* niger, nitidus; pedibus, antennis, elytrisque rufis; his angulo apicis exteriori nigro; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

Long. 3 — 3½ lin.

Habitu omnino *St. nitidi* (n. 5.) minoris; statura autem graciliore.

Caput



*Caput* suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace duplo fere minus, nigrum, nitidum, in angulis baseos punctis paucis impressum; oculis parvis; antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufo-testaceis.

*Thorax* niger, coleoptrorum fere magnitudine, orbiculatus, nec vero eadem latitudine ac in *St. nitido*, angulis apicis deflexis; puncto marginali vno, vnoque laterali minuto, seriebus dorsalibus 3 punctis.

*Scutellum* nigrum.

*Coleoptra* quadrata, nitida, pilis pertenuibus, haud confertissimis, vestita; subtiliter, nec vero confertissime, puncta; rufa, angulis apicis nigris.

*Abdomen* coleoptris plus triplo longius, pilosellum, nigrum, segmentorum marginibus rufescentibus.

*Pedes* rufo-testacei, tarsis interdum obscurioribus.

Habitat Brunsvigae — ad salicem captus hyemans — *Dahl*.

14. *St. corruscus* M. p. 33.

15. *St. coenosus* niger, nitidus, coleoptris castaneo-rufis; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis; capite orbiculato.

*Long.* 5 — 6 lin.

D 2

*Statura,*

Statura, nec non partium forma proportionem et punctura *St. aeneo* simillimus, a quo coleoptris rufis et subtilius punctis differt.

Caput quadratum, angulis obtusis, thorace paulo latius; punctis crassis confertis in angulis baseos, et inter oculos paruos punctis 4 maioribus, nec non quibusdam minoribus vagis, impressum; antennis filiformibus, capite paulo longioribus.

Thorax coleoptris paulo minor, apicem versus vix paulo angustior, punctis 1, 2, 4 maioribus, praeterea autem nonnullis minoribus praesertim in angulis apicis, impressus.

Coleoptra quadrata, subtilius puncta quam in *St. aeneo* (n. 78.); pilis tenuibus, testaceo-grisescens vestita.

Scutellum nigrum.

Abdomen coleoptris triplo longius, nigrum, pilis tenuissimis grisescens vestitum.

Pedes nigri, tarsis omnibus gracilibus fuscis.

Habitat Norimbergae — Sturm.

*St. coenosi* varietas? *St. nigro-fuscus*, elytris piceis; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalis 4 punctis.

Long. 5 lin.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nitidum, basi punctis paucis impressum; nigro-

gro - fuscum; antennis capite longioribus; clypeo et labro testaceis.

*Thorax* nigricans, obscuro - rufomicans;

4, 3, 1 punctus.

*Coleoptra* quadrata, puncta, picea, pilis tenuissimis vestita.

*Abdomen* nigro - fuscum, segmentorum marginibus ventre pallidioribus.

*Pedes* fusci, tarsis anticis subdilatatis.

Huius *Staphylini* specimen vnicum e collectione *Hellwigio-Hoffmannseggiana* descripsi. Habitat in Borussia — *Kugelann*.

16. *St. palliatus* nitidus, niger; elytris, pedibus, antennarumque basi testaceo - rufis.

*Long.* 2 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace paulo minus, nigrum; articulo primo antennarum rufo.

*Thorax* coleoptris paulo minor, seriebus dorsalibus 4 - 5 punctis; lateralibus 3-, marginalibus 2 punctis.

*Coleoptra* quadrata, subpilosella, testaceo - rufa.

*Pedes* testaceo - rufi, capitibus femorum nigerrimis.

Habitat in America septentrionali — *Knoch*.

17. *St. peregrinus*, nitidus, nigricans; antennis, palpis, elytris, pedibus, thoracis lateribus, et segmentorum marginibus rufescentibus.

*Long.*

*Long.* 3 lin.

Habitu et thoracis forma *St. nitido* (n. 5.) affinis; capite autem ouato et colore satis differt.

*Caput* ouatum, thoracis longitudine, sed eo angustius, nitidum, punctis perpaucis maioribus impressum, nigrum; antennis (quarum articulus vltimus deest) capite paulo longioribus, palpisque rufis.

*Thorax* punctis quibusdam impressus, niger, lateribus rufescentibus.

*Coleoptra* quadrata, subpilosa, piceo-rufescentia.

*Abdomen*, segmentorum marginibus rufis, supra nigricans, infra fuscum.

*Pedes* testaceo-rufi, tarsis anticis dilatatis.

Habitat in Carolina — *Bosc.*

18. *St. tenellus* — *St. nitidi* var. 13. M. p. 32. nigro-fuscus; abdomine pedibusque pallidioribus; elytris testaceis; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

*Long.*  $5\frac{1}{2}$  lin.

Statura graciliore, colore et thoracis punctura satis a *St. nitido* (n. 5.) distinctus est — Specimen autem tantummodo vnicum in mea collectione existat.

*Caput* suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace minus, nigrum, nitidissimum;

mum; in angulis baseos punctum, punctis 3 distinctioribus; antennis fusciscentibus.

*Thorax* orbiculatus, latitudine fere eadem ac in *St. nitido*; nigro-fuscus, marginibus pallidioribus; puncto marginali vno; serie laterali 3 puncta; seriebus dorsalibus 4 punctis, punctis autem subconfluentibus. Praeterea punctum marginale in angulo baseos, ante humeros coleoptrorum, impressum est, distinctius quam in reliquis huius familiae *Staphylinis*.

*Scutellum* nigro-fuscum.

*Coleoptra* quadrata, dilute testacea, nitida, subtiliter puncta, pilis tenuissimis vestita.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, pilosellum, fuscum, subtiliter punctum.

*Pedes* fusci; tarsis anterioribus pallidioribus, anticis brevibus.

19. *St. atricillus* — *St. nitidi* var. 3. M. p. 32. — fuscus; capite nigro; pedibus testaceis; seriebus dorsalibus thoracis tripunctis,

*Long.* 4 lin.

*Statura* paulo graciliore et colore a *St. nitidi* varietatibus differt.

*Caput* suborbiculatum, latitudine paululum longius, nigrum, nitidissimum, punctis 4 in angulis baseos distinctioribus impressum; antennae palpisque rufescentibus.

*Thorax*

*Thorax* orbiculatus, angustior paulo quam in *St. nitido*, vix coleoptris paulo minor; nitidus, rufo-fuscus; punctura vt in *St. nitido*.

*Scutellum* rufo-fuscum.

*Coleoptra* quadrata, rufo-fusca, nitida; punctura et pilis vt in *St. nitido*.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, subtilissime punctum, subpilosellum, nitidum, rufo-fuscum, marginibus segmentorum pallidioribus.

*Pedes* rufo-testacei.

20. *St. maurorufus*, nigro-fuscus; capite atro, oculis magnis; pedibus et antennarum basi testaceis; thorace seriebus dorsalibus tripunctis.

*Long.* 3 lin.

*Habitu St. nitidi* (n. 5.).

*Caput* orbiculatum, thorace duplo minus, nigrum, nitidum; puncto vno maiore pone oculos, in angulo baseos, et puncto obsoleto, seu impressione leui, frontali. Oculis magnis. Antennis, capite longioribus, testaceo-fuscis, griseo-pilosellis, basi pallidiore nuda. Palpis testaceis,

*Thorax*, coleoptrorum fere magnitudine, orbiculatus, angulis apicis deflexis; fuscus seu nigro-fuscus, margine laterali pallidiore; punctis 1, 2, 3, vt in *St. nitido*, impressus.

*Cole-*



*Coleoptra* quadrata, subopaca, confertim puncta, pilis tenuibus e flauo grisescentibus vestita; vel fusco-nigricantia, marginibus rufo-fuscis; vel fusca, marginibus et futura rufescentibus.

*Abdomen* coleoptris plus triplo longius, opacum, nigro-fuscum vel fuscum, pilosellum.

*Pedes* rufo-testacei vel testacei.

Habitat Brunsuigae — captus sub cortice salicum, tempore vernali — *Dahl*.

*St. mauro-rufus* — *Knoch*.

21. *St. praecox* M. p. 172.

22. *St. brunneus* M. p. 172.

23. *St. pygmaeus*, nitidus, niger; palpis, antennis, elytris, pedibusque rufescentibus; thorace haud dilatato, seriebus dorsalibus 3 punctis.

*Long.* 2 lin.

*Caput* suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace minus; punctis 2 vel 3 distinctioribus in angulis baseos, punctoque vnico ad marginem interiorem oculorum, impressum; nigrum; antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufis.

*Thorax* suborbiculatus, apicem versus paulo angustatus, coleoptris minor; niger, nitidus; punctis 1, 2, 3, et praeterea punctis 2 maioribus,

ribus, quorum singulum inter punctum vltimum serierum dorsaliū et baseos angulum, illi attamen propius, positum est, impressus.

*Coleoptra* subquadrata, nitida, latitudine vix paulo longiora, puncta, subpilosella, castanea.

*Abdomen* coleoptris plus duplo longius, nigrum, nitidum, subpilosellum; marginibus segmentorum rufescentibus.

*Pedes* testaceo-rufi.

Huius speciei indiuiduum solummodo vnicum possideo.

24. *St. discoideus* M. p. 38.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace minus; nitidum, nigrum; punctis quibusdam in angulis baseos, quatuorque inter oculos, impressum. Antennis, capite longioribus, palpisque fuscis; illis basi rufis.

*Thorax*, forma et proportione vt in *St. fusco* (n. 26.), 1, 3, 5 punctus; punctis autem distinctissimis; rufescens vel nigro-rufus.

*Coleoptra* quadrata, puncta, punctis crassioribus quam in *St. fusco*, subtiliter pilosella, vel nigricantia aut nigro-rufescentia vel picescentia, marginibus plerumque pallidioribus.

*Abdomen* coleoptris triplo fere longius, nitidulum, pilosellum; vel dorso fuscum, ven-

tre rufescens; vel nigrum, segmentorum marginibus ventralibus rufescentibus; vel totum nigrum.

*Pedes* rufescentes seu rufo-testacei.

Habitat in Germania et in Gallia.

Hunc *Staphylinum* in collectione *Bosciana* sub nomine *St. flauescens* Fabricii vidi; et nihil obstat, quin huc referatur, Fabricius enim ipse insecta collectionis *Boscianae* examinavit et denominavit.

*St. flauescens* Fbr. El. St. n. 41.

*St. flauescens* Linn. Fn. Suec. n. 350. huic non pertinere videtur, nam "similis est *St. subterraneo*" (*Tachyporo subterraneo*) — Confer *T. humeralis* M. p. 137.

25. *St. sericans* M. p. 171. variat colore sericeo thoracis euanescente, coleoptris subpilosellis.

26. *St. fuscus* M. p. 29.

Long. 3 lin.

*Caput* orbiculatum, thorace vix minus, nitidum, nigrum; in angulis baseos punctum, et serie punctorum 5, interuallis aequalibus distantium, medio autem obsoletiore, inter oculos impressum. Antennis, capite paulo longioribus, palpisque rufo-fuscescentibus.

*Thorax* subquadratus, apicem versus paululum angustior; punctis 1, 3, 4 minutis impressus; coleoptris paulo minor; nigro-rufus.

*Coleoptra* quadrata, nitida, confertissime et subtiliter puncta, pilis grisescentibus tenuibus vestita, fusco-picescentia.

*Abdomen* nigrum, nitidum, pilosellum; marginibus segmentorum ventralibus, et segmenti vltimi et penultimi marginibus quoque dorsalibus rufescentibus.

*Pedes* rufi.

27. *St. testaceus* fusco-niger, nitidus; antennis pedibusque rufescentibus; elytris picescentibus; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

*Long* 2 —  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace vix paulo minus, nitidum, nigrum, punctis paucis impressum; oculis parvis; antennis rufis, capite longioribus; palpis fuscis.

*Thorax* subquadratus, coleoptris paulo minor, nitidus, fusco-niger; 1, 3, 5 punctus.

*Coleoptra* quadrata, pilosella, subpicescentia.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, nigrum, dorso subgriseo-sericante; marginibus segmentorum ventralibus rufescentibus.

*Pedes* rufo-picei, tarsis anticis subdilatatis.

Habitat Brunsvigae — *Knoch* — et Parisiis. — *Latreille*.

*St. testaceus* Payk. St. XX.

28. *St. ventralis* M. p. 174.

29. *St. terminatus* M. p. 30.

30. *St. subuliformis* M. p. 29. et *St. fragilis* M. p. 30., ex observatione Dom. Prof. *Knoch* varietates sunt vnus eiusdemque speciei. —

*Thorax* seriebus dorsalibus bipunctis impressus est.

31. *St. attenuatus* M. p. 27. nigricans seu fuscens, nitidus; pedibus testaceis; oculis magnis; seriebus dorsalibus thoracis tripunctis.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace minus, nigrum, nitidissimum; punctis 2 in angulis baseos distinctioribus, et puncto vno ad marginem oculorum interiorem, impressum; antennis, capite longioribus, vel omnino testaceo-rufis, vel obscuro-rufis basi pallidiore; palpis rufis.

*Thorax* orbiculatus, magnitudine fere coleoptorum, nitidissimus, vel niger, vel fuscus lateribus rufescentibus; plerumque 1, 2, 3 punctus.

*Coleoptra* exacte quadrata, subopaca, nigricantia vel fuscenscentia, pilis tenuissimis rarioribus vestita; subtilissime puncta, et quidem subtilius quam in plurimis reliquis *Staphylinis*.

*Abdomen* coleoptris plus triplo longius, pilosellum, subnitidum, nigricans seu fuscens.

*Pedes* testacei.

Longi-

Longitudo abdominis haud semper eadem est. Omnia eo dependent, an animalculum moriens abdomen contraxerit, nec ne. Caeterum autem hic *Staphylinus* semper abdomine longiore gaudere videtur quam reliqui huius familiae *Staphylini*.

Color et magnitudo huius *Staphylini* variant.

*Varietas* 1. nigra; antennis, elytris, thoraceque fuscescentibus, hoc margine laterali rufescente.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

*Thorax* puncto vno marginali, vnoque laterali distinctis; interdum vero etiam seriebus lateralibus tripunctis; punctis duobus subtilissimis, tertio intermedio autem distincto impressus.

*Var.* 2. fusco-castanea; thoracis margine, antennarum articulo primo, palpisque pallidioribus; pedibus testaceis; capite nigro.

*Long.*  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* interdum puncto maiore interoculari obsoleto impressum.

*Thorax* puncto vno marginali lateralibusque tribus distinctis.

*Abdomen* fuscum, colore cupreo-rutilante aenescens.

*Var.* 3. *Caput* nigrum; antennis fuscis, articulo primo testaceo; palpis testaceis.

*Thorax*



*Thorax* fusco-castaneus, margine laterali rufo unipuncto, lateribus tripunctis, punctis his lateralibus plerumque distinctis, interdum autem obsoletioribus uti in varietate prima.

*Coleoptra* fusco-seu rufo-castanea.

*Abdomen* nigro-viridi-aeneum, marginibus segmentorum rufis.

*Pedes* rufo-testacei.

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lin.

Hanc varietatem tertiam Dom. Dahl mecum communicavit sub nomine *St. limbatus*. Magnitudine nimirum et colore satis a var. 1. differt; sit ergo species propria. Var. 2. autem, species spuria, forsan ex copula *St. attenuati* et *St. limbati*, inter quos medium tenet, orta est.

Habitu partiumque forma ac proportionem omnes autem congruunt.

Habitat Brunsvigae — Dahl.

32. *St. bimaculatus* M. p. 38.

33. *St. bipustulatus* M. p. 37. niger, nitidus; elytrorum macula apicem versus sanguinea.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  — 4 lin.

Sutura nigra et capitibus femorum obscuris a *Staph. sanguinolento* (n. 34.); macula elytrorum angulum apicis interiorem versus distincta nec variabili, femorumque capitibus obscuris a *St. opaco* (n. 35.) differt.

Omnes

Omnes M. p. 37. descriptae varietates, tertia excepta, quae verus *S. bipustulatus* est, ad *St. opacum* referuntur.

Ex observatione Dom. Prof. *Knoch* hic *St. bipustulatus* et *St. sanguinolentus* ad vnam eandemque speciem referendi sunt, nec nisi sexu differunt.

34. *St. sanguinolentus* M. p. 36.

*Pedes capitibus femorum anticis flavo-testaceis; tarsis anticis interdum dilatatis.*

*Habitat in Germania et Gallia.*

*St. contaminatus* M. p. 174. mera *St. sanguinolenti* varietas, aut species intermedia inter hunc et *St. opacum* est; forsan e copula amborum ortus.

35. *St. opacus* M. p. 26., niger, nitidus; coleoptris sanguineo notatis, sutura autem semper nigra; capitibus femorum anticis (plerumque) testaceis; seriebus dorsalibus thoracis 5 punctis.

Distingui potest a *St. sanguinolento* (n. 34.) capite ovato, multo minore, sutura nunquam sanguinea; a *St. bipustulato* (n. 33.) macula apicis elytrorum distincta deficiente, et capitibus femorum anticis plerumque testaceis.

*Long.* 2 — 3½ lin.

*Caput* ovatum, thorace duplo minus.

*Thorax*

*Thorax* coleoptris minor, seriebus dorsalibus 5 punctis:

*Elytra* magis minusue pilis grisescentibus vestita; sanguineo-notata, et quidem:

1. puncto humerali et striga discoidali sanguineis confluentibus. — *Payk. St. varians* var.  $\beta$ . in *Mon. St.* n. 33.

2. puncto humerali sanguineo.

3. striga disci sanguinea.

4. striga humerali sanguinea.

5. striga laterali sanguinea.

*Pedes* nigri vel nigro-fusci; capitibus femorum anticis plerumque planatis, testaceis.

*Varietates* occurrunt intermediae, seriebus thoracis dorsalibus 4 punctis, statura parva 2 lin., elytris nigricantibus vel griseo-subsericantibus. Haec specimina forsan e copula huius *Staphylini* cum aliis minoribus orta sunt. *Species intermedia* inter *St. opacum* et *St. atratum* est *St. obscurus* M. p. 174., qui passim in Germania occurrit.

*Long.* 3 lin.

*Caput* latitudine vix paulo longius, thorace paulo vel duplo minus; punctis quibusdam in angulis baseos, et 4 interocularibus distinctis impressum; antennis, capitis thoracisque longitudine, palpisque obscuro-fuscis.

*Thorax* coleoptris minor, 1, 3, 5 punctus.

*Coleoptra* quadrata, nigra vel subfuscescentia, subtiliter puncta, subpilosella,

*Abdomen* coleoptris triplo longius.

*Pedes* fusi; capitibus femorum anticis interdum pallidioribus.

36. *St. immundus*, nitidus, niger; basi antennarum, palpis, et pedibus testaceo-rufis; capite suborbiculato; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

*Long.* 5 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace minus. Antennis; capite longioribus, fuscescentibus; articulo primo rufescente. Palpis rufescentibus.

*Thorax* colore fugacissimo griseo subsericans, seriebus 5, 3, 2 punctis.

*Coleoptra* quadrata, puncta, nigra, pilis tenuissimis griseis tecta, margine laterali pallido.

*Abdomen* subpilosellum, nigrum, marginibus segmentorum ventralibus rufis.

*Pedes* testaceo-rufi.

Habitat Parisiis — *Bosc, Desmarest*.

*Staphylinum* simillimum, capite vix paulo minore quam thorax, puncto quinto serierum dorsalium paulo remotiore et distinctiore  
Dom. *Sturm* mecum communicavit.

37. *St. celer*, niger, nitidus; antennis fuscis; pedibus rufo-testaceis; segmentorum marginibus

nibus ventre rufis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis; capite subouato.

*Long.* 3 lin.

*Caput* subouatum, thorace paulo angustius, nigrum; palpis antennisque fuscis, his capite duplo longioribus.

*Thorax* coleoptris paululum minor, nigricans, 5, 3, 1 punctus, punctis distinctis.

*Coleoptra* subdepilia, piceo-nigra.

*Pedes* tarsis tenuibus.

*Habitat* Parisiis — *Latreille*.

38. *St. Anthrax* M. p. 176.

39. *St. ochropus* M. p. 39.

40. *St. rufipes* M. p. 171.

41. *St. ebeninus* M. p. 170.

42. *St. carbonarius* M. p. 23.

43. *St. fumarius* *St. nitidus* niger, pedibus rufis; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus 6 punctis.

*Long.* 3 — 4 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace duplo minus, nitidum, nigrum; punctis 4 in angulis baseos distinctioribus, et 4 interocularibus impressum. Antennis, capite plus duplo longioribus, palpisque fuscescentibus.

*Thorax* orbiculatus, apicem versus paulo angustior, coleoptris minor; niger, nitidus; 2, 3, 6 punctus.

*Coleoptra* quadrata, minus nitida quam caput et thorax, subaenescens, pilis tenuissimis griseis vestita; puncta, punctis subtilioribus quam in *St. polito*.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, nigrum, nitidulum, pilosellum.

*Pedes* testaceo-rufi; capitibus femorum nigricantibus.

Habitat Brunsvigae; raro captus sub gramine ad ripas — *Dahl*.

Dom. Prof. *Knoch* mecum communicavit hanc notitiam: "*St. carbonarius* in collectione Hellwigiana (idem individuum, quod M. p. 25. descriptum est) cum *St. fumarii* specimenibus, quae Dom. *Dahl* legit, forma partium, punctura elytrorum, et colore pilorum, quibus totum corpus tectum est, congruit; thorax est 1, 3, 4 punctus. Individuis autem a Dom. *Dahl* lectis, thorax est 1, 3, 6 punctus; maiora sunt et latiora quam *St. carbonarius* in collectione Hellwigiana, pedibus pallidioribus; ergo speciei sunt peculiaris."

44. *St. nigrita*, nitidus, niger; thorace colore fugacissimo griseo sericante, seriebus dorsalibus sexpunctis.

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, latitudine paulo longius, thorace duplo fere minus; punctis paucis



paucis distinctioribus in angulis baseos, et 4 interocularibus impressum; nigrum; antennis, capite triplo fere longioribus, palpisque fusciscentibus.

*Thorax* omnino *St. micantis* (n. 69.) orbiculatus, apicem versus sensim angustior, coleoptris duplo fere minor; 2, 3, 6 punctus; niger, colore fugacissimo grifescente sericans.

*Coleoptra* quadrata, latitudine vix paulo longiora, nitidula, nigra, subpilosella, confertim et subtiliter puncta, minus attamen subtiliter quam in *St. micante*.

*Abdomen* coleoptris triplo longius; nigrum nitidum, subpilosellum.

*Pedes* nigri, tarsis fuscis.

Huius speciei indiuiduum modo vnicum in collectione mea possideo, et nusquam alibi haec species mihi occucurrit. De vitae eius genere plane sum nescius. — Forſan varietas *St. funarii* aut species spuria.

45. *St. Virgo* M. p. 169.

46. *St. umbratilis* M. p. 170.

47. *St. umbrinus* M. p. 169.

48. *St. poruicornis* M. p. 23.

49. *St. rigidicornis* M. p. 23.

50. *St. breuicornis* M. p. 22.

51. *St. nitidulus* M. p. 27.

52. *St. microcephalus*, nitidus, niger; pedibus rufis; capite suborbiculato; thorace seriebus dorsalis 4 punctis.

*Long.* 3 lin.

*Caput* latitudine paulo longius, thorace minus; nigrum; antennis, capitis longitudine, et palpis fuscis.

*Thorax* coleoptris paulo minor; 2, 3, 4 punctus.

*Coleoptra* quadrata, fuscescenti-nigricantia, subsericantia.

*Abdomen* nigrum, griseo-sericans; segmentorum marginibus ventralibus summis rufis.

*Pedes* rufi; capitibus femorum obscuris.

*Habitat* Parisiis — *Brongniart*.

53. *St. scintillans* nitidus, niger, subaenescens; capite paruo, oculis magnis; thoracis seriebus dorsalis tripunctis.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* thorace duplo fere minus, latitudine paulo longius, nigro-aeneum, nitidissimum; punctis 4 inter oculos, unoque distincto maiore in angulis baseos, impressum. Oculis magnis. Antennis, capite paulo longioribus, palpisque fuscis.

*Thorax* coleoptris paulo minor, suborbiculatus, apicem versus vix paulo angustatus, nigro-aeneus nitidissimus; 1, 2, 3 punctus.

*Cole-*

*Coleoptra* quadrata, puncta, subpilosella, nitida, nigricantia; marginibus lateralibus summis subrufescentibus.

*Abdomen* coleoptris triplo fere longius, nigrum, subpilosellum.

*Pedes* validi, fusci, tarsis anticis dilatatis.

Huius speciei vnicum modo indiuiduum in mea collectione exstat.

54. *St. boops* M. p. 21.

*Varietas* long. 2 lin. thoracis punctis subtilioribus, coleoptris subnigro-aenescentibus. —

Habitat Parisiis — Latreille, Bosc.

55. *St. cephalotes* M. p. 22.

*Thorax* subquadratus, angulis obtusis.

*Coleoptra* subdepilia.

Habitat Parisiis — Latreille.

56. *St. marginatus* M. p. 24.

Habitat etiam Parisiis.

57. *St. thoracicus* M. p. 170.

58. *St. ruficollis*, niger, nitidus, thorace rufo.

Long. 3 lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, nitidum, punctis perpaucis impressum, nigrum; antennis, capite longioribus, fuscis.

*Thorax* suborbiculatus, longitudine paulo latior, rufus, nitidissimus, coleoptris paulo minor; punctis duobus dorsalibus vnoque marginali impressus.

*Scutellum* rufum.

*Coleoptra* quadrata, crassius puncta, nitida, pilis perpaucis rigidioribus vestita.

*Abdomen* nigrum, nitidum; ano rufescente; segmentorum marginibus setis rarioribus longis erectis fimbriatis.

*Pedes* nigricantes; tarsis femorumque capitibus rufescentibus.

Habitat?

E collectione *Brongniartiana*.

59. *St. tenuis* M. p. 59.

60. *St. blandus* nitidus, rufus; capite pectore, coleoptris, anoque nigris.

*Long.* 3 lin.

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, nigrum; palpis antennisque fuscis, his capite paulo longioribus.

*Thorax*, testaceo-rufus, coleoptris paulo angulior, latitudine paulo longior; punctis, vno latere 5, 3, 2, altero 4, 3, 2, 1, exceptis adhuc quibusdam aliis vagis, impressus.

*Coleoptra* quadrata depilia nigra.

*Abdomen* segmentis tribus primis rufis, reliquis nigris.

*Pedes*, rufo-testacei.

Habitat in America septentrionali — *Knoch*.

61. *S. formosus* nitidus, rufus; capite, thorace, anoque nigris.

*Long.*

*Long.* 3 lin.

*Habitu* Staphylinorum fam. I. thorace autem quadrato.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, thoracis magnitudine, punctis perpaucis distinctis impressum, nigrum; antennis, capite longioribus, fuscis; ore rufescente.

*Thorax* quadratus, coleoptris breuior et paulo angustior, niger, punctis 5, 3, 2 distinctis impressus.

*Coleoptra*, latitudine paulo longiora, subpilofella, puncta, rufa.

*Abdomen* rufum, segmentis duobus vltimis nigerrimis; pectore rufo.

*Pedes* testacei, tarsis tenuibus.

*Habitat* in Carolina — *Bosc.*

62. *St. binotatus* niger, nitidus; elytrorum angulo apicis exteriori rufo; capite thoraceque multipunctis.

*Habitu* *St. rufipennis* e fam. II., statura autem graciliore, colore, nec non antennis gracilioribus differt.

*Caput* orbiculatum, thorace vix paulo minus; punctis, praecipue basi et lateribus, impressum; antennis extrorsum vix crassioribus, capitis et thoracis longitudine.

*Thorax*

*Thorax* coleoptris paululum angustior; suborbiculatus; punctus, subpuncto-liriatus, medio autem leuissimus.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, puncto-subcicatrica, pilis tenuibus sparsis griseis vestita.

*Pedes* nigro-fuscescentes; tarsis anticis dilatatis.

Habitat in Borussia — Hellwig.

63. *St. dubius* nitidus, niger; pedibus coleoptrisque rufis, his basi nigris; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

*Long.*  $2\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace paulo minus, nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, articulo primo rufescente.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, subpubescentia, rufa, margine humerali nigro.

*Pedes* picco-testacei; femoribus posticis, capitibusque femorum obscuris.

Habitat? Parisiis?

E collectionibus Bosciana et Latreilleana.

64. *St. lepidus* M. p. 31.

65. *S. flavopterus* nitidus niger; pedibus elytrisque testaceis; thorace seriebus dorsalibus quadripunctis; capite ovato.

*Long.*  $3\frac{1}{4}$  lin.

Habitu,

Habitu, partiumque forma ac proportione *St.* sequentis; abdomine autem crassiore et numero punctorum thoracis differt.

*Caput* et *thorax* vix subgriseo-sericant. Palpi rufi. Antennae rufescentes, articulo primo pallidiore.

Habitat Parisiis — *Brongniart*.

*St. flauopterus* Fourcr. Ent. Par. St. 10.

*Geoffr.* Hist. St. n. 10.

*Olivier* Ent. St. n. 36. t. IV. f. 40?

66. *S. fuluipes* M. p. 24.

*St. flauopterus* Ol. Ent. St. n. 36. t. IV. f. 40?

— — *Fourcr.* Ent. Par. St. n. 10.

var. A.

*Geoffr.* Hist. St. n. 10. var.

*St. fuluipes* Panzer F. G. H. 27. t. 9., monente *Sturmio* ipso, huc quidem referendus est, sed perperam exhibitus.

67. *St. vernalis*, nitidus, niger; palpis pedibus et antennarum basi rufis; thorace ovato, seriebus dorsalibus 5 punctis.

*Long.* 3 lin.

A. *S. micante* (n. 69.) thorace angustiore et paulo longiore; defectu coloris sericantis thoracis; pilis elytrorum et abdominis rarioribus; segmentorum marginibus haud rufescentibus; capitibus femorum, cum reliquis pedum partibus, testaceo rufis; distinguitur.

*Caput*



*Caput* onatum, thorace minus, punctis perpaucis impressum; nigrum; palpis testaceo-rufis; antennis, capite longioribus, fulcescentibus, articulo primo rufo.

*Thorax* subovatus, latitudine paulo longior, coleoptris paulo angustior, sed eorum longitudine; subtiliter 5, 3, 2 punctus; rarissime serierum dorsalium una 6 — altera 5 puncta.

*Coleoptra* subpilosella, paulo distinctius puncta, quam in *St. micante*, subquadrata, latitudine vix paulo longiora.

*Pedes* rufo-testacei; tibiis, tarsisque paulo obscurioribus.

Habitat, tempore vernali, sub lapidibus, in suffocatis — Göttingae — tempore aestivo sub foliis deciduis ad sepes, Brunsvigae — *Dahl*.

68. *St. albipes* M. p. 28.

69. *St. micans* M. p. 25.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  — 3 l.

*Caput* subonatum, latitudine paulo longius, thorace duplo fere minus; in angulis baseos punctum, punctis quibusdam distinctioribus; serie transversali inter oculos 4 puncta. Antennae, capite duplo longioribus, fuscis, basi rufescentibus; palpis rufo-fuscis.

*Thorax* orbiculatus, coleoptris minor, niger, colore fugacissimo flauescente sericans; 1, 3, 6 punctus.

*Colc-*

*Coleoptra* subquadrata, latitudine paulo longiora, nigricantia, pilis subtilissimis densis flauo-griscescente-sericantibus vestita; subtilissime puncta, ita vt punctura vix oculis armatis se prodat.

*Abdomen* coleoptris triplo fere longius, nigrum; sed pilis griscescentibus, vt elytra, vestitum; segmentorum marginibus ventralibus rufescentibus.

*Pedes* rufo-testacei; capitibus femorum fuscis. *Species spuriae*, seu varietates exstant intermediae inter hunc *Staphylinum* et quosdam alios, eg. *St. variantem* (n. 73.) et *lucidum* quae infra descriptae sunt.

*Varietates*, colore fugaci thoracis obsoletissimo et coleoptris minus pilosellis, habitant Norimbergae — *Sturm.* —

*Varietates* etiam occurrunt seriebus thoracis dorsalibus 5 punctis; punctis 2 ultimis interdum intervallo distincto a 3 primis remotis. —

Hae varietates forsan e copula cum *St. vernali* (n. 67.) ortae sunt.

70. *St. agilis*, niger, nitidus; apice elytrorum subfuscescente; thorace, coleoptris distincte angustiore, seriebus dorsalibus 5 punctis.

*Long.* 2 —  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* ovatum, thorace duplo fere minus, nitidissimum, punctis quibusdam in angulis  
baseos

baseos et 4 interocularibus distinctis impressum; antennis, capite duplo longioribus, palpisque cōcoloribus.

*Thorax* suborbiculatus, apicem versus angustior; coleoptris minor, et quidem magis quam in speciebus affinibus; convexior etiam esse videtur; nitidissimus; 1, 3, 5 punctus.

*Coleoptra* quadrata, nitida; confertissime et distinctissime puncta, pilis grisescentibus tenuibus vestita; nigricantia, apice fuscescente.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, nigrum, pilosellum.

*Pedes* nigro-fusci.

Habitat?

E mea collectione, quae duo huius speciei indiuidua possidet.

71. *St. nitens* M. p. 26.

Hic *Staphylinus*, cuius indiuiduum modo vnicum possideo, speciei praecedenti valde affinis, forsan eius varietas est. — Forma capitis et thoracis, nec non eorum proportio, eadem est ac in illo; punctura differt, seriebus dorsalibus thoracis 4 punctis; coleoptra sunt nigricantia, apice concolore; antennae et pedes paulo pallidiores, fusci.

*Varietas* capitis thoracisque colore fugacissimo grisescente forsan e copula cum *St. micante* (n. 69.) ortum ducit.

*St.*

*St. nitens* etiam cum speciminibus minoribus varietatis intermediae inter *St. variantem* et *micantem* (de qua vide n. 73.) copula fertili se miscere videtur; saltem mihi sunt duo microptera, quae inter illos *Staphylinos* medium tenent: *Caput* eis maius est *St. variantis*, antennis et palpis fuscescentibus. — *Thorax*, capite paulo maior, ratione formae medium tenet inter thoraces *St. variantis* et *agilis*; angustior est quam in illo, paulo latior quam in hoc; 1, 3, 5 punctus. — *Coleoptra* quadrata, thorace vix paulo maiora, confertim et distincte puncta; pilis tenuibus grisescentibus vestita; nitida, nigricantia, interdum subfuscescentia. — *Abdomen* coleoptris triplo longius, nigrum, pilosellum. — *Pedes* piceotestacei.

*Staphylinus* alter, verisimile varietas minor *St. nitentis*, hic est:

*Long.*  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, latitudine vix paulo longius, thorace minus, nigrum, nitidum; punctura praecedentium; antennis, capite duplo longioribus, palpisque fusco-rufis.

*Thorax* orbiculatus, apicem versus paululum angustior, coleoptris paulo minor, niger, nitidus; 1, 3, 5 punctus.

*Cole.*

*Coleoptra* subquadrata, latitudine paulo longiora; nigra, nitida, puncta; pilis tenuibus, sed rarioribus quam in *St. nitente*, vestita.

*Abdomen*, coleoptris plus duplo longius, nigrum, subgriseo-pilosellum, marginibus segmentorum rufescentibus.

*Pedes* piceo-rufi.

72. *St. finetarius* M. p. 175.

Haec species differt a speciebus affinis, thorace subquadrato, cum latitudine paulo longior et lateribus haud rotundatus sit; capite thoracis magnitudine vel perparum minore; pedibus testaceis.

*Caput* punctis interocularibus 4, rarius 3, intermedio maiore, impressum.

*Long.* 2 —  $2\frac{3}{4}$  l.

*Species intermedia* inter *St. finetarium* et *agilem*; *St. niger*, nitidus; coleoptris subaeneis; pedibus fuscescentibus; thoracis seriebus dorsalibus 5 punctis.

*Long.*  $2\frac{2}{3}$  lin.

Statura gracilis *St. agilis* (n. 70.); thorace autem minus convexo, elytris aenescentibus.

*Caput* suborbiculatum, latitudine vix paulo longius, thorace duplo minus; punctis baseos quibusdam, et interocularibus quatuor, impressum; antennis, capite duplo longioribus, palpisque nigro-fuscis.

*Thorax*

*Thorax* coleoptris minor, latitudine vix paulo longior; 1, 3, 5 punctus.

*Coleoptra* quadrata, subnigro-aenea; subtiliter puncta; pilis tenuissimis, nec confertissimis, grisescentibus vestita.

*Abdomen coleoptris triplo longius.*

*Pedes piceo-fusci, tarsis autem pallidioribus.*

Huius speciei intermediae individuum vnicum, Norimbergae captum, Dom. Sturm mecum communicavit.

*Species intermedia inter St. finetarium et micantem.*

Long:  $2\frac{1}{4}$  —  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nigrum, nitidum, punctura Staphylinorum praecedentium; antennis palpisque nigro-fuscis.*

*Thorax* subquadratus, vix apicem versus paulo angustatus, coleoptris paulo minor, niger, nitidus; 1, 3, 4 punctus.

*Coleoptra* subquadrata, latitudine vix paulo longiora, nitida, nigro-aenea, confertim puncta, pilis tenuibus vestita.

*Abdomen* elytris plus duplo longius, nigrum, nitidulum, pilosellum.

*Pedes* piceo- seu fusco- testacei, capitibus femorum obscurioribus.

Hic Staphylinus caput thoracem et colorem aenescentem elytrorum a *St. funetario* F. . . . . habet.

habet. Pili elytrorum rariores sunt quam in *St. micante*; crebriores quam in *St. fimetario*; puncta elytrorum subtiliora quam in hoc, crassiora autem quam in illo. Color pedum medium tenet inter colorem fuscum et testaceum.

*Varietates St. fimetarii* sunt etiam, *St. lucidus* (M. p. 21.) et *Staph. sordidus* (M. p. 176).

73. *St. varians* M. p. 20. niger, nitidus; elytris viridi-aeneis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis; capite subovato.

Long.  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

Differt a *St. praecedente*, capite subovato minore, thorace rotundiore, seriebus dorsalibus 5 punctis etc.

*Caput* subovatum, latitudine perpaulum longius; thorace minus; punctis vno alterone in angulis baseos, nec non 4 inter oculos, per paria oculo singulo approximatis, distinctis inpressum; antennis et oris partibus nigris.

*Thorax* suborbiculatus, coleoptris minor; 1, 5, 5 punctus.

*Coleoptra* quadrata, subtiliter nec confertissime puncta; pilis tenuissimis vellita, viridi-aenea.

*Scutellum* nigrum, punctum.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, subtilissime punctum, subpilosellum.

*Pedes*



*Pedes nigro-fusci.*

Haec species cum quibusdam aliis se miscere videtur, quo species spuriae oriuntur:

*Staphylinus intermedius* inter *St. variantem* et *sinetarium*; niger, nitidus; pedibus piceo-testaceis; elytris viridi-aeneis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis.

*Long.*  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus; punctis quibusdam in angulis baseos et 4 interocularibus distinctis impressum. Antennis, capite duplo longioribus, palpisque fuscis; articulo illarum primo rufo.

*Thorax* coleoptris minor, subquadratus, lateribus subrotundatis; apicem versus vix paulo angustior; 1, 3, 5 punctus.

*Coleoptra* latitudine vix paulo longiora, subviridiaenea, puncta, subpilosella.

*Abdomen* vt in specie praecedente.

*Pedes* fusco-testacei, femoribus posticis fuscis.

*Habitat* Norimbergae — *Sturn.*

*Staphylinus intermedius* inter *St. variantem* et *micantem* (n. 69.).

*Long.* 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* omnino *St. variantis*, nisi quod antennae et palpi subfuscescant, et illae basi paulo pallidiores sint.

*Thorax* omnino vt in *St. variante*.

*Coleoptra* subquadrata, latitudine paulo longiora, confertim puncta, pilis tenuissimis grifescens tecta, nitida, nigro - et interdum viridi-aenea; ratione puncturae et coloris coleoptris *St. variantis*, ratione vestimenti autem illis *St. micantis* respondent, quamquam pili multo rariore sunt.

*Abdomen* vt in *St. micante*; nec vero marginibus segmentorum ventralibus rufescentibus.

*Pedes* piceo - testacei; capitibus femorum, interdum etiam femoribus ipsis, fuscis.

*St. varians* etiam cum *St. atrato* (n. 74.) copula se iungere videtur, de qua ad n. 74.

*St. concinnus* M. p. 21. Species est intermedia inter *St. variantem* et *ebeninum* (n. 41.).

74. *St. atratus* M. p. 21, nitidissimus niger; elytris aenescentibus; capite orbiculato; thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

*Long.* 3 — 3½ lin.

*Statura* crassior quam *St. varians* (n. 73.).

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, nigro-aeneum; punctis 4 — 6 distinctioribus in angulis baseos, et 4 interocularibus, impressum; antennis, capite duplo longioribus, palpisque nigris.

*Thorax*

*Thorax* orbiculatus, apicem versus paululum angustior, coleoptris paulo minor, nigro-aeneus, distincte 2, 3, 4 punctus.

*Coleoptra* quadrata, puncta, pilis tenuissimis vestita, nigro-subviridi-aenea.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, subpilosellum.

*Pedes* nigri, tarsis fusciscentibus.

*Species intermediae* inter hunc et *Staph.* praecedentem longitudine et statura sunt intermedia, capite suborbiculato, minore quam in *St. atrato*, maiore quam in *St. variante*, seriebus dorsalibus thoracis vel 4 vel 5 punctis; elytris magis minusue viridi-aeneis.

*Species intermediae* inter *St. atratum* et *opacum* iam sub n. 35. descriptae sunt.

*St. atratus* et eius varietates intermediae occurrunt passim in Germania et Gallia.

75. *St. punctus* M. p. 20.

76. *St. politus* M. p. 17.

*St. politus* Linn. Fn. Suec. n. 343. non solum ad *St. politum* verum sed etiam ad *St. atratum*, forsitan etiam ad *St. cyanipennem* (n. 78.) referri potest; quod etiam de *St. polito* auctorum aliorum valet.

77. *St. decorus* M. p. 19. variat abdomine coloribus obscuro-metallicis aenescente, ut *St. tristis* (n. 11.) et *ruficornis* (n. 12.).

78. *St. cyanipennis* M. p. 168.

Patria varietatis huius *Staphylini*, capite maiore, quam e collectione *Knochiana* descripsi, America septentrionalis est.

Altera varietas, capite minore, reliquis characteribus autem cum illa prorsum congruens, habitat Parisiis et prope Fontainebleau, et est verus

*St. cyanipennis* Fabr. Ent. S. St. n. 29.

*St. amoenus* Ol. Ent. St. n. 32. t. IV. f. 36.

79. *St. metallicus* M. p. 168.

Varietas nigra nitidula; capite autem, thorace elytrisque nitidissimis obscuro-viridi-aeneis.

*Staphylinus* habitu et partium forma ac proportionem, nec non statura et magnitudine omnino *St. metallici*, capite autem suborbiculato, elytris nigro-aeneis, huius varietas est. — Habitat Parisiis — Latreille.

80. *St. aeneus* M. p. 17.

Variat pedibus antennisque nigris et, quamvis rarissime et unico tantum individuo e collectione *Latreilleana*, rufo-fuscis.

Specimina quaedam sunt in eadem collectione, tarsis anticis gracilioribus, capite minore, punctis subtilioribus, quae medium tenent inter *St. aeneum* et *politum*, atque gradatim in hunc et in illum transeunt.

81. *St. laminatus* M. p. 16.

*Species*

*Species intermedia* inter *St. laminatum* et *aeneum*: *St. niger*, nitidus; capite thoraceque nigro-viridanis; elytris aeneis; thoracis seriebus dorsalibus sub 4 punctis.

*Long.*  $3\frac{1}{2}$  lin.

Colorem et glabritiem thoracis capitisque a *St. laminato* habet; colorem elytrorum a *St. aeneo*. Thorax neque impunctus est, vt in illo, neque seriebus dorsalibus distincte 4 punctis impressus, vt in hoc; sed serierum dorsalium vna e punctis tribus, altera e punctis quatuor, quorum vnum fere euanescit, composita est; series laterales bipunctae sunt, et margini punctum vnum est impressum.

*Staphylinus* alter *intermedius* inter *St. laminatum* et *aeneum*, long.  $3\frac{1}{2}$  lin., colore quidem et deficientibus thoracis seriebus punctorum dorsalibus omnino cum *St. laminato* congruit; differt autem ab eodem, thoracis puncto marginali vno et seriebus lateralibus tripunctis.

Has duas varietates ego ipse prope a Parisiis prehendi.

*Varietates St. laminati*, thorace punctis quibusdam vagis impresso, etiam Parisiis habitant.

*Varietas*, elytris subcoeruleo-aeneis, in Borussia obuenit — Hellwig.

82. *St. splendens* M. p. 16.

*St.*

*St.* huic similis, statura autem paulo graciliore; long. 5 lin. niger, nitidus, thorace leuissimo; habitat in Borussia — *Hellwig*.

*Varietates* etiam exstant intermediae inter *St. splendentem* et *laminatum*.

83. *St. vagepunctus* nitidus, nigricans, levis, coleoptrorum disco vage puncto,

Long. 5 lin.

*Habitu* et partium forma atque proportionem medium quodammodo tenet inter familiam I. et III.; deficientibus autem punctis crebris capitis thoracis elytrorumque, quae omnibus familiae III. *Staphylinis* propria sunt, potius eum ad fam. I. delego,

*Caput* orbiculatum, thoracis magnitudine, nitidum, leue, punctis tantum paucis in baseos angulis impressum; antennis capitis longitudine.

*Thorax* conuexus, quadratus, angulis obtusis, coleoptris breuior et angustior, nitidus, levis, puncto vno laterali distincto impressus.

*Coleoptra* quadrata, nitida, depilia; excepto margine apicali, setis rigidis fimbriato; levia, margine laterali confertim puncto, disco vage puncto; nigricantia, margine summo laterali rufescente,

*Abdomen* nigrum, ano fusciscente.

*Pedes* fusciscentes.

Habi-

Habitat? — e collectione *Brongniartiana*.

*Varietas* coleoptris fuscescentibus; margine laterali pallidiore; pedibus segmentorumque marginibus fuscis.

E collectione *Latreilleana*.

84. *St. cinctulus* M. p. 167.

85. *St. dilatatus*, antennis ferratis.

Long. 9 lin.

Habitu omnino *Staphylinorum* huius familiae, sed peculiari modo ab omnibus differt.

Caput orbiculatum, thorace minus, nigrum; antennis, longitudine capitis, ferratis; articulo ultimo ovato (haud obtuso), apice rufescente.

Thorax coleoptrorum magnitudine, dilatatus (vt thorax *St. nitidi* n. 5.); niger, marginibus lateralibus subelevatis, subviridi-aenescentibus; 3, 3, 2 punctus; canalicula marginali deficiente vel, si mauis, in puncta subtilia decedente.

*Elytra* subtiliter puncta, nigra, subpilofella, puncto humerali testaceo, margine suturali fuscescente.

*Abdomen* subpilofellum.

*Pedes* tarsis anticis dilatatis.

Habitat Parisiis et Dresdae.

*St. dilatatus* Fbr. E. S. St. n. 12.

— — Payk. Fn. Suec. St. n. 29.

\*

\*



86. *St. stenoides*, nitidus; oculis magnis profolientibus.

*Long.* fere 6 lin.

Habitu ab omnibus *Staphylinis* mihi notis differt; cum autem thorax latitudine haud longior et seriebus punctorum dorsalibus impressus sit, eum, quasi appendicem, familiae I. adiungo.

*Caput*, forma tota capitis *Stenorum*, orbiculatum et, oculis magnis globosis, fere transversum, thorace latius; punctum, viridi-subcupreo-aeneum, subtus nigrum; clypeo, labro et primo antennarum articulo (reliqui articuli defunt) testaceis; mandibulis falcatis, longis, acutis, nigris; maxillis nigris, apice rufo-testaceis; palpis longis, gracilibus, filiformibus; articulis duobus ultimis, aequali longitudine et crassitie, haud clauatis; articulis omnibus nigris, summo apice rufo-testaceo.

*Thorax* convexus, quadratus, basi rotundatus et paulo angustior quam apice, coleoptris angustior et breuior; nitidus, viridi-aeneus, in angulis apicis multipunctus, seriebus dorsalibus sexpunctis et praeterea punctis quibusdam vagis maioribus impressus.

*Scutellum* pallide viridi-sericans.

*Coleoptra* quadrata; elytris planiusculis, punctis, viridi-cupreo-aescentibus, macula magna disci pallida viridi-sericante.

*Abdomen* nigrum; pectore sub-flauo-sericante; segmentorum marginibus testaceis.

*Pedes* graciliores quam reliquis *Staphylinis*; capitibus femorum nigris; femoribus anterioribus testaceis, margine superiore nigro, posticis testaceis, geniculis nigris; tibiis anterioribus testaceis, margine superiore nigro, posticis testaceis, apice nigro; tarsis obscuris, anticiis fossoriis.

Habitat lauae — *Bosc.*

87. *St. fulgens*, nitidus, cyaneus.

Long.  $7\frac{1}{2}$  lin.

Habitu peculiari. Species, quae mihi locum aptissimum inter familiam I. et II. obtinere videtur.

*Caput*, collo angusto cum thorace cohaerens, ouatum, thoracis magnitudine; subtus laeuissimum nitidissimum; supra setis tenuibus vestitum, punctum, punctis confertis distinctissimis; oculis parvis orbiculatis; mandibulis validis, exsertis, in medio dentibus duobus armatis; articulis palporum validis breuibus. Antennae desunt (Antennae primo articulo longissimo cyaneo, vltimis breuibus nigris — *Fabr.* loco citato).

Thorax

*Thorax* coleoptris angustior et paulo brevior, conuexus, ouatus, apicem versus valde attenuatus, nitidus, punctis vagis subtilibus impressus, marginibus lateralibus basin versus subelevatis.

*Coleoptra* rectangula, nitida, puncta, punctis haud confertissimis; pilosella, pilis singulis e puncto singulo nascentibus.

Habitat Cayennae — *Bosc.*

*St. fulgens* Fabr. E. S. St. n. 13.

*St. violaceus* Olivier Ent. St. n. 3. tab. I. f. 3.

#### FAMILIA II.

Comprehendit Staphylinos familiae IV. M. p. 40.

Habitu sunt graciliore; capite, thorace coleoptrisque, ratione proportionis, longioribus quam in familia I.; antennarum articulus ultimus semper ouato-acutus est, qui quidem etiam in nonnullis minoribus familiae praecedentis speciebus ouatus esse videtur, nunquam autem acuto-ouatus — Reliqua, quae hic adhuc monere possem, supra, ubi generaliter de Staphylinis locutus sum, iam dixi.

88. *St. denigrator* niger, nitidus, pedibus piceis, thorace seriebus dorsalibus 4 punctis.

*Long.*  $2\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* ouatum, thorace minus, lineolis et foveolis (quae in specie sequente describuntur)

tur) deficientibus, punctis subtilibus quibusdam pone oculos et 4 inter oculos impressum; antennis fuscis, capite paulo longioribus.

*Thorax* latitudine longior, subonatus, apicem versus paulo angustatus, coleoptris paulo angustior; 2, 4, 4 punctus.

*Coleoptra* quadrata, puncta, pilosella.

*Abdomen* coleoptris quadruplo longius.

*Pedes* picei, femoribus paulo pallidioribus.

Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

*St. denigrator* — *Knoch*.

89. *St. splendidulus* M. p. 41.

*Caput* latitudine longius, apicem versus paululum angustius, thoracis magnitudine, lateribus punctum; foveolis duabus longitudinalibus ante antennis, praetereaue lineola, a margine inferiore oculorum (i. e. margo, qui os versus spectat) suboblique ascendente, impressum.

*Thorax* coleoptris paululum angustior et breuior, oblongus, vix basin versus paululum angustior.

*Coleoptra* rectangula.

Haec addenda sunt ad descriptionem huius *Staphylini* in M. p. 41.

A speciebus reliquis parvis huius familiae haec species, foveolis atque lineolis frontilibus,

libus, a *St. lineari* (n. 94.) punctura thoracis differt et bene distinguenda est.

90. *St. nigrutilus* M. p. 41.

Caput thorace paulo minus, subouatum, latitudine paulo longius; punctis paucis in angulis baseos, vestigiisque obsoletissimis linearum et foveolarum frontaliū (vide n. 87.). impressus; antennis capitis thoracisque longitudine.

Thorax subouatus, latitudine paulo longior, apicem et basin versus paululum angustior, coleoptris breuior et angustior; seriebus dorsalibus 5 et 6 punctis.

Elytra latitudine duplo longiora, puncta, subpilosella.

Differt a *St. praecedente* et *lineari* fronte leui; a *St. procerulo* (n. 92.) punctura thoracis et capite minore; a *St. paruulo* (n. 91.) colore, magnitudine, thoracisque forma.

*St. aterrimus* M. p. 41. a *St. nigritulo* non nisi capite paulo maiore, magnitudine nempe thoracis; colore antennarum pedum et palporum paulo obscuriore, differt; quapropter hunc *St. aterrimum* cum illo reiungo.

Varietatem huius Staphylini fuscā; basi antennarum, palpis, ano, pedibusque pallidioribus; capite atro; Dom. Sturm mecum communicavit.

91. *St. paruulus* M. p. 42.

Praeter colorem, magnitudine etiam maiore, longitudine scilicet 2 lin., et forma thoracis, apicem versus haud angustioris, a *St. praecedente* differt; reliquis autem characteribus cum eo congruit.

*Specimina* etiam sunt *intermedia*, quae, characteribus distinctivis, medium tenent inter *St. paruulum* et *nigritulum*.

*Staphylinus alter*, coleoptris totis nigris, reliquis partibus autem *St. paruulo* prorsum similis, varietas eius esse videtur. — Captus est Norimbergae — *Sturm*.

Verum *Staph. paruulum* Dom. *Sturm* mecum communicavit sub nomine *St. bicolor* Fabr. Ent. S. St. n. 47.; et forsan eadem species est.

92. *St. procerulus* niger, nitidus, pedibus elytrisque picescentibus; thorace multipuncto.

Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* subquadratum, angulis obtusis, thorace vix paulo latius sed eius longitudine; multipunctum, medio leuissimum, vestigiis obsoletis linearum et foveolarum frontis; antennis, capite duplo longioribus, palpisque fuscis.

*Thorax* subquadratus, latitudine paulo longior; coleoptris paulo angustior et breuior;  
late-

lateribus multipunctus, punctis vero haud confertis.

*Elytra* latitudine duplo longiora, subpilosella, puncta; fuscescentia, apicem versus sensim pallidiora.

*Abdomen* nigrum, segmentorum 2 ultimorum marginibus piceo-fuscescentibus.

*Pedes* piceo-testacei.

Habitat Brunsvigae.

Differt a *St. splendidulo* (n. 87.) et *lineari* (n. 94.) fronte leui; a reliquis parvis conspeciebus affinibus capite maiore et punctura thoracis.

93. *St. nanus* niger, nitidus; palpis, antennarum basi, pedibus et ano rufo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus 5 punctis; capite subouato.

*Longitudo* et *statura* *Staph. paruuli* (n. 91.) capite autem minore.

*Caput* subouatum, thorace paulo minus; antennis fuscis, basi rufis.

*Thorax* latitudine paulo longius, subrectangulus.

*Coleoptra* latitudine paululum longiora, depilia, obscuro picescentia.

*Abdomen* nigrum; marginibus segmentorum, praecipue ultimorum, rufescentibus.

*Pedes* rufescentes, capitibus femorum obscurioribus.



E collectione *Hellwigiana*.

94. *St. linearis* M. p. 43.

95. *St. ochraceus* M. p. 43. nitidus; thorace lateribus multipuncto, seriebus dorsalibus 12 — 16 punctis.

Long.  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.

Hic *Staphylinus* a *St. elongato* (n. 93.) differt statura graciliore et proceriore, nec non punctura crebriore et multo subtiliore.

*Caput* elongatum, apicem versus sensim angustatum, subtilissime punctum, nec vero confertissime.

*Thorax* coleoptris paulo minor, basin versus vix paulo angustior; lateribus punctis subtilissimis multis inordinatis impressus, quorum attamen nonnulla interdum iam in arcum distinctum litui disposita apparent.

*Coleoptra* rectangula, puncta, pilis rarioribus et perbrenibus vestita.

*Abdomen* coleoptris triplo vel quadruplo longius; quo contracto statura crassior esse videtur.

*Color* variat:

1. niger; antennis, palpis, coleoptris pedibusque fuscis;

2. niger; antennis, palpis pedibusque rufescentibus;

3. abdomine et thorace fuscis; capite atro; coleoptris picescentibus; pedibus palpis antennarumque basi rufescentibus.

*Staph. linearis* Fbr. El. St. n. 51.

*St. longiceps* M. 177. huius speciei varietas est, nam inter specimina plura, quae Parisiis vidi, quaedam in hunc *Staphylinum*, seu *St. ochraceum* thorace numerosissime puncto, quaedam in *St. ochraceum* punctis thoracis paucioribus transibant.

De Speciminibus intermediis inter *St. ochraceum* et *elongatum* vide n. 98.

96. *St. punctulatus* M. p. 177.

97. *St. eminescus* M. p. 176.

98. *St. elongatus* M. p. 45. nitidus, ater; elytris puncto-striatis; thorace seriebus dorsalibus 5-7, lateralibus 6-8 punctis, lituiformibus.

Long.  $2\frac{1}{2}$  —  $3\frac{1}{3}$  lin.

Statura crassiore, nec non punctura rariore sed crassiore a *St. ochraceo* satis differt.

Caput forma et proportionem omnino ut in *St. elegante* (n. 104.); punctis autem crassioribus, distincte paululum in longitudinem extensis, impressum.

Thorax coleoptris paulo minor, oblongus, haud basin versus angustatus; seriebus dorsalibus 5 — 7 punctis, lateralibus apice incurvis lituiformibus, 6 — 8 punctis; praeterea,  
in

in angulis apicis, series punctorum 5 — 6 subtiliorum, subarcuata, seriei dorsali adnexa, quodammodo cum hac lituum maiorem, minus autem curvatum, format.

*Coleoptra* rectangula, puncto-striata; striis 12.

*Abdomen* coleoptris triplo longius.

*St. punctulatus* Payk. Fn. Suec. St. n. 17.

— — — — — *Fabr.* Ent. S. St. n. 45.

De omnibus varietatibus *St. elongati*, quarum (M. p. 45.) mentionem feci, sola varietas 5 verus est *St. elongatus*, et reliquis frequentior occurrit.

*Specimina intermedia* inter hunc et *St. ochraceum* colore sunt pallidiore, statura et punctura intermedia, punctis pluribus et subtilioribus quam in *St. elongato*, paucioribus et crassioribus quam in *St. ochraceo*. — Huc pertinent var. 1 — 4 in M. p. 45. Haec specimina intermedia Dom. Prof. Knoch *St. ochraceus* nominavit; verum autem *St. ochraceum* meum *St. batychnus*.

*Staphylinus* quidam, cuius individuum vnicum e Gallia retuli, *St. elongato*, forma, proportionem et punctura tam capitis quam thoracis et elytrorum omnino similis est; longitudine autem tantummodo  $1\frac{2}{3}$  lin. niger, nitidus; elytris nigro-piceis, in angulo apicis ex-

terno subpallidioribus; antennis fusco-rufis; pedibus rufo-testaceis.

99. *St. glaber* M. p. 46. niger, nitidus; elytris rufo-testaceis; thorace seriebus dorsalibus 3 punctis.

*Caput* forma et proportionem ut in specie praecedente, nigerrimum, nitidissimum, punctis perpaucis vagis, multo rarioribus quam in *St. elongato* et *St. elegante* (n. 104.) impressum.

*Thorax* forma et proportionem ut in *St.* praecedente, nigerrimus, nitidissimus, 3, 5, 3 punctus; serie marginali et laterali se appropinquantibus apice.

*Coleoptera* rectangula, nitidissima, pilis perpaucis et perbreuibibus vellita; rufo-testacea; lateribus subpuncto-striata, punctis autem ferè obsoletis.

*Abdomen* nigrum, nitidum, coleoptris plus triplo longius.

*Pedes* fusi.

*Variat* hic *Staphylinus punctura*.

1) Serierum thoracis dorsalium punctis hic vel illic confluentibus; seriebus lateralibus evanescentibus; elytris punctis.

2) Thoracis seriebus dorsalibus 9—10 punctis; lateralibus et marginalibus saepe interruptis, distincte attamen in lituum coniunctis; elytris vix punctis quibusdam impressis.

100. *St. glabratus* M. p. 173.

101. *St. lentus* niger, nitidus, coleoptris pedibusque rufis; capite quadrato.

*Long.* 3 lin.

*Caput* quadratum, maius quam in speciebus praecedentibus, thoracis circiter magnitudine, nigerrimum, nitidissimum; punctum, nec vero confertissime, punctis lateralibus in series obsoletas subdispositis. Antennis palpisque rufo-fuscescentibus.

*Thorax* coleoptris paulo minor, basin versus subangulatus, ita vero, ut, superne visus, medio paulo impressus appareat; nigerimus nitidissimus; 3, 5, 7 punctus, punctis autem minutis subobsoletis, serie attamen laterali cum serie marginali in lituum subconiuncta.

*Coleoptra* nitida, rectangula, subpilosella, distincte puncta, testacea.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, nigerimum, nitidum.

*Pedes* rufi.

Huius speciei individuum vnicum tantummodo in mea collectione exstat.

102. *St. relucens* nitidissimus, nigerrimus; antennis tarsisque fuscis; elytris pallido-castaneis; thorace seriebus dorsalibus 6—9 punctis.

*Long.* 5 lin.

Habitu

Habitu partiumque forma et proportionem *St. glabri* (n. 99); punctis autem paucioribus capitis et elytrorum, pedibus obscurioribus, et magnitudine differt.

*Caput* nigrum; labro et palpis rufis; antennis fuscis opacis, articulis 5 primis nitidis.

*Thoracis* serierum dorsalium una interdum 6 - altera 9 - puncta; seriebus lateralibus 5 - 6 punctis; seriebus marginalibus valde variantibus.

*Coleoptra* puncta, punctis in series subdispositis.

*Pedes* nigri vel obscuro-fusci, tarsis pallidioribus.

Habitat Parisiis — *Bosc.*

105. *St. pyropterus* nitidissimus, niger; coleoptris rufis; thorace seriebus dorsalibus deficientibus, lateralibus crenato-firiatis.

*Long.* 4 lin.

Habitu specierum praecedentium.

*Caput* subquadratum, latitudine paulo longius; punctum, punctis crassis, confluentibus, in series subdispositis; nigerrimum; palpis rufescentibus; antennis, longitudine capitis, fuscescentibus, opacis, articulis tribus primis, quorum primus longus est, nigris nitidis.

*Thorax* basin versus angustior; serie laterali crenato-fulcata, arcuata, distincta; serierum dorsalium vestigia solummodo, puncta scili-

scilicet duo confluentia distincta, ad apicem thoracis impressa sunt.

*Elytra* rufo-testacea, leuia; bipuncto-striata, punctis subtilibus.

*Pedes* tarsis anticis tenuibus.

Habitat Parisiis — *Bosc. Latreille*.

104. *St. elegans* M. p. 46. nitidus; thorace basin versus sensim angustato, seriebus dorsalibus et lateralibus multipunctis; coleoptris punctis pedibusque testaceis.

*Caput* subtiliter nec vero confertissime punctum, medio leuissimum; foveolis et lineis (sub n. 37. descriptis) distinctissimis impressum.

*Thorax* nitidissimus; seriebus dorsalibus 8 — 12, lateralibus 8 — 10 punctis, praetereaque punctis pluribus inter seriem lateralem et marginem, interdum etiam quibusdam inter seriem dorsalem et lateralem disseminatis, impressus. Haec puncta omnia, crassitie aequali, illis in capite similia sunt.

*Coleoptra* subquadrata, nitida, pilosella, puncta, nec vero puncto-striata.

*Abdomen* coleoptris quadruplo longius, subtilissime punctum, pilosellum.

*Color* huius speciei in elytris et pedibus semper rufo-testaceus est, in reliquis partibus autem variat:



1) Capite nigerrimo, antennis palpisque fuscis; thoracis apice rufo, basi nigricante; abdomine nigricante, segmentorum marginibus ventralibus rufis.

*St. tricolor* Payk. Mon. St. n. 15.

2) Capite et thorace obscuro-rufo-fuscescentibus; abdominis dorso fusco, ventre rufo-testaceo.

*St. affinis* Payk. Mon. St. n. 16. v. 2. et 3.

5) Capite fusco, basi rufescente; thorace rufo; abdominis dorso fusco, ventre rufescente.

In quibusdam huius speciei individuis, quorum thorax nempe punctis paucioribus impressus est, series laterales iam sublituiformes euadunt.

Sub nomine *St. elegans* Oliv. in collectione *Bosciana Paederum castaneum* vidi; quapropter adhuc dubito, an *Staph. elegans* Oliv. ad hanc speciem referri possit.

Habitat Parisiis et Brunsvigae, vbi Dom.

*Dahl* plura huius speciei individua legit.

105. *St. rufipennis* M. p. 40.

106. *St. fulvipennis* niger, nitidus; palpis, antennis, elytris, pedibusque rufis; capite thoraceque multipunctis.

Longitudo et habitus *St. elegantis* (n. 104.), capite autem minore etc. differt.

Caput

*Caput* ovatum, thorace brevius, eius autem latitudine, nigrum, multipunctum; antennis, capite longioribus, palpisque rufis.

*Thorax* multipunctus.

*Coleoptra* puncta, apice subpuncto-striata; testaceo-rufa, basi subobscuriora.

*Pedes* rufo-testacei.

Habitat in Borussia — Hellwig.

107. *St. fulminans* M. p. 47., nitidus, thoracis punctorum seriebus dorsalibus deficientibus.

Long.  $3\frac{1}{3}$  — 5 lin.

*Caput* ovatum, thoracis magnitudine; in angulis baseos punctis numerosis parvis, serie interoculari punctorum 4 valde exilium, et punctis 2 maioribus inter seriem illam et clypeum, impressum.

*Thorax* rectangulus, magnitudine coleoptrorum, punctis 2 minoribus angulos apicis versus, vnoque maiore versus angulos baseos, impressus.

*Coleoptra* rectangula, pilis tenuibus rarioribus vestita, punctis numerosis, nec vero confertissimis, impressa.

*Color* variat:

1) Fuscus; antennis, palpis, thorace, coleoptris, ventre et pedibus rufescentibus.

2) Ni-

2) Niger; antennis, palpis, thoracis et coleoptrorum lateribus, marginibus segmentorum ventralibus, pedibusque rufescentibus.

3) Niger; abdomine obscuro-fusco, ano rufo; limbo coleoptrorum, pedibus, antennis et palpis rufis.

4) Niger; antennis, palpis, puncto in angulo apicali thoracis; elytris, pedibusque rufis.

5) Niger; ore, antennis, pedibus et coleoptris testaceis; summis angulis baseos capitis, segmentorumque marginibus, vel ventre toto, fusco-testaceis.

Varietates 1, 2 et 4 habitant Brunsvigae — *Dahl*.

Varietas 3 est *St. ustulatus* M. p. 46.

Varietas 5 habitat Norimbergae — *Sturm*.

*St. fulgidus* Payk. Mon. St. n. 14. var.  $\beta$ .

*Paederus fulvipennis* Fabr. Ent. Syst. P. n. 4.

————— *Panzer* Fn. Germ. H. 27.

t. 23? confer M. p. 44.

108. *St. fulgidus* M. p. 48.

*St. fulgidus* Fbr. Ent. S. St. n. 25. species alia esse videtur; statura enim et magnitudine cum *St. polito* comparatur. Forſan varietas est *St. nitidi* aut *coeniosi*.

*Schaeffer* Inf. Ratisb. Vol. I. t. 39. f. 12. confer *Panzer* ad *Schaefferum*.

Habitat etiam Parisiis — *Latreille*.

109. *St. alternans* M. p. 48.

110. *St. palmula* M. p. 49.

111. *St. melanocephalus nitidus*; thorace punctorum seriebus dorsalibus nullis.

*Long.* 2 —  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* suboblongum, thorace paulo brevius; punctis 2 magnis ante clypeum, 4 minoribus inter oculos impressum; nigerrimum, nitidum; oculis parvis; antennis capite longioribus; palpis subacuminatis, articulo ultimo graciliori quam penultimus, quo transitus e hac Staphylinorum familia ad Lathrobia ostendi videtur.

*Thorax* oblongus, coleoptrorum magnitudine, nitidus; seriebus marginalibus 3 punctis; punctis 3 etiam lateralibus, quorum 2, ad apicem sita, a tertio, basi multo propiore quam apici, longe remota sunt;

*Coleoptra* nitida, distincte puncta, pilis tenuissimis rarioribus vestita.

*Abdomen* coleoptris triplo longius.

*Pedes* testacei.

*Color* variat:

1) Caput nigrum, antennis palpisque rufis. Thorax rufus, disco paulo obscuriore. Coleoptra fusca, futura rufa. Abdomen nigricans, pectore et marginibus segmentorum ventralibus rufis.

2) *Corpus fuscum. Caput atrum. Antennae, palpi et thorax fusco-rufi. Venter et pectus testacei.*

3) *Nigricans. Caput atrum; antennis palpisque rufescentibus. Thorax et venter rufo-fusci. Elytra piceo-fusca. Pectus testaceum.*

Omnes hae varietates habitant promiscue sub gramine in pratis et ad fossarum ripas; Brunsvigae — *Dahl.*

*St. melanocephalus* — *Knoch.*

Primo intuitu hunc *Staphylinum* pro varietate *St. alternantis* habueram, ob thoracis puncturam, quae in hoc eadem est ac in illo; sed capite minore nec quadrato et elytris distincte punctis satis ab illo differt. — Cum *St. fulminante* (n. 107.) autem, tam forma et proportionem quam punctura partium. adeo congruit, ut, ratione non habita coloris pervariabilis, non nisi paruitate ab eo discrepet.

\*

\*

112. *St. planatus* planus, subopacus, niger; pedibus antennisque rufescentibus; coleoptris apice dilucido-testaceis.

*Long.*  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, planum, subtiliter punctum; thoracis latitudine, opacum, nigrum; antennis, capite longioribus,

extror-

extrorsum subcrassioribus, fusciscentibus, basi rufis; palpis rufis.

*Thorax* suborbiculatus, vix latitudine paulo longior, et basin versus subangulatus, coleoptris paululum minor, subtiliter punctus, niger, disco depresso.

*Coleoptra* rectangula, thorace paulo longiora, nitidula, subtiliter puncta, basi nigra, apice dilucido testacea.

*Pedes* rufi.

Habitat in Borussia — Hellwig.

### FAMILIA III.

Comprehendit plurimas species familiae II. Staphylinorum M. p. 3., exceptis nempe illis, quarum corpus vel sammetino-nebulosum vel villosum est.

Staphylini huius familiae, quae, cum familia sequente et familia quinta, maxima huius generis microptera continet, thorace quadrato, confertim et confuse puncto, a fam. I. differunt, cuius species thoracem habent vel lenissimum, i. e. sine vlla impressione, vel punctis solummodo perpaucis, plerumque in series distributis, impressum. Praeterea Staphylini huius familiae statura sunt magis lineari, nitore minus splendido, quam illi familiae primae. — Cum Staphylinis familiae secundae haud confundi possunt,

sunt, licet paucis thorax latitudine paulo longior sit (e. g. *St. castanoptero*); nitore, punctura, antennarumque articuli vltimi forma semper distinguuntur.

113. *St. tricolor*. M. p. 7.

In collectione *Bosciana* duos vidi *Staphylinos*, *St. tricolori* similes, quorum vnus statura tantum graciliore long. 6 lin. coleoptris subrectangulis, segmentorum penultimo et antepenultimo haud fimbriatis; alter autem pedibus fere nigris, tarsis et antennis fuscis, elytris subcyanescentibus, se distinguebat; ambobus autem caput quidem thorace paulo minus, nec vero multo minus erat.

*St. erythropus* Payk. Fn. Succ. St. n. 7. huius speciei varietas est "capite thorace elytrisque nigro-virescentibus, pedibus rufis." Paykull ipse dicit. "Individuum vnicum, huic simile, e Gallia mihi missum, vidi elytris obscure coeruleis praeditum." In Gallia autem haec species frequentius occurrere videtur.

*St. haemorrhoidalis* Olivier Ent. St. n. 7. tab. II. f. 20., et

— — — — — *Fabr.* Eleuth. St. n. 33.  
huic valde similis esse videtur, sed patria eius Cayenna est.

114. *St. cyaneus* M. p. 6.

115. *St. violaceus* M. p. 162.



116. *St. macrocephalus* M. p. 160.

117. *St. olens* M. p. 4.

118. *St. tomentosus* M. p. 161.

119. *St. similis* M. p. 5.

De synonymia huius micropteri multa mihi dubia orta sunt.

*St. similis* Payk. est *St. morio* (n. 121.) quia "capite et thorace politis" describitur.

*St. similis* Olivier eodem iure ad *St. morio* nem relegatur.

Geoffroy dicit quidem de suo *St. simili*, n. 3., articulum ultimum antennarum subglobosum, nec, ut in speciebus praecedentibus (*St. olens* et *cyaneus*) lunulatum esse; fallacia autem optica deceptus est, altera enim positione, antennarum nempe latere angustiore (nam antennae omnium horum micropteriorum compressiusculae sunt) oculum versus directo, articulus ultimus ovatus esse videtur; altera vero, latere nempe latiore antennarum oculum versus directo, articulus ultimus lunatus se ostendit. Certo autem Geoffroy *Staphyl. similem* verum descripsit, dicit enim, inter alia, "elytris thorace brevioribus; capite thorace et elytris punctulatis; longitudine 6 linearum."

*Staphylinum Schaefferi* Inf. Ratisb. Vol. I. t. 39. f. 12. Dom. Panzer pro *St. simili* habet.

*Staph.*

*Staph. similis* verus autem statura est maiore, thorace latiore; credo ergo, Dom. Schaeffer, tabula et figura citata, *St. morionem* exhibuisse.

In omnibus collectionibus Entomologorum Parisiensium *St. morionem* sub nomine *St. similis*, nunquam autem verum *St. similem*, vidi. — Hic ergo vbique multo rarior esse videtur quam ille, qui apud nos quidem rarior occurrit.

120. *St. ater* M. p. 161.

Species, huic Staphylino, qui Dom. Prof. Knoch ex America septentrionali missus est, simillima, nec vlllo caractere ab eo differens, habitat etiam Parisiis — Latreille — et Norimbergæ — Sturm.

121. *St. morio* M. p. 6.

Confer quae sub n. 116. monui.

122. *St. baltimorensis* M. p. 163.

123. *St. fuscatus* M. p. 164 et

*St. crassicollis* M. p. 7. in vnam speciem redigendi sunt.

124. *St. brunnipes* niger, opacus; capite thoraceque nitidis; antennis fuscis, basi et apice rufis; pedibus rufis.

Long. 5 lin.

Statura partiumque forma et proportionem omnino *St. aeneocephali* (n. 126.); thorace forsau paulo conuexiore.

Caput

*Caput* orbiculatum, thorace minus, sed eius latitudine, nitidum, aeneum, punctum, linea media longitudinali leui obsoleta; palpis antennarumque articulis 2 ultimis et primo rufis.

*Thorax* quadratus, angulis obtusis; aeneus, nitidus, punctus, linea media longitudinali leui obsoleta.

*Coleoptra* et *abdomen* opaca, nigra, tenuissime sericantia; illa thorace breviora, sed eius latitudine, subtransversa, punctis crebrioribus et subtilioribus impressa quam thorax.

*Pedes* rufi; capitibus femorum nigris.

Habitat Parisiis.

*St. brunnipes* Fabr. Ent. S. St. n. 25.

— — Olivier Ent. St. n. 11. tab. 1. f. 7.

125. *St. pedator* M. p. 165.

126. *St. aeneocephalus* M. p. 8.

*St. chalconcephalus* Fbr. Eleuth. St. n. 17.

*St. cupreus* Rossi Fn. Etr. I. p. 248. St. 612. tab. 7. f. 13.

— — Olivier St. n. 16. tab. 2. f. 16. varietas est quinta M. p. 8. Vidi hanc speciem in ipsa collectione Olivieriana.

127. *St. cinnamopterus* M. p. 164.

128. *St. zonatus* M. p. 162.

129. *St. latebricola* aeneo-nigricans; elytris pedibusque rufis.

Long. 4 — 5 $\frac{3}{4}$  lin.

*Habitu*, longitudine, atque partium forma et proportionem omnino *St.* sequentis; colore autem satis differt.

*Caput* nigricans, sub-cupreo-nitidum, pilis confertis subtilibus testaceo-flauescentibus sericans; linea longitudinali media obsoleta leui; clypeo testaceo; palpis vel rufis vel nigricantibus.

*Thorax*, colore et vestimento capitis, linea media longitudinali, leuissima, nitidissima, ante scutellum latiore.

*Coleoptra* rufa, pilis breuibus pallidioribus vestita.

*Scutellum* nigro-sammetinum.

*Abdomen* nigrum, basi segmentorum plerumque pilis breuissimis flauo-griseo-sericantibus vestitum, qui interdum cum interuallis nudis alternant et seriem triplicem macularum sericantium dorsaliū abdominis formant. Pectore nigro, pilis tenuibus flauo-griseis vestito.

*Pedes* capitibus femorum cum femoribus magis minusue nigricantibus, apice rufescentibus; tibiis rufis; tarsis plerumque paulo obscurioribus.

Habitat Brunsvigae, lectus saepius in syluis, in aceruis formicarum rufarum — *Dahl.* —

Occur-

Occurrit etiam in Borussia, vnde Dom. *Kugelann* hanc speciem Dom. Prof. *Hellwigio* milit.

130. *St. stercorearius* M. p. 11.

*Variat* antennis vel rufis, vel fuscis basi interdum pallidiore; maculis segmentorum sericeis vel distinctis vel obsoletis, vel prorsum evanescentibus.

Habitat Parisiis, Brunsvigae, Göttingae.

131. *St. lutarius* niger; abdomine sericeo-maculato; capite et thorace aeneis; palpis, antennis, elytris, tibiis, tarsisque testaceo-rufis.

*Habitu* partiumque forma proportionem et punctura *St. praecedentis*; statura autem maiore (qua etiam a *St. latebricola* n. 129. differt), capite thoraceque orichalceo-nitidis, subflavo-sericantibus; femoribus et antennarum articulo primo obscurioribus.

*Long.* 7 — 8 lin.

*Corpus* subpilosellum.

*Caput* thorace minus, apicem versus paulo angustius, aeneum; mandibulis nigris; palpis rufis; antennis, capitis longitudine, rufescentibus, articulo primo nigricante.

*Abdomen* nigrum; dorso maculis duabus segmentorum singulorum, ventre marginibus segmentorum pectoreque flavo-sericantibus.

H. 2

*Pedes*

*Pedes nigri; capitibus femorum et femoribus flavo-sericantibus, geniculis rufescentibus; tarsis tibiisque testaceo-rufis.*

*Habitat? e collectione Latreilleana.*

132. *St. castanopterus* M. p. 10.

*St. erythropterus* De Geer Mem. St. 8.

— — Fourcr. Ent. Par. St. 9.

Geoffr. Hist. St. 9.

133. *St. erythropterus* M. p. 10.

*Variat fronte, pectore et abdomine magis minusve flavo-sericantibus.*

*St. erythropterus* De Geer, Fourcr., et Geoffr. St. n. 10. ad speciem praecedentem redactus est.

134. *St. fodiens niger, subopacus; thorace elytrorumque basi obscuro-castaneis; tibiis, tarsis et elytrorum apice rufo-testaceis.*

*Habitu Staph. sequentis.*

*Long. 6 lin.*

*Caput orbiculatum, thorace brevius, nigrum; palpis subrufescentibus; antennis fuscis, articulis primis nigris summo apice rufescentibus.*

*Thorax latitudine paulo longior, subtiliter punctus, linea media longitudinali obsoleta.*

*Scutellum nigrum.*

*Coleoptra quadrata.*

*Abdo-*

*Abdomen* nigrum, dorso subsericante; puncto segmentorum singulorum flauo-sericante.

Habitat in Carolina — *Bosc.*

135. *St. fossator* M. p. 164.

136. *St. fossor* M. p. 10. opacus, niger; capite et thorace subcupreo; elytris tibiis et tarsis subfuluo-sericantibus.

*Caput* suborbiculatum, thoracis magnitudine, tomento tenui subcupreo-sericante tectum. Oculis parvis. Antennis, capite vix paulo longioribus, orisque partibus nigris.

*Thorax* latitudine paulo longior, coleoptris paulo angustior, subcupreo-sericans; linea longitudinali obsoleta.

*Scutellum* nigro-sammetinum.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, tomento tenui cupreo- et fuluo-sericante confertim tecta.

*Abdomen* coleoptris plus duplo longius, nigrum, pilosellum; segmentorum singulorum puncto dorsali fuluo-sericante.

*Pedes* nigri, tarsis tibiisque fuluo-pilosellis; tarsis anticis fossoriis.

Haec species europaea *St. fodienti* (n. 154.) ex America septentrionali adeo similis est, ut fere inuito me hanc ab illo seiungam.

\*

\*

137. *St. cinerascens* M. p. 49.



Descriptio huius Staphylini, cui, M. p. 49. locum ultimum in ultima (nunc secunda) Staphylinorum familia adsignaueram, ab individuo vnico, iam iam laeso, et chartae adglutinato, collectionis *Knochianae*, desumpta, nunc, indiuiduis pluribus huius speciei lectis, accuratior dari potest.

Praemonendum est, hunc Staphylinum huic familiae tertiae adnumerandum esse. Licet enim paruitas eius a hac familia cum remouere videatur, attamen omnibus illis characteribus gaudet, qui familiam tertiam a reliquis familiis distinguunt. Forma antennarum, capitis et thoracis, nec non horum punctura omnino eadem sunt ac in reliquis huius familiae Staphylinis. Quo clarius autem hoc appareat, descriptionem eius hic addo accuratiorem:

*Long.* 2 lin.

*Caput* quadratum, magnitudine thoracis, nitidulum, confertim punctum, nigrum; oculis paruis; antennis, capite longioribus, fuscis, basi pallidioribus; palpis rufo-fuscis.

*Thorax* quadratus, angulis obtusis, coleoptris minor, nitidulus, punctus, medio leuis, punctis numerosis sed haud confertissimis; niger.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, opaca, nigra, pilis tenuissimis grisescentibus vestita; oculo ipso armato plane sine puncta esse videntur.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, nigrum, opacum, subpilosellum.

*Pedes* fusco-picei.

Habitat Brunsvigae, lectus tempore verno, sub gramine, ad ripas — *Dahl*.

#### FAMILIA IV.

Staphylini huius familiae vel corpore toto vel plurimis eius partibus villis mollioribus aut tomento nebuloso vestiti sunt. Thorax in specie semper hoc vestimento indutus esse solet, vel, vestimento detricto, punctis subtilissimis et confertissimis impressus apparet, quo haec familia semper a familiae sequentis speciebus differt, quibus thorax est lenissimus, punctis seu impressionibus paucis maioribus interdum notatus. Villi autem seu tomentum indole sunt longo diuersa a pilis illis, quibus elytra omnium fere Staphylinorum magis minusue tecta esse solent.

Praeter plures Staphylinos e familia II. M. p. 3., haec familia comprehendit etiam *St. hirtum* e familia I. M. p. 159.

158. *St. versicolor* obscurus, tomentosus; flavescenti-vel viridescenti-nebulosus; apicibus elytrorum subcyanescentibus.

*Long.*

*Long.*  $7\frac{1}{2}$  —  $8\frac{1}{2}$  lin.

Habitu *St.* sequenti magis affinis est, quam ulli alii huius generis microptero; differt autem satis ab illo.

*Caput* orbiculatum, long. 2 lin., longitudine paululum latius, thorace maius, coleoptris minus; nigrum, subtus nigerrimum nitidissimum nudum, supra pilis densis exiguis flavo-sericantibus, paucisque singulis longioribus nigris, vestitum. Oculis reniformibus, pallidis, maiusculis. Antennis, capite paulo longioribus, apicem versus paulo crassioribus; colore variabili: vel rufescentibus, articulis 6 ultimis obscurioribus et grisescenti-sericantibus; vel nigris, basi articuli primi rufescente. Labro, margine anteriore pallidiore, in media apice rufo, testaceo ciliato. Reliquis instrumentis cibariis nigris.

*Thorax* quadratus, basin versus angustatus, angulis anticis acutis, coleoptris triplo minor; linea longitudinali obsoleta, ante scutellum distinctiore, eleuata, nitida; niger, maculis sammetinis, viridi-flavis vel obscuro-oliuaceis, nebulosus.

*Scutellum* viridi-flavo-vel obscuro-oliuaceo-sammetinum.

*Coleoptra* quadrata, maculis sammetinis viridi-flavis vel obscuro-oliuaceis nebulosa; hume-

humeris rufotestaceis; apice subcyanescenti-nitido.

*Abdomen* coleoptris duplo longius, illis autem angustius; nigrum, subtus argenteo-fericeum, supra hirtulum, punctis 2 ante coleoptra testaceo-sammetinis; segmento penultimo pilis tenuibus exiguis virescenti-fericantibus dense vestito; segmento ultimo, seu ano, testaceo. Pectore nigro, pilis tenuissimis argenteo-fericantibus vestito.

*Pedēs* subpilofelli; femoribus anterioribus subargenteo-fericantibus; anticis nigris, apice macula testacea magis minusue distincta; posterioribus testaceis, annulo medio nigro; capitibus femorum omnibus nigris; tibiis et tarsis vel nigris vel testaceis.

Habitat in Para, prouincia Brasiliae, in sylvis humidis; captus in fructibus putrescentibus — *Sieber*.

*St. versicolor* — in collectione Hellwigio — Hoffmanniseggiana.

139. *St. nebulosus* M. p. 13.

*De Geer* Mem. St. n. 1.

*Geoffr.* Hist. St. n. 6.

*St. tessellatus* Fourcr. Ent. Par. St. n. 6.

140. *St. cingulatus* M. p. 166.

141. *St. chloropterus* M. p. 166.

*Fbr.* Eleuth. St. n. 5.

142. *St. murinus* M. p. 14.

Linn. Fn. Suec. n. 840.

143. *St. femoratus* obscuro-nebulosus; ano femoribusque anterioribus testaceo-ochraceis, his macula nigra notatis.

Long. 6 — 6½ lin.

Habitu inter *St. pubescentem* (n. 144.) et *murinum* (n. 142.) medium tenet; species autem distincta est capite haud orbiculato sed subtriquetro, vel latitudine paulo longiore, apicem versus angustato etc.

*Corpus* subaeneum vt *St. murino*.

*Caput* thorace minus, subtriquetrum, punctum; linea media longitudinali leui obsoleta; clypeo testaceo; mandibulis nigris; palporum articulis nigris, apice rufis; antennis capite paulo longioribus fuscis, articulis 2 primis rufis.

*Thorax* capitis colore atque punctura; linea media leui longitudinali; angulis anticis obtusioribus quam in *St. murino*, paulo acutioribus quam in *St. pubescente*.

*Coleoptra* subgriseo-nebulosa, subquadrata.

*Abdomen* pilosellum, nigrum; dorso subrufo-varium; ventre subsericans, subaeneo-nitens, segmento ultimo ochraceo; pectore subsericante.

*Pedes* nigricantes; femoribus ochraceis, lateribus, imprimis femorum posticorum, nigris.

Habi-

Habitat in Carolina — *Bosc.*

*St. femoratus* Fabr. Eleuth. St. n. 24.

144. *St. pubescens* M. p. 12.

*St. pubescens* Paykulli, Olivieri, nec non *St. chrysocephalus* Fourcroyi et Geoffroyi St. 8., quos sub *Staph. pubescente* M. p. 13. allegavi, haud ad hanc speciem sed ad aliam aslinem, quae *St. chrysocephalus* (n. 146.) nominata est, pertinent.

145. *St. maculosus* M. p. 165.

*Variat* 1) Capite thoraceque unicoloribus, regione circa oculos rufescente — e collectione *Knochiana*. — 2) Capite aenescente, lineis 2 longitudinalibus et regione circa oculos rufescentibus; thorace aenescente, lineis 2 longitudinalibus interruptis, margine apicis et baseos, nec non punctis 2 marginis lateralis rufescentibus magis minusve obsoletis. — Habitat in Carolina, — *Bosc.*

*Staphylinum* vidi, omnibus characteribus, nec non patria, cum *St. maculoso* congruentem, longitudine autem modo 6 linearum; pedibus testaceis, capitibus femorum et macula femorum baseos nigris; lineis capitis et thoracis rufis latioribus nec interruptis. — E collectione *Bosciana*.

*St. viduatus* Fabr. Eleuth. St. n. 7.

146. *St. chrysocephalus*, nigro fuscoque nebulosus; abdomine argenteo-sericante; capite femorumque annulo ochraceis.

*Long.* 6 lin.

*Habitu* partiumque forma et proportione omnino *St. pubescentis* (n. 144.); semper autem ab eo differt.

*Caput* ochraceum, subflavo-sericans, punctis 2 frontalibus oculisque nigris, mandibulis apice nigris; antennis fuscis, articulis 4 primis ochraceis; (punctis maioribus et linea media nitida, quae sunt *St. pubescenti*, nullis).

*Thorax* opaco-niger, obsoleto rufo-punctatus, linea abbreviata longitudinali nitida ad basin.

*Coleoptra, abdomen, pectus et scutellum* ut in *St. pubescente*.

*Pedes* nitidi, nigri; annulo femorum ochraceo.

*Habitat* in Gallia.

*St. chrysocephalus* Fourcr. Ent. Par. St. n. 3.

*St. pubescens* Payk. Mon. St. n. 9.

— — Payk. Fn. Suec. St. n. 13.

— — Olivier Ent. St. n. 15. t. II. f. 15.

*Geoffr.* Hist. St. n. 8.

147. *St. Chrysis* capite, thorace, scutello et elytris holofericeis; aureo-cupreus; capite flavo; thorace anterieus, scutello, segmentorumque basi nigris.

*Long.*



*Long.* 10 lin.

Habitu *St.* praecedentis; thorace autem rotundiore, angulis anticis deflexis ut in *Staphylinis* plurimis familiae I.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, subtus rufescens, supra pilis flavo-holosericis vestitum; inter antennis nudum, pallide viridi-aenescens, subpunctum; clypeo testaceo; labro et maxillis rufo-fuscis; mandibulis palpis et antennis fuscis; his capite paulo longioribus, articulo primo paulo pallidioribus; oculis parvis.

*Thorax* orbiculatus, angulis anticis deflexis, coleoptris paulo minor, holosericeus; parte anteriore violaceo-niger, posteriore aureo-cupreus.

*Scutellum* violaceo-nigrum, holosericeum.

*Coleoptra* quadrata, holosericea, aureo-cuprea.

*Abdomen* nigro-aeneum; marginibus segmentorum rufis; pectore subflavo-sericante.

*Pedes* rufi; tibiis tarsisque fusciscentibus.

Habitat in Bahia, Brasiliae provincia —

*Gomes.*

*St. chrysis* — in collectione Hoffmanns-eggiana.

148. *St. hirtus* M. p. 159.

*St. hirtus* Fourc. Ent. Par. St. n. 6.

— — Geoffr. Hist. St. n. 6.

## FAMILIA V.

Comprehendit Staphylinos familiae I. M. p. 2., excepto *St. hirto*. — Forma thoracis, eiusque superficies nuda, nitida, punctis paucis inordinatis impressa, praecipue species huius familiae a reliquis Staphylinis distinguunt.

149. *St. villosus* M. p. 160.

150. *St. maxillofus* M. p. 2.

Variat 1) Elytrorum fascia continua, abdominis dorso et ventre albo-sericantibus. 2) Elytrorum fascia interrupta, abdominis dorso et ventre albidis. 3) Elytris totis nigris, abdominis dorso subcinereo-maculato, ventre sericante.

Varietatem totam nigram nondum vidi.

151. *St. oculatus* niger, nitidulus; capite infra et in angulis baseos supra rufo.

Long.  $7\frac{1}{2}$  lin.

Partium forma et proportione *St. praecedentis*.

Caput thoracis magnitudine, longitudine paulo latius; nigrum, infra et in angulis baseos rufum; clypeo testaceo; antennis, capituli longitudine, validis, extorsum crassioribus.

*Coleoptra* quadrata, subopaca, coriacea.

*Abdomen* opacum pilosellum.

Habitat in Nova Seelandia. — E collectione *Hellwigiana*.

*St.*

*St. oculatus* Fabr. Ent. S. St. n. 10.

— — Olivier Ent. St. n. 3. t. II. f. 19.

*St. erythrocephalus* niger, nitidus; capite rufo, macula frontali nigra — certo varietas *St. oculati* est.

Long. 7 —  $8\frac{1}{2}$  lin.

Partium forma et proportione omnino *St. oculati*.

Caput speciminibus quibusdam thorace paulo maius, quibusdam thorace paulo minus; rufum; ore, antennis (quarum articuli 7 ultimi defunt) et macula quadrata inter oculos nigris.

Habitat in Noua Hollandia. — E collectione Bosciana.

*St. erythrocephalus* Fabr. Ent. S. St. n. 17.

— — Olivier Ent. St. n. 9.

t. II. f. 9.

---

## GENVS IV.

## LATHROBIVM.

*Lathrobia*, habitu planiusculo filiformi, capite thoraceque punctis, hoc rectangulo, a reliquis Coleopteris Micropteris iam distingui possunt. *Staphylini* fam. II., quibus, primo intuitu, similia esse videntur, habitu sunt paulo convexiore, thorace haud confuse sed vel omnino non vel parcius et striatim puncto, pedibus longioribus et gracilioribus, palpis filiformibus, qui optimum praebeant characterem distinctivum. *Palpi* acuminati sunt, excepto *L. latipede* (*Pinochilus* M. p. 201.), cui filiformes, ut *Staphylinis*. — De similitudine *Lathrobiorum* cum quibusdam *Paederis* vide ea, quae de *Paederis* dicam.

Haec sunt quae de *Lathrobiis*, respectu generum aliorum monere me oportuit; haud enim vereor, quemque *Lathrobia* cum ullo alio genere confundere posse, licet characteres huic generi proprii peculiares non essent. Character totus naturalis, seu complexus characterum, qui omnibus huius generis speciebus communes sunt, sufficient ad praebendam genericam distinctionem. Habitus hic certus naturalis omnia *Lathrobia* iungit. Qui autem systema artificiale, partibus oris aut pedum innixum, conde-

conderet, *Lathrobium latipes* a reliquis conspicietur naturalibus discernere coactus foret; palpi enim, omnibus Lathrobiis acuminati, huic soli filiformes sunt; ungues autem, omnibus Coleopteris Micropteris apici articuli quarti tarforum adhaerens, in illa specie basi huius articuli adhaeret.

Hoc genus in quatuor familiis dispesci potest, quarum prima et secunda singula singulam quidem tantummodo speciem continet, speciem autem, quae tam statura quam characteribus quibusdam peculiaribus a reliquis conspicietur huius generis semper differt.

## FAMILIA I.

Olim *Pinophilus*; genus XIV. M. p. 201.; de quo confer quae iam dixi loco citato.

1. *L. latipes*. — M. p. 202.

## FAMILIA II.

De hac familia vide descriptionem unius, quam continet, speciei.

2. *L. depressum* M. p. 182.

Variat etiam femoribus posticis rufis. — E collectione *Bostiana*.

## FAMILIA III.

Comprehendit paucas species, antennis quasi infractis notatas: Articulus nempe primus an-

I

tenna-

tennarum, qui reliquis multo longior est, cum reliqua antennarum parte angulum format recto paululum maiorem.

3. *L. fracticorne* M. p. 54.

Antennae interdum rufescunt.

4. *L. pallipes* M. p. 179.

Antennae vel rufescunt vel fuscescunt.

#### FAMILIA IV.

Omnes reliquas huius generis species complectitur, quae, palpis acuminatis, a fam. I., corpore convexiore a fam. II., antennarum articulo primo breviori, a fam. III. differunt.

5. *L. fuscum*, fuscum; antennis palpisque pallidioribus; pedibus rufis.

Long. 4 lin.

Habitu *L. brunnipedis* (n. 6.); punctura autem subtiliore quam in plurimis reliquis speciebus.

Caput suborbiculatum, nitidum, castaneo-fuscum; magnitudine thoracis; antennis, capite longioribus, palpisque rufescentibus seu fuscescentibus.

Thorax subquadratus, latitudine vix paulo longior, angulis obtusis, magnitudine coleopterorum.

Coleoptra latitudine vix paulo longiora.

Pedes tarsis anticis dilatatis.

Habi-

Habitat Parisiis — Brongniart — et Brun-  
suigae — Dald.

6. *L. brunnipes* M. p. 56.

7. *L. pilosum* M. p. 56.

Caput orbiculatum, thorace duplo fere mi-  
nus, nitidum, punctum, nigrum, antennis  
palpisque fuscis.

Thorax quadratus, coleoptris duplo minor,  
punctus, nitidus, niger.

Coleoptra latitudine longiora, nigra, minus  
nitida quam thorax et caput; puncta, punctis  
subtilissimis et confertissimis; pilis tenuissimis  
breuissimis grisescentibus vestita.

Abdomen coleoptris triplo fere longius, ni-  
grum, nitidulum, pilis grisescentibus sub-  
sericans.

Pedes nigro-fusci, tarsis pallidioribus.

*Staph. quadratus* Payk. St. n. 21.?

8. *L. gracile* M. p. 182.

Habitat etiam Brunsuigae, tempore aestivo,  
sub gramine, in pratis — Dahl.

9. *L. longiusculum* M. p. 181.

10. *L. politum* M. p. 180.

11. *L. multipunctum* M. p. 52.

Haec species, thorace elytrisque puncto-  
striatis, Lathrobiis duobus praecedentibus val-  
de affinis est; inde descriptione eget accuratiore.

Long.  $2\frac{1}{2}$  — 3 lin.



*Color* huius speciei variat. Descriptio eius in M. p. 32. a varietate rufescente desumpta est et, quoad formam atque proportionem partium, ad huius speciei varietates satis bene quadrat. Quaedam attamen monenda sunt.

*Thorax* vix basin versus subangulatus, sed rectangulus est. Puncta eius lateralia in series interdum subdisposita esse videntur circiter septem.

*Coleoptra* thorace vix paululum latiora sunt, puncta; punctis disci in series 10 dispositis, lateralibus inordinatis.

*Abdomen* coleoptris triplo longius.

*Color* variat:

- 1) Niger; pedibus testaceo-rufis; coleoptris obscuro-castaneis; antennis palpisque rufo-fuscescentibus.
- 2) Capite et abdomine fuscescentibus; thorace rufescente; coleoptris piccis; pedibus testaceis.

*Punctura* huius speciei multo crassior est quam in conspeciebus.

12. *L. elongatum* M. p. 55. nigrum nitidulum; coleoptris confuse-punctis, apice sanguineo-rufis; pedibus rufo-testaceis.
13. *L. lineare* M. p. 54. nigricans; pedibus rufis; antennis elytrisque fuscis; his puncto-liriatis.

Hoc *Lathrobium* in mea collectione haud exstat. Diagnosin eius, qua a *Lathrobio* praecedente

cedente differt, Dom. Professori *Knoch* debeo, qui mecum adhuc quasdam adnotationes de differentia eorum communicavit, his verbis: "*L. lineare* haud essentialiter statura graciliore a *L. elongato* differt, quamquam hoc rarissime statura aequae gracili ac illud occurrit; sed potius punctura crassiore thoracis et elytrorum, his praeterea puncto-striatis, in *L. elongato* autem inordinatim punctis; palpi etiam *L. linearis* apice crassiores sunt quam in illa specie."

*Lathrobia* mihi sunt multa, quae, adhibitis his distinctionibus, pro mera *L. elongata* habeo. Statura variant graciliore et crassiore, nec non colore:

- 1) *L. nigrum*; pedibus rufis; palpis, antennis, anoque fuscis; coleoptris etiam fere omnino nigris, apicem versus subnigro-castaneis.
- 2) *L. coleoptris castaneis*, basi nigris; caetera vt in varietate 1. — Haec varietas omnium est frequentissima.
- 3) *Coleoptris totis nigro-castaneis*; caetera vt in varietatibus praecedentibus.
- 4) *L. nigrum*; antennis palpisque rufo-fuscis; thorace fusco-piceo; elytris pedibusque testaceis.

Hic color obscurior seu pallidior ab aetate magis minusue prouecta horum insectorum dependere videtur.

Punctura harum varietatum mox paulo crassior mox paulo subtilior est, sine discrimine staturae gracilioris crassiorisue. Immo individuum mihi est varietatis 2, reliquis paulo gracilius, cuius puncta elytrorum, oculis bene armatis et intentis examinata, iamiam in series se disponere videntur; seriebus autem obsoletissimis, nec cum futura exacte parallelis sed suboblique a basi elytrorum apicem eorum versus deductis, ita vt spatium inter apicem harum serierum et futuram angustius sit quam inter basin earum et futuram. Haec punctorum dispositio transitum forsan demonstrat a *L. elongato* ad *L. lineare*.

*Staphylinus elongatus* Linn. Syst. nat. ed. XII. Staph. n. 14.

14. *L. terminatum* M. p. 55.

Variat colore pedum antennarum et palporum obscuriore vel pallidiore; pustulis in angulis coleoptrorum rufescentibus vel distinctis vel obsoletis.

15. *L. longulum* M. p. 53., capite gaudet subquadrato, angulis obtusis; coleoptris obsoletissime punctis; longitudine  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Lathrobium* quoddam, a Dom. Dahl sub nomine *L. filiforme Knochii* mecum communicatum, illi perassine est: Nigrum, nitidum, pedibus

pedibus antennisque fuscis; coleoptris obsoletissime punctis; longitudine  $2\frac{2}{3}$  lin.

Statura nec non partium forma et proportionem omnino *L. elongati* varietatibus gracilioribus simillimum est, exceptis attamen coleoptris, quae vix oculo armato puncturam obsoletissimam, interdum etiam vestigia obsoleta striarum ostendunt. — Praeter staturam paulo maiorem et crassiores, nec non colorem pedum et antennarum, nullis characteribus a *L. longulo* differt.

*L. filiforme* et *longulum* habitant Brunsvigae iisdem locis, in gramine nempe et sub foliis deciduis ad ripas — *Dahl*.

16. *L. badium* M. p. 53.
  17. *L. bicolor* M. p. 179.
  18. *L. castaneum* M. p. 52. e collectione *Knochiana*, vbi haec species sola exstabat, se subduxit.
-

## GENVS V.

## P A E D E R V S.

Hoc genus in tres familias dispesci potest: *Familia I.* complectitur *Paederos* *Lathrobiis* adfiniores, nisi siatura breuiore conuexiore, pedibus gracilioribus, thorace crassiore et breuiore discreparent. — *Familia II.* *Paederos* partibus corporis minus arcte inter se iunctis; capite et thorace crassioribus atque globosis, opacis, confertissime punctis. — *Familia III.* *Paederos* habitu proceriore teretiusculo, thorace plus minusue globoso, nitidissimo, punctis perpaucis vagis impresso, coleoptris cicatricose-punctis. Haec familia *Aleocharis* quibusdam fam. I., II. et III. adfinis est, quibus etiam caput et thorax plus minusue globosi et laxius inter se atque cum trunco reliquo coniuncti habitum dant peculiarem. Praeterea mores et quibusdam vel ipse color eidem sunt; Degunt sub gramine, in locis humidioribus apricis, et e. g. *P. riparium* cum *Al. collari*, *limbata*, *canaliculata* et *fulcata* saepius promiscue locis indicatis legi. Cum colorem spectamus, hoc etiam obseruamus aliquam congruentiam: Thorax, pedes et abdominis basis *Paederis* multis fam. III. et multis *Aleocharis* pallidiores sunt, capite elytris anoque  
obscu-

obscuris; immo *P. riparius* et *A. collaris* colore nihil fere differunt. Omnes autem similitudines, quas memoravi, inessentiales sunt, et natura *Paederos* fam. III. et *Aleocharas* characteribus multo stabilioribus segregavit. Staturam istam teretiusculam, imprimis abdominis, *Paederorum*, quos citaui, in *Aleocharis* haud vidimus; antennae, *Paederis* filiformes, *Aleocharis* omnibus hic allegatis extrorsum crassiores sunt; coleoptra *Paederis* sunt crasse et cicatricose-puncta, *Aleocharis* subtiliter; thorax *Paederis* est laevis, punctis paucis vagis impressus, *Aleocharis* vel omnino laevis vel sulculis aut fovea aut puncto maiore ante scutellum impressus. — Palpi anteriores plurimorum huius generis *Micropterorum* triarticulati esse videntur; in *Paederis* autem familiae III. tuberculum, apici articuli tertii impositum, quasi articuli quarti vestigium esse videtur; articulum verum quartum subuliformem, alias semper in articulum tertium crassum retractum, non nisi semel, in vno *P. orbiculati* individuo collectionis *Latreilleanae* exsertum vidi, quod eo singularius est, cum hic articulus in omnibus reliquis fere innumerabilibus *micropteris*, quibus palpi acuminati sunt, quotquot eorum examinaui, exsertus esset.

## FAMILIA I.

1. *P. ochraceus* M. p. 59.

2. *P. rubricollis* rufo-fuscescens, nitidulus; capite obscuro; thorace subquadrato pedibusque rufis.

Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Habitu partiumque forma atque proportionem omnino *P. sequentis*; punctura autem subtiliore, capite minore, antennis longioribus et gracilioribus, nec non colore, differt.

Caput orbiculatum, thorace paulo minus, nigro-fuscum; antennis filiformibus, capite thoraceque paulo longioribus.

Thorax rufus, coleoptris breuior.

Coleoptra et abdomen rufo-fuscescentia, subgrifescenti-sericantia.

Pedes rufo-testacei.

*P. rubricollis* — Knoch.

*P. testaceus* Olivier Ent. Paed. n. 3. tab. I. f. 6. vel ad hanc vel ad praecedentem speciem conferri potest.

3. *P. bicolor* M. p. 59.

In collectione *Boschiana* hic *Paederus Staph. affinis* Payk. nominatus erat.

*P. melanocephalus* Fabr. Ent. Syst. Paed. n. 10.

*P. melanocephalus* Panz. Fn. Inf. Germ. H. XXXVI. tab. 22. forsitan eadem species est, coleoptris obscurioribus.

Dom.



Dom. *Sturm* varietatem huius *Paederi* mecum communicavit nitidam, nigram; antennis, thorace et coleoptrorum summo margine apicali rufis, palpis pedibusque testaceis.

4. *P. castaneus* M. p. 60.

Hunc *Paederum* in collectione *Bosciana* sub nomine *Staph. elegans Olivier* (Ent. St. n. 20. tab. V. f. 50.) vidi.

5. *P. corticinus* M. p. 184.

Dom. *Dahl* cepit *Brunsvigae Paederum*, qui *P. corticino* affinis esse videtur, teste autem Dom. Prof. *Knoch* ab illo differt. Descriptionem eius hic addo:

*Long.* 2 lin.

*Caput* thorace paulo longius et latius, subtilissime confertissimeque punctum, fuscum; antennis, capite paulo longioribus, rufo-testaceis; palpis rufo-testaceis, subacuminatis, articulo quarto oculo bene armato difficilime conspicuo; mandibulis rufo-testaceis.

*Thorax* quadratus, basin versus paululum angustior; subtilissime confertissimeque punctus, linea media longitudinali leuissima; coleoptris minor, piceo-rufus.

*Coleoptra* rectangula; elytris latitudine duplo longioribus; subtilissime puncta, circa scutellum fusco-testacea.

*Scutellum* fusco-testaceum.

*Abdo-*

*Abdomen* coleoptris plus duplo longius, marginatum, piceo-testaceum, apice subpallidiore.

*Pedes* testacei.

6. *P. vestitus* levis, niger, nitidus; coleoptris subfuscescentibus; antennarum et palporum basi, pedibusque testaceis,

*Long.* 2 lin.

*Caput* orbiculatum, nigrum, thorace minus; palpis anterioribus testaceis, articulo ultimo obscuro; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, fuscis, basi testaceis.

*Thorax* suborbiculatus, duplo fere coleoptris minor; interdum linea dorsali longitudinali, saepius autem obsoleta, impressus.

*Coleoptra* quadrata, nigricantia seu fuscescentia.

*Pedes* testacei.

Habitat Rostochii — *Karsten*.

Hunc *Paederum* Dom. *Karsten* cum Dom. Prof. *Hellwig* communicavit, sub nomine *Staphylinus vestitus*; habitus autem totus et forma palporum verum genus designant.

## FAMILIA II.

7. *P. fragilis* niger, subnitidus; thorace, antennis, pedibusque rufis; elytrorum margine apicali testaceo.

*Long.* 3 lin.

Habitu

Habitu, partiumque forma ac proportione omnino *Paederi* sequentis, thorace paulo angustiore.

*Caput* nigrum, *antennis* et *palpis* rufescentibus.

*Thorax* nitidulus, *canalicula* longitudinali subobsoleta impressus.

*Abdomen* subsericans.

Habitat Parisiis — *Bosc.*

In collectione *Bosciana* hic *Paederus* exstabat sub nomine *P. melanocephalus* Fabr. (conf. *P. bicolor* n. 3.) a quo tamen sane differt, neque enim minutus est neque filiformis.

8. *P. orbiculatus* M. p. 63.

9. *P. angustatus* M. p. 63.

*Thorax* subquadratus, *angulis* obtusis, *apicem* versus angustior.

Sunt autem huius speciei duae varietates (vel, iudice *Knochio*, duae species distinctae), quarum una, et quidem minor, thorace est paulo brevior, punctura paulo crassior et elytris paulo magis nitentibus, quam varietas maior, cui Dom. Prof. *Knoch* nomen dedit *P. procerus*. Cum vero hae differentiae mihi nondum sufficere videantur ad novam speciem condendam, saltem expectare mihi liceat, dum plura huius *Paed. proceri*, haud frequenter occurrentis, individua lecta sint,

an characteres illi semper eum a *P. angustato* distinguant. —

Habitant Brunsvigae — *Dahl*.

*P. angustatus* (?) nitidus, fusco-niger; palpis, antennis atque pedibus ochraceis.

Habitu nec non partium forma et proportionem *P. angustati*; an eius varietas iunior?

*Thorax* obscuro-fuscus.

*Elytra* nigro-fusca, apice rufescentia.

Habitat in Borussia — *Kugellan*.

E collectione *Hellwigiana*.

*Staph. gracilis* *Payk.* Mon. St. n. XXVIII.  
iudice *Paykullo* ipso mera *P. angustati* varietas est: *Payk.* Faun. Succ. p. 431. n. 7.  $\beta$ .

### FAMILIA III.

10. *P. littorarius* rufus; antennarum medio fusco; capite et ano nigris; elytris coeruleis.

*Long.*  $2\frac{1}{3}$  lin.

Habitu, partiumque forma proportionem et punctura *Paederi riparii*; magnitudine attamen et coleoptris paulo brevioribus differt.

*Caput* nigrum; palpis totis rufis; antennis fuscis, articulis tribus primis et duobus ultimis rufis.

*Pedes* rufi, geniculis vix paulo obscurioribus.

Habitat in America septentrionali — *Knoch*.

*P. littorarius* — *Knoch*.

11. *P. riparius* M. p. 62.

12. *P. littoralis* M. p. 61. in Gallia multo est frequentior quam *P. riparius*, qui immo rarus esse videtur, cum mihi in collectionibus Entomologorum Parisiensium semel modo occurrerit. — Attamen fere credo, ambos in vnam eandemque speciem redigendos esse, cum mihi indiuidua sint, quae, characteribus distinctiuis, a capite et thorace magis minusue globosis desumptis, medium inter ambas species tenent. Scimus autem de multis aliis Micropteris, hanc capitis et thoracis formam et proportionem variabilem esse, quod etiam de *P. ruficollis* valet, cuius indiuidua thorace magis minusue globoso variant.

13. *P. ruficollis* M. p. 185.

Confer quae modo ad *P. littoralem* monui.  
Habitat etiam in Gallia.

Geoffr. Hist. Staph. h. 23.

*Staph. thoracicus* Fourcr. Ent. Par. St. n. 23.

## GENVS VI.

## A L E O C H A R A.

Genus, quod multa complectitur Microptera, habitu naturali toto, et partibus etiam singulis satis diuersa, ita, vt familiae sex, in quas disiribuuntur, forsan plura genera condere possint:

*Familia I.* comprehendit Aleocharas, quibus partes trunci paulo quidem arctius cohaerent, quam plurimis familiae sequentis, laxius autem quam cospeciebus plurimis familiarum reliquarum. — *Capite* exserto, thoracis magnitudine, fronte plerumque plana; *thorace* latitudine paulo longiore, coleoptris paululum minore, disco deplanato, interdum subcanaliculato, a caeteris Aleocharis praecipue distinctae sunt.

*Familia II.* comprehendit Aleocharas paruulas, habitu peculiari a reliquis diuersas; *capite* et *thorace* laxè inter se et cum reliquo trunco cohaerentibus; *capite* globoso, nunquam minore quam thorax, saepius autem maiore; *thorace* globoso, basin versus, rarius apice, angustiore, coleoptris minore; sulculis seu sulco vnico vel saltem puncto magno ante scutellum impresso. Sulculae distinctae breues ad basin *coleoptrorum* non nisi in hac familia deprehenduntur et vna cum glabritie coleoptrorum et thorace cordato  
seu

seu obcordato coleoptris minore, optimi eius characteres sunt. — *Al. picea* et *nigra*, quibus quidem coleoptra sunt subtilissime puncta, nec basi sulculis impressa, ob formam autem et proportionem thoracis meliore iure huic familiae quam sequenti inferuntur, et limitem quasi designant, quo (per *Al. aethiopem analem* etc. e familia tertia) haec familia tertiae adpropinquatur; differentia etiam magnitudinis thoracis et coleoptrorum minor est in his duabus speciebus, quam in reliquis familiae II.

*Familia III.* continet, praeter totam familiam secundam M. p. 77., plures etiam species e familia prima M. p. 67., scilicet *Al. analem*, *aethiopem*, *prolixam*, *collarem*, *cinctam*, *lucidam*, *limbatam*, nec non genus IV. M. p. 65. Cum vero vnicum vnicae huius generis speciei individuum tempore hyberno et minus sereno examinarem, palpis anterioribus triarticulatis et mandibulis dentatis instructum esse mihi videbatur. Examen autem reiteratum et die sereno institutum me docuit, huic insecto omnino palpos et mandibulas esse vt reliquis *Aleocharis*. Licet ergo structura peculiari antennarum ab omnibus cospeciebus differat, attamen haud haere, an hoc genus *Calliceri* tollam et *Aleocharis* familiae III., quibus, tam habitu toto externo, quam partium singularum forma, antennis solis



exceptis, simillimum est, adfociem; nomen hactenus genericum speciei manebit. — *Partes trunci* micropterorum huius familiae arctius cohaerent, quam in familiis praecedentibus, minus autem arcte quam in familia sequente. *Caput* thorace quidem minus est, haud vero adeo quam in familia sequente. *Thorax* plus minusue orbiculatus, paulo interdum in latitudinem extensus, coleopterorum circiter magnitudine, speciebus longe plurimis minus est conuexus, quam in familiis praecedentibus et sequente, interdum autem adeo conuexus, ut thoraci globoso specierum e familia prima propius accedat, forma autem orbiculata, nec cordata vel obcordata, semper ab illo diuersus. *Punctura* capitis et thoracis in regula vel omnino deest, vel adeo est subtilis, ut vix oculis armatis sese offerat. *Al. nigricollis* autem et *Al. fulgida* ab hac regula excipiendae sunt; caput nempe et thorax illius scabriculi sunt, i. e. punctis crassioribus impressi, huius vero punctis sparsis distinctis impressi. *Coleoptra* specierum huius familiae quadrata esse solent.

*Familiae IV. Aleocharae, statura coacta et crassa, trunci partibus arctissime inuicem iunctis, latiusculis, a speciebus praecedentibus differunt. Haec statura coacta crassa singulis etiam trunci partibus formam ellicit peculiarem, imprimis*  
respe-

respectu proportionis longitudinis partium ad latitudinem earum: *Caput* paruum, orbiculatum, sub *thorace* multo maiore, conuexo, transverso, apicem versus plerumque angustiore, absconditur. *Coleoptra* transuersa sunt, elytris saepius subquadratis. — Haec familia, speciminibus quibusdam minus coactis et, quod inde sequitur, thorace coleoptrisque minus latis minusque conuexis, cum familia III. iungitur, e. g. per *Al. ruficornem*, *laeuem* etc. — Vt omnibus reliquarum familiarum Aleocharis, ita etiam speciebus huius familiae longe plurimis, *labrum* transuersum et *palpi* breues acuminati, articulo penultimo clauato, sunt. Quibusdam autem huius familiae Aleocharis, scilicet *Al. excusae*, *minutae* et *palpali* *labrum* productum subquadrato-orbiculatum et *palpi*, quorum articulus vltimus vix visibilis est et oculo bene armato qua seta perexigua et tenuis sese ostendit, longi et graciliores sunt.

*Familia V.* species solummodo duas comprehendit perexiguas, habitu autem et forma atque proportionem partium singularum ab omnibus caeteris Aleocharis satis distinctas, vt in propriam familiam coniungi possint. *Corpus* est depressiusculum. *Caput*, antennis extrorsum valde incrassatis, thorace est minus. *Thorax* transuersus conuexiusculus. *Coleoptra* leuia, transuersa,

thorace latiora et duplo fere longiora sunt. Ex his characteribus coniunctis cuique apparebit, hanc familiam aequè naturalem ac necessariam esse.

*Familia VI.* etiam duas tantum species complectitur, quae omnibus characteribus cum *Aleocharis* familiae III. congruerentur, nisi thorax et corpus totum eis depressi essent.

#### FAMILIA I.

1. *A. canaliculata* M. p. 68.

*Thorax* interdum vix ovatus est, latitudine paulo longior.

2. *A. linearis* M. p. 69. subnitidula, nigricans, antennarum basi pedibusque testaceis; fronte thoraceque planiusculis.

Capite et thorace minus depressis, colore subnitidulo etc. ab Al. sequente differt.

Huius speciei individua tria possideo, quorum vnum statura paulo latius est, canalicula thoracis obsoletiore; altera duo, quorum vnum Dom. *Sturm* mecum communicavit, statura paulo angustiore sunt, thoracis canalicula distincta.

In descriptione huius speciei M. p. 69. dixi anum ei esse rufescentem, sed individuo latiori, quod possideo, abdominis pars dimidia deest, individuis autem gracilioribus anus est concolor cum abdomine.

Al.

*Al. linearis* var.? nigra, nitidula; pedibus, elytris, palpis, antennarumque basi rufis; capite thoraceque planiusculis.

Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.

Caput thorace duplo minus, fronte impressa, nigrum; antennis, capite thoraceque paulo longioribus, nigro-fuscis, articulo primo rufo; palpis rufis.

Thorax coleoptris paulo minor, quadratus angulis obtusis, disco planiusculo subcanaliculato, nigro-fuscus.

Coleoptra quadrata, testaceo-rufa, basin versus sensim obscuriora, tandemque et circa scutellum fuscescentia.

Abdomen coleoptris quadruplo longius, nigrum.

Habitat Norimbergae — Dom. Sturm vnicum huius varietatis (?) specimen, quod posideo, mecum communicavit.

3. *Al. dimidiata* opaca nigra; basi antennarum, palpis, pedibus, coleoptrorumque dimidia parte testaceis; fronte thoraceque deplanatis.

Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.

Statura lineari, partium forma et proportionem, fronte et thorace planiusculis, cum *Al. lineari* (n. 2.) conferri potest.

Caput thoracis fere magnitudine, fronte depressa; opacum, nigrum; antennis, capite duplo

duplo longioribus, fuscis, articulis 4 primis rufo-testaceis; palpis rufo-testaceis.

*Thorax* subquadratus, angulis obtusis, basin versus vix paulo angustior, coleoptris paulo minor; disco deplanato obsolete canaliculato; opacus, niger.

*Coleoptra* leuia, quadrata; dimidiato basi nigra, apice testacea.

*Abdomen* coleoptris quadruplo longius, nigrum, nitidulum, sublineare, apicem versus paululum incrassatum.

*Pedes* testaceo-rufi.

Habitat Parisiis — *Bosc.* — *Rostochii* — *Karsten* — *Brunsvigae*, ad ripas piscinarum — *Dahl.*

Haec species in collectione *Bosciana* sub nomine *Staph. angustatus* Payk. exstabat, et verus *Paed. angustatus* ad *Paed. orbiculatum* relatus erat — Dom. *Karsten* hanc *Aleochara* sub nomine *Staph. dimidiatus* misit Dom. Prof. *Hellwigio*.

#### FAMILIA II.

4. *A. impressa* M. p. 72.

5. *A. rinularis* M. p. 73.

6. *A. sulcata* M. p. 73., thorace cordato, fovea media longitudinali impresso; coleoptris quadratis; fusca, subsericea, pedibus testaceis.

Confer

Confer notam ad n. 8.

Habitat, primo vere, sub gramine.

7. *A. fulcatula*, thorace cordato, fovea media longitudinali impresso; coleoptris quadratis; nigro-fusca, nitida, pedibus antennarumque basi testaceis.

Haec species praecedenti adeo similis est, ut eam pro mera eius varietate habere mallet. Differt statura paulo graciliore, nitore sericeo deficiente, colore paulo obscuriore, capite paulo minore. Dom. Prof. *Knoch* scripsit mihi autem, se, multis huius speciei individuis, nullam varietatem nullumque transitum in *Al. fulcatam* observasse.

Habitat Brunsvigae, ad ripas fossarum in pratis, sub gramine — *Dahl*.

*A. fulcatula*. — *Knoch*.

8. *A. obscura* M. p. 74. thorace cordato, subfoveolato; coleoptris transuersis; nigro-fusca, subsericans, antennis elytris pedibusque rufescentibus.

Haec species et duae praecedentes, a quibus haec imprimis coleoptris transuersis differt, attamen observationes adhuc accuratiores et in pluribus individuis, temporibus et locis diuersis captis, requirunt, quo de differentia aut identitate specifica earum diiudicari

cari possit, cum affinitatem nimiam inter se prodant.

Hanc *Al. obscuram* in collectione *Bosciana* sub nomine *St. crassicornis* Fabr. reperi.

9. *Al. fracticornis* thorace suborbiculato, foveolato; coleoptris quadratis; nigro-fusca, nitida, pedibus pallidioribus.

Statura paulo minore, thoracis forma, et colore obscuriore a speciebus tribus praeecedentibus differt.

*Caput* thoracis magnitudine, nigricans, sulca transversali inter antennis impressum; antennis capite duplo longioribus.

*Thorax* suborbiculatus, basin versus paululum angustior, fovea media longitudinali, quae autem apice interdum obsoleta est, impressus; nigricans.

*Coleoptra* quadrata, fusca,

*Abdomen* nigrum,

*Pedes* piceo-fuscescentes,

Habitat Brunsvigae, in pratis ad ripas fossarum — *Dahl*,

10. *A. picea* M. p. 75.

11. *A. nigra* M. p. 75.

12. *A. corticalis* M. 76. et *Al. tenuis* M. p. 84. varietates sunt unius eiusdemque speciei. — Conf. *Illigers Magazin* B. I. p. 480.



## FAMILIA III.

13. *At. analis* M. p. 76.

*Thorax* longitudine vix paulo latior est.

*A. exilis* — *Knoch*, Sub hoc nomine Dom. *Dahl* *Aleocharam* mecum communicavit, quam pro mera huius speciei varietate habeo. Dom. Prof. *Knoch* ipse autem mecum haud consentit, et scripsit mihi: "*Aleochara exilis* minor est quam *Al. analis*, et gaudet antennis crassioribus, quapropter ego hanc speciem haud cum illa confundendam esse censeo."

Habitat Brunsvigae, sub foliis deciduis, in sylvis — *Dahl*.

14. *A. Aethiops* M. p. 77.

*Var.?* habitu toto et forma atque proportionem partium *Al. Aethiopis* — *Long*,  $1\frac{1}{3}$  lin. — *Antennae* cum reliquo corpore concolores. —

*Thorax* canalicula longitudinali subobsoleta impressus. — *Pedes* femoribus cum reliquo corpore concoloribus, tarsis tibiisque testaceis. — Habitat Parisiis in simo — *Desmarest*.

15. *A. inquinula* M. p. 78.16. *A. pusilla* M. p. 78. *Les (long. 1.5 mm)*17. *A. Callicera* M. p. 65. Gen. *Callicerus*. —

Conf. quae supra in generalitatibus generis *Aleochara* dixi. (p. 145.)

18. *A. elongatula* M. p. 79.

*A.*

*A. oblonga* Kn. quam Dom. Dahl mecum communicauit, nihil aliud esse videtur, quam varietas huius speciei. Magnitudine, partiumque forma proportionem et punctura omnino cum illa conuenit; colore tantummodo paulo obscuriore differt. Est enim nigra, antennis nigro-fuscis, elytris fuscis, palpis pedibusque testaceis; segmentorum marginibus ventre vix paulo pallidioribus.

Addo hic verba Dom. Prof. Knoch. "*Al. oblonga* haud eadem species est cum *Al. elongatula*, thorax enim basi, ante scutellum, puncto oblongo, quod in *Al. oblonga* orbiculatum est, impressus est, et color huius speciei variabilis est, quod in *Al. elongatula* haud obseruauimus."

Habitat Brunsvigae sub cortice fagorum demortuarum. — Dahl.

19. *A. reptans*, nitida, nigra; palpis, antennis, elytris, pedibus, anoque rufescentibus.

Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.

Statura gracili, partium forma proportionem et punctura *Al. praecedentis*, a qua, antennis paulo breuioribus et crassioribus, thorace perpaululum conuexiore, magnitudine paulo minore, nitore splendidior, differt. An eius varietas? Ab *Al. anali* (n. 13.) et *circellari* (n. 22.) praecipue thoracis puncto antescutellari

lari impresso deficiente, coleoptris quadratis, nec non magnitudine maiore, differt; nam illis punctum thoracis antescutellare distinctum est et coleoptra longitudine paulo latiora sunt.

*Caput* atrum; *antennis*, vix capitis thoracisque longitudine, et ore rufescentibus,

*Thorax* nigro-fuscus.

*Coleoptra* quadrata, puncta, fusco-castanea, lateribus paulo obscuriora.

*Abdomen* lineare, coleoptris triplo longius, nigro-fuscum; segmento penultimo margine, ultimoque toto rufis.

*Pedes* rufo-testacei.

Habitat Brunsvigae in salicibus demorientibus — *Dahl.*

20. *A. teres* M. p. 79.

21. *A. longiuscula* M. p. 30.

22. *A. circellaris* nitida, rufo-fusca; elytris pedibusque pallidioribus; abdomine nigro, ano testaceo.

*Long.* 1 lin.

*Statura* graciliore quam *A. sequens*.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, obscuro rufo-fuscum; *antennis*, capite duplo longioribus, fuscis, basi pallidioribus; ore rufo-testaceo.

*Thorax*

*Thorax* rufescens, orbiculatus, coleoptro-  
rum magnitudine.

*Coleoptra* subquadrata, longitudine perpa-  
rum latiora, subtilissime puncta; picea vel  
fusco-picescentia.

*Abdomen* coleoptris quadruplo longius, ni-  
gro-fuscum, ano testaceo.

*Pedes* testacei.

Habitat Brunsvigae, ad salices — *Dahl*.

23. *A. Boleti* M. p. 80.

Huius speciei varietates permultae in M. p. 81.  
descriptae sunt. Iam olim Dom. Prof. *Knoch*  
susplicabatur, has varietates in plures species  
redigi posse. Cum attamen illae varietates  
sensim vna in alteram transirent, eas pro  
meris varietatibus habere me oportebat. Nunc  
autem credo, duas saltem species peculiares  
e varietatibus *Al. Boleti* constitui posse, cuius  
affinitas autem, exstantibus multis varietati-  
bus intermediis, verisimile e copula illarum  
ortis, manifesta est. — Harum autem spe-  
cierum vna *Al. Boleti*, altera *Al. fungi* nun-  
cupatur. Ambae victitant in fungis, ambae  
frequentissime occurrunt.

*Al. Boleti*, thorace suborbiculato, coleoptris  
quadratis; nitidula nigra; basi antennarum,  
palpis, pedibus, coleoptrisque pallidis, his  
autem

autem circa scutellum et in angulis apicis nigricantibus.

*Long.* 1 — 2 lin.

*Caput* nigrum; *antennis* fuscis, *basī* rufis; *palpis* rufis.

*Thorax* longitudine vix paulo latior.

*Coleoptra* testacea seu piceo-testacea, circa scutellum et in angulis apicis nigricantibus.

*Pedes* testacei.

Ad hanc speciem pertinent Var. I. 1. b. et 2.

*Staph. socialis* Payk. Mon. Staph. n. XLIII. huic speciei adnumerandus est, nam in collectione *Bofciana* hanc Aleocharam, a Dom. Paykull ipso e Suecia sub nomine *St. socialis* missam ipse vidi.

24. *A. Fungi* (Knoch) thorace coleoptrisque transuersis; nigra, nitidula; coleoptris nigro-fuscis; *antennis* *palpis* *pedibusque* pallidioribus.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Statura* est crassiore quam *Al. Boleti*.

*Antennae* fuscae; *palpi* et *pedes* testacei seu fusci.

Huc numerandae sunt *Al. Boleti* Var. II. 1. a. b — 2. a. b. c — 3.

Variabilitatem harum duarum specierum iam Linneus obseruasse videtur, magnitudinem enim *Staphylini Boleti* in Fauna Suecica n. 859. magnitudini pulicis aequiparauit; in *Syste-*  
*matia*

malis Naturae editione duodecima autem dicit idem *Linneus*, *Staphylinum Boleti* pulice dimidio minorem esse.

*Varietates intermediae* inter *Al. Boleti* et *Al. Fungi* thorace coleoptrisque transuersis, elytris pallidioribus, in illam et in hanc transeunt. — His varietatibus adnumerandae sunt *Al. Boleti* Var. I, 3, 4 — II, 1, c, d, — 2, c, d.

*Varietates quoque intermediae* inter *Al. Fungi* vel *Al. Boleti* varietates minores et *Al. nigritulam* haud raro obueniunt. Aliaque Microptera, et quidem minima, quae in M. p. 81. ad varietates *Al. Boleti* retuli, forsan e copula varietatum minimarum huius speciei vel *Al. nigritulae* (n. 34.) cum minimis huius familiae speciebus orta sunt.

25. *A. dichroa* M. p. 186.

26. *A. erythroptera*, nigra, nitida; pedibus, elytris, antennarumque basi rufis.

Long. 2 lin.

Affinis *Al. Boleti* (n. 25.); statura autem paulo maiore, thorace transuerso, pedibus paulo crassioribus et colore differt; capite thorace et coleoptris subtiliter quidem, paulo tamen distinctius quam in *Aleochara Boleti*, punctis.

Caput antennis, capitis thoracisque longitudine, fuscis, articulis 3 primis rufis; palpis rufis.

Cole-

*Coleoptra* subquadrata, longitudine vix paulo latiora, rufa, pilis tenuissimis vestita.

*Abdomen* nigrum, ano subrufescente.

Habitat Norimbergae — *Sturm*.

*Oxyporus erythropterus* Panzer Fn. G. H. 27. tab. 21, teste *Sturm*, qui mecum hanc *Aleocharam* communicavit, huc referendus est.

27. *A. obscurella*, nitidula, nigra, griseo-sericans; antennis pedibusque fuscescentibus, illis breuibus validis.

*Long.* fere 2 lin.

*Caput* orbiculatum, vix thorace paulo minus, nigrum, pilis perpaucis griseis subsericans; antennis, capite vix paulo longioribus, crassiusculis, fuscescentibus.

*Thorax* coleoptris vix paulo minor, longitudine vix paulo latior, antice obtusus, lateribus et basi rotundatus, niger, pilis confertioribus griseis sericans.

*Coleoptra* quadrata, nigra, pilis confertis griseis sericantia.

*Abdomen* nigrum, ventretoto et segmentorum marginibus dorsalibus pilis griseis vestitum.

Habitat Rostochii — *Karsten*.

Descripta est e collectione *Hellwigiana*.

28. *A. sericans* nitida, nigra; capite thoraceque sublauro-sericantibus, elytris antennisque fuscescentibus; pedibus piceo-rufescentibus.

*Long.*



*Long.* 2 lin.

*Caput* thorace duplo minus, orbiculatum, nigrum, pilis tenuissimis flauicantibus sericans; palpis antennisque rufo-fuscescentibus, his capitis thoracisque longitudine.

*Thorax* suborbiculatus, niger, coleoptris minor, flauicanti-sericans.

*Coleoptra* quadrata, puncta, piceo-fuscescentia.

*Abdomen* nigrum, ano pallido.

*Pedes* piceo-testacei.

Habitat Blankenburgi — *Knoch*.

E collectione *Knochiana*.

29. *A. terminalis* nitida, nigra; antennis, palpis, pedibus et ano rufis; elytris fuscescentibus.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Statura* teretiuscula.

*Caput* thorace paulo minus; antennis, capite longioribus, crassiusculis.

*Thorax* nitidus, interdum subgrifescens, longitudine paulo latior, conuexus.

*Coleoptra* subtransuersa, nigricantia, subtiliter puncta, minus nitida quam thorax, ad futuram fuscescentia.

*Abdomen* nigrum, ultimis duobus segmentis fuscis.

Vnicum

Vnicum huius speciei individuum, quod examinaui, exstat in collectione *Sturmiana*.

30. *A. cinnamomea* M. 88.

31. *A. marginalis* nigra, nitida; antennis et thoracis marginibus lateralibus fuscescentibus; pedibus rufo-testaceis; elytris rufis, angulo apicis exteriori nigro.

Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Statura Al. praecedentis.

Caput paruum nigrum; ore rufo; antennis pallide fuscis, basi rufis.

Thorax niger, transuersus, lateribus rotundatis, margine laterali obsolete fuscescente.

Coleoptra confertim atque distincte puncta.

E collectione *Latreilleana*.

32. *A. flauipes*, nigra, nitida; elytris subopacis fuscescentibus; palpis, pedibus antennarumque basi testaceis.

Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Caput subglobosum, thorace duplo minus, nitidissimum, nigrum; antennis capite thoraceque vix brevioribus, fuscescentibus, articulis 3 primis rufis; palpis rufis.

Thorax nitidus, subtilissime punctus, transuersus, apicem versus paulo angulatus.

Coleoptra opaca, subtilissime puncta, nigro-rufescentia, circa scutellum nigra.

L Abdo-

*Abdomen* nigrum, nitidum; segmentorum marginibus anoque pallescentibus.

*Pedes* testacei.

Habitat Parisiis, in boletis.

E collectione *Desmarestiana*.

33. *A. aterrima* M. p. 83.

34. *A. nigritula* M. p. 85. — De varietatibus intermediis huius speciei et *Al. Boleti* et *fungi* vide notam ad n. 24.

35. *A. atra*, nigra, subopaca; antennis pedibusque nigrofuscis; thorace quadrato, subcanaliculato.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Corpus* nigrum, subopacum, subtilissime et confertissime punctum.

*Caput* thorace paulo minus; antennis gracilibus filiformibus, corporis dimidii longitudine, obscuro-fuscis; palpis fuscis.

*Thorax* quadratus, angulis obtusis; coleoptris minor; canalicula media longitudinali, saepe autem obsoleta, impressus.

*Coleoptra* quadrata.

*Abdomen* coleoptris triplo longius.

*Pedes* graciles, nigro-fusci, tarsis fuscis, femorum trochanteribus rufo-testaceis.

Habitat Brunsvigae, in muscis, corticem salicum vestientibus, tempore verno — *Dahl*.

*A. atra* — *Knoch*.

36. *A. nigricollis* M. p. 84., habitat Brunsnigae, sub arundine putrescente, in paludosis — *Dahl*.

37. *A. fulgida*, nitida, rufa; capite thorace pectoreque nigerrimis; thorace punctis impresso sparsis distinctioribus.

*Long.*  $2\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, nitidissimum, nigerrimum, punctis aliquot sparsis impressum; antennis, capitis thoracisque longitudine, palpisque rufis.

*Thorax* suborbiculatus, longitudine paulo latior, paulo angustior coleoptris; nigerrimus, nitidissimus; punctis sparsis distinctis minoribus, vnoque magno ante scutellum, impressus.

*Coleoptra* nitida, testaceo-rufa; punctis crassioribus, haud confertissimis, impressa.

*Abdomen* rufum, ano fusco.

*Pedes* testacei.

*Corpus* totum pilosellum.

Habitat Parisiis.

E. collectione *Bosciana*.

38. *A. alternans* M. p. 85.

39. *A. pygmaea* M. p. 86.

40. *A. obfuscata* M. p. 87.

41. *A. opaca* M. p. 89. — Varietatem 1. huius speciei prehendi, primo vere, quamquam haud frequens, in muscis ad arborum radices.

42. *A. umbrata* M. p. 90.

43. *A. collaris* M. p. 72. — Haec species nunc aptissime in duas species peculiares secernitur; quarum una *A. collaris*, altera *Aleochara pulchra* nuncupatur.

*A. collaris* nigra, nitida; thorace pedibusque rufo-testaceis; abdomine rufo, ano nigro.

Long. 2 lin.

Caput nigrum, nitidissimum; palpis fuscis, apice pallidioribus; antennis fuscis, articulo primo et tribus ultimis rufis.

Thorax rufo-testaceus, nitidissimus; punctis subtilissimis sparsis, punctoque uno maiore satis distincto ante scutellum, impressus.

Coleoptra tota nigra, nitida, puncta, pilosella.

Abdomen rufum, nitidum; segmentis 2 ultimis nigris.

Pedes testacei.

Legi hanc speciem, tempore verno, in locis apricis, sub gramine.

*Staph. collaris* Payk. Mon. St. n. 36. — Faun. Suec. St. n. 43.

*Staph. collaris* Olivier Ent. St. n. 54. pl. II f. 13.

Hanc Aleocharam vidi in collectione Bosciana sub nomine *Staph. atricapillus* Fb.

44. *Al. pulchra* nitida, rufa; capite, elytrorum apice, abdominisque segmento antepenultimo vel duobus antepenultimis, nigris.

Long.

Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Haec species a praecedente non solum colore, sed etiam magnitudine minore, punctura subtiliore, antennis minus hirtis, puncto thoracis antescutellari obsoletiore subsemilunari, differt.

Caput nigro-fuscum; ore testaceo; antennis fuscis, articulo primo et ultimo rufo-testaceis.

Thorax rufo-testaceus, punctus, puncto maiore antescutellari obsoletiore, subsemilunari ita ut eius convexitas scutellum versus directa sit.

Elytra nigricantia; margine laterali et apicali, nec non macula quadrata humerali vel basi tota rufis.

Abdomen rufum, apice nigrum, segmento attamen ultimo rufo.

Pedes testacei.

Huius *Aleocharae* individuum modo unicum ipse prehendi, et quidem in boleto; inter multa autem Microptera collectionis *Sturmianae* tria etiam huius speciei individua erant, nullum autem *Aleocharae collaris*.

45. *A. proluxa* M. p. 71.

Var. minor.

Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.

Caput

*Caput* nitidum, nigrum, thorace paulo minus; antennis rufo-fuscis, basi rufo-testacea; ore rufo-testaceo.

*Thorax* orbiculatus, paulo minor coleoptris, nitidus, fuscus, marginibus pallidioribus.

*Colcoptra* quadrata, subtiliter puncta, nitida, rufa, circa scutellum et in apicis angulis nigra.

*Abdomen* rufo-fuscum, ano pallidiore.

*Pedes* rufo-testacei.

Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

46. *A. cincta* rufa; capite, pectore, elytrorum macula, abdominisque segmentis penultimis nigricantibus.

*Long.* 2 lin.

Habitu *Al. sequentis*; statura autem paulo minore et graciliore, antennis paulo brevioribus, thorace minus orbiculato, colore pallidiore.

*Corpus* confertim punctum.

*Caput* nigrum; antennis fuscis, articulis 2 primis et ultimo rufescentibus; palpis rufescentibus.

*Thorax* suborbiculatus, angulis baseos paulo acutioribus quam in *Al. sequente*.

*Elytra* rufa, macula versus apicem transversali nigra.

*Al. cincta* — *Knoch*.



E collectione *Knochiana*.

47. *A. lucida* M. p. 70.

48. *A. limbata* M. p. 69. — Haec species colore et magnitudine variat; thorace autem subtransverso, subcanaliculato, interdum impressionibus sex obsoletis, quas hic accuratius describam, notato, a speciebus affinibus distingui potest; Illae *impressiones thoracis* sunt: linea media longitudinalis; puncta duo ad marginem apicalem, singulo inter lineam illam et angulum apicalem sito; punctum ante scutellum; et, in singulo baseos angulo, foveola arcuata. Omnes autem haec impressiones valde obsoletae sunt, exceptis foveolis in angulis baseos, quae reliquis paulo distinctiores sunt.

*Varietatem* huius speciei, magnitudine egregia, long. 3 lin. *Aleocharae humerali* (n. 50.) statura, partium forma et colore valde affinem, Dom. *Dahl*prehendit sub foliis deciduis in montosis circa Brunsvigam, et mecum communicavit.

*Varietatem* alteram Dom. *Dahl* cum varietate praecedente iisdem locis legit. Haec ab illa differt non nisi magnitudine paulo minore et colore paulo obscuriore. — Long.  $2\frac{1}{2}$  l. — Caput nigrum; antennis fuscis, basi rufescentibus; palpis rufo-fuscis. — *Coleoptra* nigra, subgriseo-sericantia macula humerali parua, inter-

interdum subobsoleta, testacea. — *Abdomen*, (quod in varietate praecedente rufescens est, segmentis 4 intermediis nigricantibus) nigrum, subgriseo-sericans, marginibus segmentorum priorum rufescentibus. — *Pedes* rufo-fusci.

49. *A. funesta* nitida, nigra; palpis, antennis pedibusque fuscis.

*Long.* 2. —  $2\frac{1}{2}$  lin.

A varietatibus duobus praecedentibus *Al. limbatae*, haec species non solum colore sed etiam thorace convexiore paulo minore et deficientibus impressionibus maioribus eius differt.

*Caput* thorace duplo minus, nigrum; antennis, longitudine fere dimidii corporis, fuscis, basi rufescentibus; palpis rufo-fuscis.

*Thorax* longitudine paulo latior, convexior quam in *Al. praecedente* et sequente; subtilissime punctus, paulo minor coleoptris.

*Coleoptra* quadrata, subtilissime puncta, nigra, subgrisescentia.

*Abdomen* nigrum, ventre subgriseo-sericans, interdum fuscescens.

Habitat Brunsvigae, ad saepes, sub foliis deciduis, tempore vernali — *Dahl*.

*Varietas intermedia* inter *Al. limbata* et *Al. funestam*, nigra, nitida, antennis et pedibus fuscis; thorace puncto antescutellari impresso.

*Long.*  $2\frac{1}{3}$  lin.

Habitu,

Habitu, nec non forma proportionē et punctura partium, speciebus 2 praecedentibus similis; thorax autem latior et planior est quam in *Aleochara funesta*, angustior autem et convexus quam in *Al. limbata*; levis, excepto puncto ante scutellum, interdum obsoletiore, et vestigio obsoleto lineae longitudinalis.

Huius varietatis intermediae possideo duo individua, quae Dom. Dahl mecum communicavit.

50. *A. humeralis* M. p. 90. — An varietas maior *Al. limbatae* (n. 48.)?

## FAMILIA IV.

51. *A. ruficornis* M. p. 91. variat etiam antennis fuscis, articulo primo rufo.

52. *A. levis* M. p. 95.

53. *A. brevipennis* nitida, nigra; elytris subopacis, subrufescentibus: palpis pedibus rufescentibus.

Longitudine, statura et partium proportionē *Al. sequentis*; corpore autem haud sericante, elytris crassius punctis etc. differt.

*Coleoptra* elytris quadratis.

*Pedes* rufescentes, femoribus et femorum capitibus obscuris.

Habitat in Borussia — Hellwig.

54. *A. lugens* M. p. 95.

55. *A. moesta* M. p. 96. nigra, nitida; pedibus antennisque pallidioribus.

Long.  $1\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{3}$  lin.

Statura medium tenet inter *A. præcedentem* et *Al. fumatam* (n. 64.); coleoptris crassius punctis ab utraque differt.

Corpus nitidum, pilosellum, nec vero sericeum; punctum, punctis distinctis, nec vero confertissimis.

Caput antennis vel fuscis, vel ochraceis, vel articulis tantum 2 primis rufescentibus.

Coleoptra fusca vel picescentia.

Pedes fusci, tibiis tarsisque interdum rufescentibus.

Habitat etiam Parisiis — Desmarest.

56. *A. fuscipes* M. p. 92. — Haec species, si reuera *St. fuscipes* Payk. est, quod utique credo, etiam cum *St. fuscipede* Fabr. coniungi debet; auctor enim Monographiae Staphylinorum Sueciae fatetur pag. 53., se a Prof. Fabricio litteris certiorum factum esse de identitate huius speciei cum *St. fuscipede*.

57. *A. lata* M. p. 186.

58. *A. bimaculata* M. p. 187.

59. *A. tristis* nigra, nitida; pedibus fuscis; elytris macula apicali sanguinolenta.

Long.  $2\frac{1}{4}$  lin.

Haec

Haec *Aleochara* ab omnibus, cum quibus conferri possit, thorace minus conuexo, latitudine longitudinem duplo fere excedente, minus orbiculato, apicem versus angustiore, etc. differt.

*Coleoptra* puncta, elytris macula, angulum anteriorem apicis versus, sanguinolenta.

Habitat Parisiis, semel modo capta.

60. *A. carniuora*, opaca, nigra; thorace nitido; antennarum articulo primo rufo.

*Statura*, *magnitudine*, nec non partium forma ac proportionem *Aleocharae* sequentis maioris; *statura* autem paulo latiore, colore, *antennisque* differt.

*Antennae* graciliores quam affinibus *Aleocharis* huius familiae, capite thoraceque paulo longioribus, obscuro-fuscis, articulo primo rufescente.

*Elytra* subquadrata, subtilissime puncto-rugulosa.

Habitat in Borussia — Hellwig.

E collectione Hellwigiana.

61. *A. bipunctata* M. p. 93.

62. *A. lanuginosa* M. p. 94.

*Var. intermediae* inter hanc et sequentem speciem, elytrorum macula apicali testacea, rarius occurrunt, Parisiis, in stercore bouino.

63. *A. nitida* M. p. 97. — Variat interdum thorace punctis duobus, magis minusue distinctis, ante scutellum impresso; elytrorum macula rarius futuram attingente. — Habitat Parisiis, in stercore bouino.

*Staph. bipunctatus* Olivier Ent. St. n. 43. tab. V. f. 44.

*Staph. bipustulatus* Linn. Faun Suec. (1761.) n. 847.

64. *A. fumata* M. p. 96. — Varietas huius speciei, elytris rufo-castaneis, marginibus bascos laterum et interdum etiam suturae nigricantibus, exstat in collectione *Sturniana*, Norimbergae.

65. *A. pulla* M. p. 96.

66. *A. excusa*, ore producto, palpis longis; nigra, nitidula; elytris opacis; tarsis fuscis.

*Long.*  $2\frac{1}{2}$  lin.

Haec species, statura quidem corporis, forma et proportionem thoracis coleoptrorumque, *Aleochararum* plurimarum huius familiae; sed forma et proportionem partium oris a conspectibus huius familiae longe differt.

*Caput* orbiculatum, thorace quadruplo minus, leue, nitidum. Antennis filiformibus, capite thoraceque longioribus, nigro-fuscis. Clypeo semicirculari producto, nigro-fusco, minus nitido quam caput. Labro producto  
inte-

integro, longitudine paulo latiore, duplo angustiore quam clypeus, apicem versus angustiore, testaceo, margine subciliato, subnitido. Palpis anticis, longitudine duplici capitis, longioribus quam in conspeciebus; articulo secundo et tertio clauato-elongatis; quarto autem adeo breui et subtili ut vix oculo armato se ostendat. Maxillis testaceo-piceis. Labio exeunte in lacinias duas porrectas filiformes; palpis duobus gracilibus, longitudine laciniarum, his et illis testaceis.

*Thorax* nitidus, conuexus, longitudine duplo latior, apicem versus angustior.

*Coleoptra* transuersa, elytris fere quadratis, margine apicali sinuato, opaca, coriacea, subtilissime et confertissime puncta.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, subopacum.

*Pedes* opaci, nigri, tarsis fusciscentibus.

Habitat Brunsvigae. Dom. Dahl indiuidua eius septem in prato, ad radices salicis, tempore hyberno, legit.

*A. excusa* — Knoch.

Illiger hanc speciem *Tachyporus praemorsus* nuncupabat. Karsten genus huius micropteri *Gymnusa*, speciem *sinuata* nominauit.

67. *A. dubia*, ore producto, palpis longis; nigro-fusca, subnitidula, tenuissime griseo-ferricans;



ricans; pedibus segmentorumque marginibus pallidioribus.

*Long.* 1. —  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* perparuum, obscurum; antennis filiformibus, capitis thoracisque longitudine, fuscis; labro producto testaceo; palpis anticis longioribus fuscis, triarticulatis, (articulo quarto, aliis *Aleocharis* tenuissimo, deficiente), pollicis gracilibus testaceis.

*Thorax* longitudine duplo fere latior, apicem versus angustatus gibbulus.

*Coleopira* elytris latitudine paulo longioribus, subquadratis.

*Abdomen* apicem versus angustatum, pilosellum (vt in *Tachyporis*), obscurum, marginibus segmentorum vltimorum subpallidioribus.

*Pedes* testacei, femoribus basi fuscescentibus.

Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

*Al. dubia* — *Knoch*.

68. *A. minuta*, ore producto, palpis longioribus; subopaca, griseo-fusca, tarsis testaceis.

*Long.*  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{4}{5}$  lin.

Ab *Al.* praecedente, thorace minus gibbulo, nitore pauciore, colore et magnitudine differt.

*Caput* obscuro-griseo-fuscum; antennis, extrorsum paulo crassioribus; capitis thoracisque longitudine, fuscis; labro producto testaceo;

ceo; palpis anterioribus longioribus, 5 articulatis, fuscis.

*Thorax* transuersus, coleoptrorum magnitudine, apicem versus minus angustatus quam in specie praecedente.

*Coleoptra* elytris quadratis.

*Abdomen* nigro-fuscum, minus pilosum quam in specie praecedente.

*Pedes* fusci, tarsis geniculisque testaceis.

69. *A. morion* M. p. 97.

*Varietas* subopaca, tarsis tibiisque fusciscentibus, habitat Parisiis — *Desmarest*.

*Varietas* capite thorace et coleoptris subgriseofuscescentibus, habitat Norimbergae — *Sturm*.

70. *A. pumilio* M. p. 98.

71. *A. pusillima* nitida, nigra; coleoptris fusciscentibus; antennis pedibusque rufescentibus.

*Long.*  $\frac{1}{3}$  lin.

*Statura* partiumque forma et proportionem omnino *Al. praecedentis*; sed differt magnitudine fere duplo minore, nitore splendidior, coleoptris lenibus impunctis (quae illi, oculo armato examinata, puncta sunt), margine apicis integro.

*Caput* antennis apicem versus valde incrassatis, ut in *Al. pumilione*, fuscis, basi testaceis; palpis testaceis.

*Abdomen* ano pallescente.

Habi-

Habitat Brunsvigae, tempore vernali, ad ripas — *Dahl*.

## FAMILIA V.

72. *A. nana* M. p. 98.

73. *A. polita* M. p. 99.

## FAMILIA VI.

74. *A. depressa* M. p. 100.

*Varietatem* fuscam; thoracis coleoptrorumque lateribus paulo pallidioribus; abdominis segmento primo rufescente; pedibus testaceis; capite atro, antennarum fuscarum articulis 3 primis palpisque rufo-testaceis; long.  $1\frac{2}{3}$  lin. — Dom. *Dahl*. Brunsvigae cepit, et mecum sub nomine *Al. comoda* Kn. communicavit.

*Varietas* altera, coleoptris nigro-fuscis, in collectione *Dofciana* mihi sub nomine *Staph. tenuis* Fabr. occurrit. — Eandem varietatem autem, abdomine rufescente, segmentis duobus mediis fuscis, Dom. *Dahl* mecum sub nomine *Al. fulva* Kn. communicavit. His *Al. fulvis* Kn. thorax minus depressus est, quam reliquis, quo haec familia cum familia tertia nectitur. Dom. *Dahl* legit hanc var. Brunsvigae, tempore aestivo, in locis arundinaceis.

75. *A. graminicola* depressiuscula, nigra, nitida; antennis, palpis, pedibusque fuscescentibus. Long.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Statura* depressa nec non forma ac proportionem partium *Al. depressae* (n. 74.) adeo est affinis, ut, nisi differentia coloris adhuc obstaret, nullo modo haesitarem, hanc speciem pro varietate *Al. depressae* declarare. — Quaedam individua, corpore minus depresso et magis conuexo, transitum in familiam III., cuius speciebus confinia sunt reliquis characteribus, euidentissime demonstrant.

Habitat Brunsvigae, lecta in syluis, ad culmos graminum. — *Dahl.*

*A. graminicola* — *Knoch.*

76. *A. deplanata* M. p. 100. nigra, nitida; coleoptris piceo-fuscis; palpis pedibusque testaceis.

*Caput* antennis fuscis, capite paulo longioribus, articulo primo clauato, secundo minore, tertio et quarto minimis, sequentibus multo crassioribus.

*Thorax* longitudine duplo fere latior, coleoptris multo breuior, sed eorum latitudine; canaliculis longitudinalibus parallelis tribus obsoletis impressus, media integra, lateralibus abbreviatis, a basi thoracis usque ad eius medium ductis.

*Coleoptra* quadrata, sutura profunda.

## GENVS VII.

## LOMECHUSA.

Microptera quae ad hoc genus censentur, quibusdam characteribus cum Aleocharis cognata sunt; toto attamen caractere externo, praecipue in forma thoracis expresso, ab eis differunt. *Thorax* nempe marginatus est, marginibus latis eleuatis vel ascendentibus; disco conuexiusculo, sulco longitudinali medio, interdum obsoletiore, canaliculato. *Abdomen* crassius est, quam in vlla Aleochararum specie.

Characteres, omnibus huius generis speciebus communes, sunt

*Corpus* crassum, marginatum.

*Caput* thorace circiter triplo minus; fronte planiuscula, saepius rugulosa. *Palpis* acuminatis. *Antennis* articulo primo crasso, cylindrico, rarius clauato; secundo breui, clauato; tertio paulo longiore clauato; sequentibus pateraeformibus: ultimo ovato, acuto.

*Thorax* transuersus; marginibus lateralibus eleuatis; disco conuexiusculo canaliculato; angulis baseos acutis.

*Coleoptra* transuersa; elytris subquadratis; angulo apicis exteriori acuto.

*Abdo-*

*Abdomen* crassum, marginatum, apice plerumque subreflexum; segmento penultimo plerumque appendiculis lateralibus aucto.

*Pedes* graciles, cursorii, nudi.

1. *L. strumosa* M. p. 91. — *Alcophara strumosa*.

*Caput* antennis extrorsum gracilioribus.

Delendum est in M. p. 92. Synonymum *Staph. emarginatus* Payk. quod ad speciem sequentem refertur.

2. *L. emarginata*: antennis filiformibus, capite thoraceque longioribus; nitidula, fusca, coleoptris pallidioribus.

*Long.*  $1\frac{2}{3}$  — 2 lin.

*Statura* minore et antennis extrorsum haud gracilioribus a *L. strumosa* differt; thorace paulo longiore, apicem versus paulo angustiore, a *L. paradoxa*; multisque aliis characteribus a *L. dentata*.

*Caput*, fronte rugulosa, nigro-fuscum; antennis, capitis thoracis elytrorumque longitudine, filiformibus, rufo-fuscescentibus, subsericantibus, articulo ultimo elongato nitido; ore rufescente.

*Thorax*, coleoptris paulo minor, longitudine paulo latior; subtilissime et confertissime punctus, obsolete canaliculatus; angulis apicis obtusis, bascos productis acutis; fuscus, marginibus lateralibus elevatis pallidioribus.

*Colcoptra* transuersa, elytris quadratis; rufo-castanea, subsericantia, angulis apicis subacutis.

*Abdomen* crassum, coleoptris triplo longius, fuscum, segmentorum marginibus pallidioribus; segmento penultimo laminis duabus lateralibus, parvis, triangularibus, margine ciliatis, exsertis, aucto; ventre pilosello, pilis distinctis, nec vero confertissimis.

*Pedes* obscuro-rufi, nitidi.

Habitat Brunsvigae, vnde Dom. *Dahl* eam mecum communicauit, et in Suecia, vnde Dom. de *Gyllenhal* specimina huius speciei plura Domino *Sturm* milit, qui eam mecum communicauit.

*Staph. emarginatus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 46.

—— ——— *Payk.* Mon. Staph. n. 56. —

Faun. Suec. Staph. n. 44.

5. *L. paradoxa*, antennis filiformibus, capite thoraceque longioribus; rufo-fusca, coleoptris pallidioribus, capite fusco.

*Long.* fere 2 lin.

Affinis speciei praecedenti, differt autem antennis et articulo earum ultimo paulò brevioribus; thorace latiore et breuiore, nulloque modo puncto, nec apicem versus angustato, sed angulis apicis solummodo rotundato-obtusis. Reliqua omnia, praeter colo-

rem



rem paulo pallidiorem, cum descriptione *L. emarginatae* quadrant.

Habitat Pariliis, vnde eam retuli, sub lapidibus, teste *Olivier*.

*Staph. emarginatus Olivier* Ent. St. n. 44. tab. II. f. 12.

4. *L. dentata* antennis extrorsum crassioribus, capitis thoracisque longitudine; nigra, thoracis lateribus et elytris brunneis, his angulo apicis exteriori acutissimo.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  lin.

Haec *Lomechusa* a conspeciebus satis differt, imprimis thorace latiore, lateribus rotundiore, marginibus minus eleuatis, punctura crassiore; angulo apicis exteriori elytrorum acutiore dentiformi; abdominis segmento penultimo simplici.

*Caput* nigrum, opacum, subtilissime punctum; fronte planiuscula, haud rugulosa; antennis, capitis thoracisque longitudine, extrorsum crassioribus, validis, fuscis, articulo primo clauato rufo; mandibulis rufis.

*Thorax* longitudine duplo latior, coleoptris vix paulo minor, apice angustior; punctus; niger, lateribus nigro-brunneis; canaliculatus; marginibus subeleuatis; angulis baseos acutis.

*Coleoptra* transuersa; elytris quadratis, obscuro-castaneis, punctis; margine apicali, angulum

gulum exteriorem versus, emarginato, ita ut angulus exterior ipse in dentem acutum excurrat.

*Abdomen* nigrum, nitidum, ano pallescente.

*Pedes* fusciscentes.

Habitat prope Kaiserslautern, vnde Dom. Professori Hellwig missa est — et in Suecia, vnde Dom. de Gyllenhall hanc speciem, sub nomine *Staph. strumosus* Payk., Domino Sturm misit, qui eam mecum communicavit.

*Staph. strumosus* Payk. Faun. Suec. *Staph.*  
n. 45.

---

## GENVS VIII.

## OXYTELVS.

Genus, corpore depressiusculo (rarius tere-  
tiusculo), antennis extrorsum crassioribus, tho-  
race fulcato, abdomine latiusculo obtuso mar-  
ginato, palpis acuminatis (excepto attamen *Ox.*  
*latipede*, cui palpi filiformes sunt), bene distin-  
ctum. Pedes fossorii; tibiis, praecipue anticis,  
validis, latioribus quam in vlllo alio cogenere,  
spinoso-ciliatis, huic generi proprii sunt: Spe-  
ciebus quidem minoribus (e. g. *O. tenui*, *pedi-  
cello*, *fuliginoso*) tibiae minus validae sunt, quo  
*Aleocharis* adpropinquantur; tibiis attamen, cae-  
teris paribus, semper validioribus quam in Aleo-  
charis, et thorace semper fulcato vel foucolato  
(sulcis interdum obsoletioribus), distingui pos-  
sunt. — Genus aliud, cum quo quaedam Oxy-  
telorum species, e. g. *O. carinatus*, *picus* etc.,  
primo intuitu, aliquam similitudinem habere  
videntur, sunt *Omalia*, et quidem illa eorum,  
quibus thorax fulcatus est; sed forma thoracis  
et eius sulcorum, coleoptera longa, abdomen la-  
tius, sunt characteres sufficientes, quibus haec  
*Omalia*, ipsumque *Om. rugosum*, quod habitu  
*Oxytelis* magis simile est, quam vlla alia huius  
generis species, ab *Oxytelis* differunt, nulla ti-  
biarum

biarum graciliorum et palporum semper filiformium habita ratione. — Genus nouum exoticum, *Piestus* scilicet, corpore depresso, abdomine obtusiusculo, thorace sulcato, coleoptris quadratis, tibiis breuibus validis spinoso-ciliatis, cum hoc genere iungendum foret, nisi antennae palpique filiformes, nec non vitae genus atque victus et habitatio disuaderent.

Oxyteli commode in tres familias distribui possunt: *Familia* I. comprehendit species thorace rugoso-sulcato, sulcis vel profundis et distinctis vel obsoletioribus. — *Familia* II. Oxytelos, complectitur thorace subleni nitido, sulco medio longitudinali inciso. — *Familia* III. Oxytelos statura paulo graciliore et teretiore quam in familiis praecedentibus; thorace puncto, medio vel laeui vel sulco longitudinali angusto inciso. Haec familia, iam habitu toto a reliquis Oxytelis diuersa, speciem quoque continet, quae, palpis filiformibus, nec acuminatis uti in reliquis Oxytelis; thorace puncto, medio leni, nec sulcato; elytris punctis, interdum subpuncto-striatis, saltem in systemate sirenae artificiali nouum genus conderet. Cum autem hic *O. latipes* statura sit *O. tricornis*, et tibiis latis, uti reliqui Oxyteli maiores, hanc speciem cum reliquis huius familiae speciebus coniungere malui, quam eam in peculiare genus redigere.

## FAMILIA I.

*Corpus* planiusculum lineare.

*Caput* thoracis circiter magnitudine vel paulo minus; punctum vel cicatricosum; plerumque lineis duabus longitudinalibus, obsoletis, interdum omnino fere evanescentibus, impressum. Oculis profilientibus. Palpis acuminatis. Antennis articulo 1 longiore subclauato; 2 brevis clauato; 3 parvo; sequentibus pateraeformibus, crescentibus; ultimo suborbiculato, latitudine paulo longiore, apice acuto.

*Thorax* transuersus, coleoptris minor, punctus vel cicatricosus, sulcis longitudinalibus, latioribus, nec vero profundis, impressus.

*Coleoptra* plerumque subquadrata, puncta vel cicatricosa; linea prope futuram, alteraque ab humeris versus medium elytri descendente plerumque impressa.

*Abdomen* lineare, marginatum.

*Pedes* femoribus compressiusculis nudis; tibiis compressis, latiusculis, margine exteriori (in speciebus maioribus) spinoso-ciliato, ante apicem praemorso.

1. *O. fuliginosus* M. p. 102.

2. *O. pedicellus* M. p. 102.

3. *O. depressus* M. p. 103. Huc autem non referendi sunt *Staphylinus depressus* Olivieri, cui

thorax

thorax est canaliculatus, canalicula subobsoleta, elytra quadrata; nec *Staph. depressus* Payk. Mon. St. n. 49. et Faun. Suec. St. n. 58, cui thorax sulco unico, minime profundo, impressus est. Hic *Staph. depressus* Olivieri et Payk. habitat in succo betulae excisae, et probabiliter ad genus *Omalium* pertinet.

Verum *Ox. depressum*, vna cum specie sequente, in collectione *Bosciana* vidi sub nomine *Staph. minutus* Olivieri. Huius autem descriptio et delineatio in Olivieri Ent. St. n. 56., tab. VI. f. 55., nullo modo ad hos *Oxytelos* quadrat, optime autem ad *Omalium striatum*.

*Thorax* subtransversus, subtilissime et confertissime punctus, coleoptris minor, angulis apicis obtusiusculis, sulcis planiusculis.

Color niger opacus, statura parva, punctura conferta, subtilis, vix oculo armato conspicua, sulci thoracis planiores etc. hanc speciem satis a conspeciebus distinguunt.

Fr. 599. 4. *O. nitidulus* M. p. 107.

*Capite* variat maiore et minore. — *Coleoptra* quibusdam latitudine paulo longiora, quibusdam longitudine paulo latiora esse videntur.

Distinguitur a specie sequente statura multo minore.

Confer

Confer quae de *O. nitidulo* sub specie praecedente monui.

5. *O. carinatus* M. p. 106.

Varietatum huius *Oxyteli*, loco citato descriptarum, plures a D. Prof. *Knoch* pro speciebus peculiaribus habentur, quarum nomina specialia, cum diagnosibus et descriptionibus, hic addam:

- a) *O. carinatus*, thorace transverso, crasse puncto, coleoptris paulo minore; angulis apicis subacutis; sulco medio apice lato, basin versus sensim desinente; sulcis duobus adiacentibus basi latioribus, apicem versus angustatis.

Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.

Color variat: Plerumque niger est; antennis pedibusque fuscis; interdum antennarum articulo primo pedibusque rufis; elytris etiam rufo-fuscescentibus; rarius elytris rufo-tellaceis, basi nigricantibus, thorace rufescente (huc pertinet *O. pulcher* M. p. 107.)

- b) *O. sculpturatus*, thorace transverso, cicatriculose puncto, coleoptris paulo minore; angulis apicis subacutis; sulco medio apice latiore, basin versus angulato; sulcis duobus adiacentibus basi vix paulo latioribus.

Long.  $1\frac{1}{3}$  — 2 lin.

Color niger; pedibus rufescentibus; elytris interdum fuscescentibus.

*Thorax*



*Thorax* confertim cicatriculosus, cicatriculis longitudinalibus.

*Varietatem* *O. sculpturati* Dom. Sturm mecum communicavit, longitudine vix 1 lin. excedente, subnitidulam, punctura subtilissima.

c) *O. inustus*, sulcis, atque punctis thoracis vt in praecedente; mandibulis autem validis.

*Long.*  $1\frac{3}{4}$  lin.

Ab *Oxytelis* praecedentibus imprimis differt capite laevi, haud cicatriculose puncto, mandibulis validioribus, thorace conuexiore, sulcis minus profundis.

*Caput* thoracis magnitudine, laeviusculum, nigrum; antennis nigro-fuscis, capite longioribus; mandibulis validis rufis.

*Thorax* coleoptris vix paulo minor, convexiusculus, basin rotundatam versus subangustatus.

*Coleoptra* quadrata, cicatriculoso-puncta, nigro-fuscescentia.

*Pedes* testacei, femoribus obscurioribus.

Huius *Oxyteli* specimen modo vnicum existat in collectione *Knochiana*.

d) *O. insignitus*, thorace transverso, cicatriculoso, coleoptris paulo minore; angulis apicis acutis; sulcis dorsalibus vbique eiusdem latitudinis, medio forsan in medio paulo angustiore quam basi et apice.

*Long.*

*Long.*  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* magnum, thoracis magnitudine, subtiliter cicatriculosum, nigrum; antennis fuscis, basi rufescente; mandibulis et palpis rufotestaceis, longioribus quam in reliquis *Oxytelis*.

*Thorax* niger.

*Coleoptra* picescentia, cicatriculosa.

*Pedes* testacei.

Huius etiam *Oxyteli*, qui in America septentrionali habitat, specimen modo vnicum in collectione *Knochiana* vidi.

- e) *O. infecatus*, thorace subtransverso, cicatriculoso, coleoptrorum magnitudine; angulis apicis subacutis; sulcis et cicatriculis vt in *O. sculpturato*, a quo autem differt colore, statura graciliore, thorace angustiore, coleoptris quadratis, quae illi transuersa sunt.

*Long.* 2 lin.

*Color* niger, palpis pedibus elytrisque pallidis.

Nondum diiudicare audeo, an *Oxyteli*, sub hoc numero descripti, re vera species sint genuinae; an species sint quidam intermediae seu spuriae, e copula specierum duarum genuinarum ortae; an merae varietates. Observationibus egemus accuratioribus et pluribus, quo dubia nostra dissipentur. Plurimi horum *Oxytelorum* rarissime occurrunt; *O.*

*carina-*

*carinatus* et *sculpturatus*, frequentissime. Characteres praecipui, quibus *O. carinatus* ab *O. sculpturato* distingui potest, de thorace, puncto illius, cicatriculoso alterius, nec non de sulco medio, apicem versus prorsum desinente illius, angustato solummodo alterius, desumpti sunt. Hi characteres, si omnibus individuis satis distincti essent, sufficerent ad distinguendam utramque speciem; sed hic haeret aqua; Sulcus angustatus, cum paulo magis adhuc angustatur, tandem desinit; punctum, si paulo comprimitur, cicatriculae simile sit, haec autem, si paulo contrahitur, puncto. Et re vera mihi sunt specimina, quibus iam initium huius commutationis apparet, quamquam nondum omnino transeunt. — Thoracis forma dependet a magnitudine capitis: Capite magno, thorax necessario apice latior esse debet, ad illud recipiendum. Hac vero dilatatione partis anterioris thoracis angulos eius anteriores acutiores fieri oportet. Inde in vna eademque specie, cuius individua capite variant maiore et minore, thoracis anguli anteriores acutiores et obtusiores esse possunt, quod praecipue in *O. piceo* observavi.

6. *O. piceus* M. p. 105. — thorace transverso, puncto, coleoptris minore angulis apicis sub-  
obtu-

obtusis; fulcis dorsalibus vbiq̃ue eiusdem latitudinis.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

*Color* niger; ore, antennarum basi, pedibus et elytris testaceis, his interdum piceo-testaceis.

Ne ratione quidem habita coloris, qui attamen huic speciei constantior esse videtur, *O. piceus* ab *O. carinato* forma sulcorum, imprimis sulci medii, ab *O. sculpturato*, *inusto* et *infecato*, non solum forma sulcorum, sed etiam punctura thoracis, ab *O. insignito* proportionē partium et punctura thoracis distinguī potest.

Huic Oxytelo alius affinis est, quam D. Prof. *Er. 591.*

*Knoch* *O. sculptus* nuncupavit. Differt thorace lateribus subrotundatis, basin versus paulo angustiore, coleoptris breviorē et paulo angustiore, fusco seu rufo; coleoptris quadratis, rufescentibus seu piceo-testaceis; abdomine fusco vel piceo-rufo. Habitat in Germania et in America septentrionali.

7. *O. caelatus* M. p. 103. —

Varietas huius speciei occurrit nigra, thorace antennisque fuscis, pedibus ore elytrisque testaceis.

*Thorax* huius Oxyteli haud quadrifoveolatus nominari potest, foveae enim laterales obsoletissimae esse solent, et, cum minus obsoletae

soletae sunt, attamen sub specie impressionum leuium tantummodo se praebent.

Quaedam de hoc *Oxytelo* et de varietatibus intermediis sub specie sequente adhuc monebo.

8. *O. corticinus* niger, nitidulus; antennis pedibusque fuscis; thorace suborbiculato, opaco, foveis duabus subobsoletis.

*Long.* 1 lin.

*Caput* orbiculatum, thorace paulo minus, opacum, nigrum; ore antennisque fuscescentibus, his capite duplo longioribus.

*Thorax* suborbiculatus, vix longitudine paulo latior, basin versus sensim subangustatus, coleoptris paulo minor; foveis duabus disci subparallelis longitudinalibus, nec basin nec apicem thoracis attingentibus, basi autem paulo distinctioribus, impressus; niger, subopacus.

*Coleoptra* quadrata, puncta, nigro-fusca, nitidula, interdum subgriseo-sericantia.

*Abdomen* elongatum, elytris quadruplo longius, nigrum, nitidulum, subgriseo-sericans.

*Pedes* fusci, apicibus tibiaram tarsisque pallidioribus.

Hic *Oxytelus* differt a specie praecedente, statura minore et graciliore; punctura subtiliore, punctis thoracis laterum, quae illi distin-

distincta sunt, deficientibus; foveis thoracis haud arcuatis sed fere parallelis rectis; colore obscuriore elytrorum et pedum.

Habitat in Borussia et in Germania passim. Quaedam specimina prehendi vere primo, in locis apricis, sub lapidibus.

Sunt nonnulla *Oxytelorum* specimina, quae medium tenere videntur inter *O. caelatum* et *corticinum*.

a) *O.* thorace bifoveolato; nigricans, nitidulus; elytris fusco-piceis; basi antennarum, palpis et pedibus testaceis.

*Statura* minore et graciliore quam *O. caelatus*, paulo tamen maiore et crassiore quam *O. corticinus*.

*Thorax* foveis haud quidem arcuatis, apice attamen paululum distantibus, et distinctioribus quam in *O. corticino*.

*Punctura* thoracis elytrorumque subtilis est ut in *O. corticino*.

*Coleoptera* latitudine paulo longiora.

Hic *Oxytelus*, vnicus in mea collectione, idem est, cuius iam mentionem feci M. p. 104.

sub var. 4. *O. caelati*.

b) *O.* thorace puncto antecollari et foveis duabus impresso; niger, nitidulus, antennis pedibusque pallidioribus.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

N

*Statura*

*Statura* intermedia inter *Ox. caelatum* et *corticinum*.

*Caput* nigrum, palpis et antennarum basi testaceo-rufis.

*Thorax* foveis duabus longitudinalibus, vix paululum arcuatis, apice attamen magis distantibus, punctoque distincto (qui interdum etiam in *O. caelato* obsoletissime adesi) supra apices fovearum, nec non impressione laterali distincta impressus.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora; linea longitudinali humerali distinctiore quam in *O. corticino* impressa.

*Punctura* thoracis et elytrorum subtilis est.

*Pedes* rufi, femoribus interdum obscurioribus.

Huius *Oxyteli* Specimina duo Dom. Sturm benevolenter mecum communicavit. — Forsan species est peculiaris, cum, thoracis puncto antecollari et impressione laterali distinctis, non tam medium tenet inter *O. caelatum* et *corticinum*, quam ab utroque differt.

## FAMILIA II.

*Corpus* planiusculum lineare.

*Caput* thoracis magnitudine vel paulo minus, impressione inter antennis excauatum; palpis et antennis ut in familia prima.

*Thorax*



*Thorax* transuersus, apice truncatus, lateribus et basi rotundatus; coleoptrorum magnitudine; punctis cicatriculosis magis minusue impressus; linea longitudinali medio canaliculatus.

*Coleoptra* quadrata, cicatricoso-puncta.

*Abdomen* marginatum, lineare.

*Pedes* vt in familia praecedente, tibiis anticis autem margine exteriori ante apicem excisso.

9. *O. morsitans* M. p. 108.

10. *O. cornutus* M. p. 109.

Haec species capite quidem hispino ab *O. morsitante* satis differt; quaeritur autem, an non haec cornua differentiam solummodo sexualem respiciant, quod utique analogiae respondet, cum in multis aliis coleopterorum speciebus, praecipue *Geotrupum*, *Copridum* nec non in *O. tricorni* haec differentia sexualis indubitata sit. *O. cornutus* multo quidem rarius occurrit quam *O. morsitans*, nec eum vnquam prehendi, licet hic vulgatissimus sit; sed *Copridis Taurus* mas quoque multo rarius est quam femina, quae frequens in fimo habitat.

#### FAMILIA III.

*Corpus* teretiusculum, lineare.

N 2

Caput

*Caput* thorace paulo minus, puncto-cicatricosum; tuberculo inter antennis subelevato; palpis plerumque acuminatis (in *O. latipede* filiformibus); antennis, articulo primo longiore, subclauato, secundo breui clauato, tertio tenui, sequentibus crescentibus pateraeformibus, ultimo suborbiculato, latitudine paulo longiore, apice acuto.

*Thorax* connexiusculus; subquadratus, angulis rotundatis; coleopteris minor; puncto-cicatricosus; linea media longitudinali plerumque canaliculatus.

*Coleoptra* connexiuscula, quadrata, puncta seu puncto-cicatricosa.

*Abdomen* lineare, connexiusculum, marginatum.

*Pedes* femoribus compressiusculis, nudis; tibiis compressis, latiusculis, margine exteriori spinoso-ciliato; tarsis gracilibus, articulis 4 transuersis, quinto elongato subclauato.

578. 11. *O. tricornis* M. p. 109.

*Oxytelos*, loco citato sub hac specie conjunctos, Dom Prof. *Knoch* in duas species peculiarese iungendos esse putat. Individuis scilicet maioribus, thorace scabro, punctis crassis subcicatriculosis; longitudine 3 linearum, nomen remanet *O. tricornis*. Minores autem, thorace connexiore subtiliusque puncto;

cto; punctura quoque elytrorum subtiliore; longitudine  $1\frac{1}{2}$  linearum; seu verum *Staph. armatum* Panz. Dom. Prof. Knoch pro specie peculiari declarat. Mihi autem sunt specimina, quae, omnibus datis characteribus, medium tenent inter *O. tricornem* et *armatum*, et ambas species coniungunt. Omnibus est caput in medio frontis subtuberculatum; e singulis thoracis punctis pili nascuntur singuli breues tenues fului, qui, cum thorax ita inspicitur, vt basis eius faciem inspicientis versus directa sit, colorem efficiunt fuluosericantem; hic color sericeus in specie minore autem distinctior est, quam in specie maiore.

Dom. Dahlprehendit *O. armatum* tempore verno, sub foliis deciduis, in syluis.

12. *O. pallipes* nitidulus, punctus, niger; ore pedibusque testaceis; thorace subunifuscato.

Long. 2 lin.

Habitu, statura, partiumque forma proportionem et puncturam omnino cum speciminibus intermediis inter *O. tricornem* et *armatum* congruit; colore autem semper differt.

Caput et thorax indiuiduorum omnium, quotquot eorum vidi, inermes erant.

Femora interdum fuscescunt.

Habi-

Habitat in Gallia et Germania, Dom. Dom. Desmarest, Sturm et Dahl hanc speciem mecum communicauerunt. Dom. Dahl legit specimina plura Brunsvigae, in gramine ad fossas.

Quamuis autem omnia quae vidi specimina ad vnam eandemque speciem referenda sint, attamen quasdam obseruo differentias inter *O. pallipedem germanicum* et *O. pallipedem gallicum*; Illi thorax nempe paulo conuexior, punctura paulo subtilior est, punctis elytrorum adhuc quidem distinctis, thoracis autem subtilissimis; sulca thoracis quibusdam individuus obsoleta est, quibusdam omnino extincta, eiusque loco linea nitida obsoleta superest. Obseruo etiam in *O. pallipede gallico* puncta duo maiora in disco thoracis, quae *germanico* vel omnino desunt, vel, et quidem speciminibus illis, quibus sulca longitudinalis thoracis omnino deest, obsoleta sunt.

13. *O. latipes* palpis filiformibus, haud acuminatis; thorace postice truncato.

Long.  $2\frac{1}{3}$  lin.

Corpus nitidum, fere cylindricum.

Caput suborbiculatum, thoracis magnitudine, nigrum, punctum, ad basin leuius. Oculis paruis lateralibus. Labio palpisque rufis. Antennis capite longioribus, pilosellis, rufis; articulo primo clauato longiore; secundo

cundo paulo tenuiore et breuiore; 4 sequentibus minimis, campanulatis, crescentibus; 7 — 10 maioribus campanulatis; ultimo suborbiculato.

*Thorax* obscuro-fuscus; latitudine et longitudine coleopterorum; conuexus, basin versus sensim paulo attenuatus; punctus, punctis dorsalibus in series duas dispositis, ora laterali apicem versus angustata.

*Scutellum* paruum, triquetrum, obscuro-fuscum.

*Colcoptera* subquadrata, obscuro-fusca; puncta, punctis interdum in series subdispositis.

*Abdomen* nigrum, subpunctum, subpilosellum, crassum, cylindricum, segmento quinto reliquis longiore.

*Pedes* fossorii, rufi. Capitibus femorum aequalibus. Femoribus compressis. Tibiis fossoriis dilatatis, compressis; margine infero recto vel subconcauo, exteriori conuexo, ciliis rigidis limbriato. Tarsis gracilibus.

Habitat in America septentrionali. Exstat in collectione *Knochiana*.

Cum hoc insectum palpis instructum sit filiformibus, antennis extiorum crassioribus, thorace inmarginato basi truncato, Tachinis adnumerandum foret, si solos characteres artificiales, M. p. 134. datos, respiceremus.

Habi-

Habitu autem toto et, exceptis vltimis palporum articulis, partibus etiam singulis cum *Oxytelis* huius familiae plane congruit. Certo systematis naturalis nullam haberemus rationem, cum hoc micropteron *Tachinis* adiungeremus. *Oxytelis* autem, sicut huc vsque determinati erant, ob characteres per systema artificiale constitutos, haud adsociari potest. Eodem ergo iure, quo *Altrapaei* genus olim a *Staphylinis* disiungebatur, quibus attamen simillimum est, hoc etiam insectum genus nouum, ab *Oxytelis* separatum, conderet, nisi regula systematis naturalis, i. e. character totus externus seu habitus totus, disuaderet.

---

## GENVS IX.

## EVAESTHETVS.

Micropteron, e quo cel. *Knoch* nouum genus, sub nomine *Euaesthetus*, condidit, debemus Dom. *Dahl*, insectorum felici et indefesso indagatore, qui hoc insectum primo Brunsvigae legit. Hoc genus, ratione staturae et thoracis sulcati, aliquam prodit affinitatem cum *Oxytelis*; accuratius autem et oculo bene armato examinatum, plures praebet characteres, quibus satis ab illis differt, imprimis fabrica peculiari palporum et antennarum.

*Statura* paulo crassior est et connexior quam *Oxytelis*.

*Caput* thorace paulo minus, punctis scabrum. Antennis capite paulo longioribus, extrorsum crassioribus; articulo primo clauato, secundo perbreui, tertio longiore et validiore quam secundus, 4-8 minutis subtransuersis, 9 et 10 multo crassioribus transuersis, vltimo omnium crassissimo, ouato, apice acuminato. Clypeo lato integro. Mandibulis falcatis. Palpis anterioribus capitis longitudine, triarticulatis; articulo primo clauato; secundo multo breuiore et angustiore quam primus; tertio ouato, reliquis crassiore, subacuminato.

(Hoc



(Hoc acumen vix oculis optime armatis distinguere potui et dubius adhuc haereo, an acumen illud articulus sit peculiaris an non). Oculis profilientibus lateralibus ad basin capitis.

*Thorax* latitudine longitudinis, basin versus angustatus; coleoptrorum longitudine, sed duplo fere angustior; punctus; bifoveolatus, foveis disci oblongo-ovatis, apicem versus angustioribus.

*Coleoptera* transversa, elytris fere quadratis; puncta, circa scutellum impressa.

*Abdomen* crassiusculum, marginatum.

*Pedes* tibiis haud spinosis; articulis tarsorum parvis.

1. *E. scaber* fuscus, nitidus; capite rufo, antennis palpis et mandibulis pallidioribus; pedibus fusco-rufis.

*Long.*  $\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* rufum; antennis rufo-testaceis, articulo ultimo fusco; mandibulis et palpis testaceis.

*Abdomen* elytris triplo fere longius, nigro-fuscum.

Habitat Brunsvigae — Dahl.

*Euacethetus scaber* — Knoch.

## GENVS. X.

## O M A L I V M.

Hoc genus, habitu depressiusculo, coleoptris thorace longioribus, saepius abdominis maximam partem tegentibus, thorace transuerso, dignoscitur. — Comparisonem huius generis cum *Oxytelis* vide supra, ubi de *Oxytelis* disserui. — Praeter coleoptra longa et habitationem species huius generis pauca tantum communia cum *Anthophagis* habent. Palpi quidem et pedes insectis vtriusque generis similes sunt, habitus vero totus dissimilis: *Anthophagis* nempe sunt coleoptra thorace multo latiora; hic subquadratus, basin versus angustior; antennae filiformes. — Sicut vero in familia prima *Tachypororum* transitus se ostendit in aliud *Coleoptrorum* genus, quod non *Micropteris* adnumeratum est, sic etiam in hoc genere: Quaedam species *Omaliorum* e familia secunda, e. g. *O. pallidum* et *ophthalmicum*, cum genere *Kateretes* (Herbstii) affines esse videntur, ratione habita habitus totius externi, imprimis thoracis transuersi et coleoptrorum longitudinis; sed *Kateretibus* sunt antennarum articuli tres vltimi reliquis multo crassiores, thorax immarginatus, et tarsi quadriarticulati (haud triar-

triarticulati, vti in *Herbstii Sylliematis Coleopterorum* Tom. IV. pag. 11. tab. I. dictum et delineatum est. Omaliis autem antennae quidem extrorsum crassiores sunt, sed articuli 4 ad 11 sensim crescunt; thorax lateribus est marginatus; tarsi quinquearticulati, vt omnibus coleopteris micropteris.

Omalia, secundum longitudinem elytrorum, cum thoracis longitudine collatam, in duas familias segregantur; *Fam. I.* Coleoptris thorace paulo longioribus. *Fam. II.* Coleoptris thorace duplo et plus duplo longioribus.

#### FAMILIA I.

Er. 636. 1. *O. planum* M. p. 112.

Descriptioni, loco citato datae, quaedam addenda sunt:

*Color* variat: 1) niger; coleoptris fusciscentibus; ore, basi antennarum, pedibusque pallidioribus. 2) fuscus; thorace elytrisque picescentibus; ore, basi antennarum, pedibusque testaceis.

*Long.*  $\frac{3}{4}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* foveolis longitudinalibus duabus inter antennis impressum.

*Thorax* transuersus, longitudine fere duplo latior, basin versus paulo angustior, trifoveolatus, foveis discoidalibus longitudinali-

bus

bus, quarum laterales breues sunt, nec apicem nec basin thoracis attingunt, intermedia autem recta integra est, basin et apicem thoracis attingens, apice attamen plerumque magis dilatata. Hae foucolae autem interdum subobsoletae sunt.

*Coleoptra* thorace duplo fere longiora sunt.

2. *O. depressum* M. p. 113. 635

Varietas huius speciei obscuro-fusca, ore, antennis, pedibusque rufescentibus, habitat Norimbergae — *Sturm*.

3. *O. pusillum* nitidulum, nigrum; thorace bifoueolato coleoptrisque fuscis; ore, antennis et pedibus testaceis. 631

*Long.* vix 1 lin.

*Caput* suborbiculatum, thorace minus, nigrum; ore et antennis testaceis, his, capite thoraceque paulo brevioribus, apice fusciscentibus.

*Thorax* vt in *O. plano*; bifoueolatus, foveolis distinctis ovalibus ante scutellum.

*Coleoptra* fusca, subtilissime puncta.

*Abdomen* nigricans; ano pallidiore.

Habitat Brunsvigae, raro, semel tantummodo captum.

*Varietas* exstat intermedia inter *O. planum* et *pusillum*, thoracis foucolis tribus, intermedia autem obsoletiore.

630. 4. *O. pygmaeum* nitidum, rufum, conuexiusculum, capite plerumque obscuriore; coleoptris punctis.

Long. 1 lin.

Habitu nec non forma et proportionem partium *Omalii brunnei*, a quo, magnitudine minore, coleoptris haud striatis, thorace haud canaliculato, differt. Ab *O. crenato* magnitudine minore et coleoptris haud crenato-striatis se distinguit.

*O. brunneum* var. 3. M. p. 114.

Dom. Gyllenhal hoc *Omalium* cum Dom. Sturm communicavit sub nomine *Staphylinus pygmaeus* Paykull.

631. 5. *O. brunneum* M. p. 113., nitidum, rufum; oculis, plerumque toto capite, apice elytrorum et ano nigris; thorace bifoveolato; coleoptris puncto-striatis.

Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.

Ab *Ob. crenato* praecipue thorace foveolato differt. Differentia harum duarum specierum, quam olim etiam de antennarum articulo ultimo desumsi, nimis subtilis est; Antennae *O. crenati* paulo longiores et graciliores sunt quam *O. brunnei*; inde sequitur, articulos etiam earum paulo graciliores et longiores esse debere, quod vero non nisi comparatione antennarum distingui potest.

*Staph.*

*Staph. melanocephalus* Ol. Ent. St. n. 55.  
tab. IV. f. 32.?

*Omalius* vidi e collectione *Sturmiana*, statura nec non partium forma atque proportione *O. brunnei*, longitudine 2 lin; thorace subfoveolato; elytris autem, quod bene notandum, haud puncto-striatis, sed, vt in *O. pygmaeo*, punctis subtilibus impressis.

6. *O. crenatum* M. p. 114.

Quaedam de hac specie iam sub n. 4 et 5 monui.

Cel. *Fabricius* ad *Staphylin. crenatum* in Ent. Syst. St. n. 26. et in Syst. Eleuth. St. n. 34. allegauit Payk. Fn Suec. III. 403. n. 47. et Payk. Monogr. Curcul. App. 146. n. 45. E descriptione Fabriciana huius micropteri et e citatis patet, vt credo, Fabricium descrip-  
sisse verum *Om. crenatum*. Nescio autem cur Dom. *Fabricius* in Ent. Syst. hoc insectum cum *Staph. striatulo* comparauit, cui statutam et magnitudinem *Staph. fulgidi* tribuit.

7. *O. rufum* M. p. 115. — — — — — Ex. 620

8. *O. castaneum* nitidum, obscuro-castaneum; antennis, pedibus, elytrisque paulo pallidioribus; thorace orbiculato. Ex. 620

Long. 2½ lin.

Habitu *Om.* praecedentium; statura autem graciliore, thorace orbiculato etc. differt.

Caput

*Caput* nigricans, *antennis* palpisque rufis.

*Thorax* orbiculatus, punctus, lateribus marginatus, *coleoptris* breuior et vix angustior.

*Coleoptra* puncto-vel crenato-striata.

Habitat Norimbergae — Sturm.

9. *O. brachypterum* M. p. 114.

10. *O. cursor* nitidum, nigrum; *elytris* pedibusque picescentibus.

Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.

*Caput* orbiculatum, *thorace* paulo minus, leue, nitidum, nigrum; *antennis*, *capite* *thorace*que paulo longioribus, fuscis.

*Thorax* conuexiusculus, suborbiculatus, *coleoptris* paulo minor, nitidus, leuis, niger.

*Coleoptra* subtransuersa, nitida, leuia, fusco-picea.

*Pedes* ochracei.

Habitat in Borussia — Hellwig.

11. *O. rugosum* M. p. 115.

*Staph. rugosus* Fabr. Ent. Syst. St. n. 54. — Syst. Eleuth. St. n. 66. — E citato, quod Fabricius ad hanc speciem allegauit, scilicet Olivier Staph. n. 42. tab. V. f. 45., apparet, illum *St. rugosum* Fbr. nihil aliud esse quam *O. rugosum*. Cel. Paykull *Staph. rugosum* Fbr. perperam ad var.  $\beta$ . *Staph. picci* n. XII., quae verus *Oxytelus carinatus* est, allegat.



## FAMILIA II.

12. *O. riuulare* M. p. 116.

*Caput* foveolis quatuor impressum, duabus scilicet inter oculos, duabus ad basin; ore rufo.

*Coleoptra* interdum omnino fere nigra sunt.

Dom. Prof. *Knoch* plures adhuc condidit *Omalius* species, de quibus autem dubius sum, an non forsan varietates vnius eiusdemque speciei sint:

- a) *O. caesum* nigrum; antennis elytrisque pallidioribus; palpis pedibusque rufescentibus; thoracis foveis duabus dorsalibus profundis ouatis.

*Long.* 1 —  $1\frac{1}{3}$  lin.

Statura et partium forma ac proportione *O. riuularis*; sculptura autem et punctura multo crassiore et distinctiore, nec non forma fovearum thoracis diuersum.

*Thorax* rugosus; foveis duabus dorsalibus, longitudinalibus, apicem thoracis haud attingentibus, profundis, intervallo multo angustiore quam in *O. riuulari*; puncto supra illas foveas impresso.

*Coleoptra* plicis longitudinalibus duabus prope suturam.

- b) *O. incisum* ab *O. riuulari* non nisi magnitudine minore differre videtur. Sunt quidem specimina, thoracis margine pallidiore distin-

cta (eaeque semper inter minora reperiuntur); hic autem character nondum mihi sufficit ad speciem statuendam ab *O. riuulari* diuersam. *Abdomen* nigricans est vel nigro-fuscum, interdum margine et ventre pallidioribus.

- c) *O. Oxyacanthae* differt ab *O. riuulari* non nisi longitudine tantummodo 1 lin. et articulo primo antennarum nigro.

Omnia haec *Omalia* characteribus essentialibus, i. e. forma atque proportionem partium satis inter se congruunt, nec nisi magnitudine et colore, qui iure inter characteres minus essentielles numerantur, atque sculptura et punctura magis minusue distinctis et profundis differunt. Quod ad foueas thoracis, hae in quibusdam speciminibus, quae sine ullo dubio ad *O. riuulare* pertinent, fere adeo distinctae et profundae sunt ac in *O. caeso*,

633. 13. *O. Viburni* M. p. 117.

14. *O. florale* M. p. 118.

*Stenus floralis* Fabr. El. II. n. 6.

*Geoffr.* Hist. St. n. 15.

*Staph. rufipes* Fourcr. Ent. St. n. 15.

*Geoffroy* citat quidem *Staph. rufipedem*

*Linn.*, quem ad *Tachyporum rufipedem* retuli, sed thorax marginatus, margine laterali eleuato distincto, iam ostendit, hanc speciem haud ad genus *Tachypororum* referri posse.

15. *O. laeue* nigrum, nitidum; palpis, antennarum basi, thoracis marginibus lateralibus et inferiore, elytris, pedibusque rufo-picescentibus.

Long.  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Habitu O. rivularis*, statura autem latiore, thorace haud sulcato etc. differt.

*Caput* nigrum, palpis et antennarum articulis duobus primis rufescentibus.

*Thorax* minus convexus quam in speciebus confinibus, transversus, lateribus rotundatis, apicem versus paulo angustior; subtiliter punctus; niger, marginibus lateralibus et baseos rufescentibus.

*Elytra* apice oblique truncata; subtiliter puncta, vix obsolete striata; latiora quam in speciebus affinibus; rufo picea.

*Anus et pedes* rufo-picei.

Habitat in Borussia — Hellwig.

16. *O. fuscum* nitidum, crasse punctum, fuscum, antennis pedibusque pallidioribus.

Long. 2 lin.

*Caput* thorace triplo minus, punctum, sine lineis impressis, nigro-fuscum; antennis extrorsum paulo crassioribus, subfiliformibus, capite thoraceque paulo longioribus, rufescentibus.

*Thorax* longitudine latior, coleoptrorum fere latitudine, conuexus, punctus, nigro-fuscus; marginibus subelevatis pallidioribus; impressione glabra, haud puncta, ante scutellum notatus.

*Coleoptra* thorace duplo longiora, conuexa, puncta, nigro-fusca.

*Abdomen* coleoptris haud duplo longius, nigrum, nudum, haud punctum; ano acuto rufescente.

*Pedes* rufescentes, femoribus obscurioribus.

Vnicum huius *Omali* individuum meae collectionis debeo beneuolentiae Dom. Sturm, qui hanc speciem *Norimbergae* cepit.

17. *O. nigrum* nitidum, nigerrimum; basi antennarum pedibusque rufis.

Statura, magnitudine, latitudine, partiumque forma ac proportione *O. riuularis* (n. 12); thorace autem haud foveolato, et coleoptris paulo breuioribus differt. — Ab. *O. florali* (n. 14) praeter colorem, coleoptris etiam brevioribus, quae illi thorace triplo fere longiora sunt, differt.

Long.  $1\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* thorace duplo minus; antennis, capitis fere et thoracis longitudine, fuscis, articulis 4 primis rufescentibus; palpis rufis, articulo ultimo anteriorum subfuscescente.

*Thorax*

*Thorax* conuexus, coleoptrorum fere latitudine, illis autem duplo breuior, punctus, impressionibus duabus disci obsoletis.

*Coleoptra* latitudine paulo longiora, subcrenato-siriata, siriis obsoletis.

*Abdomen* coleoptris duplo longius.

Duo huius speciei individua Dom. Sturm debeo.

18. *O. quadrum* fuscescens, abdomine nigro, *Er. 619*  
thorace quadrato, antennis subfiliformibus.

*Long.* 2 lin.

*Caput* nigrum; antennis, capitis et thoracis longitudine, subfiliformibus, fuscis, articulis longitudine decrescentibus, primo rufescente; palpis rufescentibus.

*Thorax* longitudine latitudinis; nigro-fuscus, marginibus pallidis.

*Coleoptra* obscuro-fusca, marginibus laterum et apicis pallidis.

*Abdomen* latum, acuminatum.

*Pedes* testaceo-rufi, capitibus femorum obscurioribus.

E collectione *Knochiana*.

*Staphylinus borealis* Payk. Faun. Suec. St. n. 57.?

19. *O. tectum* nigrum, nitidulum; elytris et  
summis marginibus thoracis fuscis; thorace  
subcanaliculato. *628*

*Habitu*

*Habitu* omnium huius familiae *Omaliorum*,  
*statura* autem latiore.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Caput* nigrum, antennarum articulo primo  
 palpisque rufescentibus.

*Thorax* longitudine duplo latior, canali-  
 cula media longitudinali obsoleta et puncto  
 distincto marginum lateralium impressus; ni-  
 ger, marginibus summis laterum et baseos rufis.

*Coleoptra* thorace paulo latiora, subtilissime  
 et confertissime puncta, rufo-fusca.

*Abdomen* a coleoptris omnino fere tectum,  
 nigrum; ano fusco.

*Pedes* rufo-testacei.

Habitat in Suecia, vnde Dom. cel. *Paykull*  
 vnicum illud indiuiduum, de quo haec de-  
 scriptio desumpta est, collectioni *Boscianae* Pa-  
 risiis communicavit.

Indiuiduum alterum, quod Dom. *Gyllenhal*  
 ad Dom. *Sturm* misit, hic vero mecum com-  
 municavit, cum illo quidem conuenit, differt  
 autem longitudine vix lineam vnicam super-  
 ante; thoracis canalicula obsoletissima, pun-  
 ctis autem tribus distinctis ante marginem  
 lateralem, margine basis haud rufo.

*Staph. tectus* Payk. Mon. St. n.

—— — *Olivier* Ent. St. n. 52. t. III.

20. *O. Ramunculi* M. p. 113.

21. *O. macropterum* nigricans, nitidum; antennis palpisque fuscis; pedibus rufo-testaceis.

Long.  $\frac{2}{3}$  lin.

*Habitus* crassiusculus.

*Caput* nigrum; antennis, capitis thoracisque longitudine, extrorsum valde incrassatis, articulis 2 primis validioribus, rufescentibus, tertio gracili, 4 — 7 crescentibus, 8 — 10 pateraeformibus crescentibus, ultimo globoso.

*Thorax* subtilissime punctus, longitudine duplo latior.

*Coleoptra* puncta, abdominis maximam partem tegentia.

E collectione *Knochiana*.

22. *O. ouatum* nitidum, nigrum; pedibus, palpis et antennarum articulo primo pallidis; thorace leui.

*Statura* reliquis *Omaliis* breuiore et latiore, ouata; lateribus coleoptrorum subrotundatis.

Long. fere 1 lin.

*Caput* thorace plus duplo minus; punctis duobus inter antennis et duobus inter oculos, saepius obsoletioribus, impressum; palpis testaceis; antennis, vix capitis thoracisque longitudine, fuscis, articulo primo crassiore, rufo-fusco, nitido, reliquis articulis, ut in omnibus huius familiae speciebus, pilosellis.

*Thorax*



*Thorax* longitudine duplo latior, coleoptris angustior et triplo breuior, levis.

*Coleoptra* subtiliter et confertissime puncta; in medio latitudine longitudinis, apicem et basin versus paulo angustiora; angulis elytrorum apicis rotundatis.

*Abdomen* coleoptris haud duplo longius.

*Pedes* piceo-testacei.

*Dermestes brachypterus* Panz. Faun. Germ. IV. tab. 10; icon accuratissimum.

*Kateretes brachypterus* Herbst. Nat. d. K. V. n. 2. tab. XLV. f. 2.

*Dermestes brachypterus* Fabr. Ent. Syst. Derm. n. 46. — Sylt. Eleuth. Derm. n. 45.

6. 631. 23. *O. striatum* M. p. 119.

Ad hanc speciem credo referendum esse *Staph. minutum* Olivier Ent. St. n. 56. tab. VI. f. 53; licet autem, in collectione cel. Boscii, sub nomine *St minutus* Olivieri alia viderim infecta, scilicet *Oxytelum depressum* et *Ox. nitidum*, attamen descriptio et delineatio *Staph. minuti* in Entomologia Olivieriana nullo modo ad hos *Oxytelos* quadrat, melius vero ad *Omalius striatum*.

11. 24. *O. ophthalmicum* nitidum, testaceum; oculis et abdomine (interdum solo ano) nigris.

Long.  $\frac{2}{3}$  lin.

Magni-

Magnitudine minore et colore pallidiore ab *Omaliis* sequentibus differt. Statura nec non partium forma atque proportio eadem sunt ac in praecedentibus.

*Caput* linea transuersali inter antennis, et punctis duobus inter oculos, interdum obsoletioribus, impressum; testaceum; oculis nigris; apice antennarum fuscescente.

*Thorax* testaceus, puncto antescutellari et linea longitudinali subobsoletis impressus.

*Coleoptra* paulo pallidiora quam caput et thorax.

*Abdomen* vel totum nigrum, pectore rufotestaceo; vel testaceum, apice fusco.

*Pedes* testacei.

*Staph. ophthalmicus* Payk. Faun. Suec. St. n. 54.

Dom. Sturm, cui hanc speciem misit Dom. Gyllenhal, beneuolenter eam mecum communicauit.

25. *O. pallidum*, nitidum, rufum, elytris testaceis, oculis nigris, thorace subleui.

Long. 1 —  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Habitu* *Omaliorum* sequentium.

*Caput* inter antennis linea transuersali obsoleta seu punctis duobus, plerumque etiam inter oculos punctis duobus impressum; rufum,

fum, oculis nigris, palpis et antennarum basi testaceis.

*Thorax* rufus, marginis lateralis basi pallidior; puncto ante scutellum, nec non linea longitudinali subobsoleta impressus.

*Coleoptra* testacea.

*Abdomen* et *pedes* rufo-testacei.

Habitat haud raro in floribus.

E. 64. 26. *O. testaceum*, nitidum rufum, elytris testaceis; abdomine oculisque nigris; thorace leui.

*Long.* vix. 1 lin.

*Statura* breuiore quam *Om.* sequens, a quo etiam thorace conuexiore, haud foveolato, differt.

*Caput* thorace duplo minus, punctis 2 interocularibus, interdum obsoletis, impressum; rufo-testaceum, oculis nigris; antennis, capitis thoracisque longitudine, testaceis, articulis 4 ultimis fuscescentibus.

*Thorax* vt in *Om.* sequente, sed conuexior, absque foveolis, linea interdum media longitudinali obsoleta impressus; rufo-testaceus, nec medio obscurus.

*Coleoptra* testacea, latitudine longiora.

*Abdomen*, vt in specie sequente, nigrum, ano pallidior; pectore vel nigricante vel rufescente.

*Pedes* rufo-testacei.

Habi-

Habitat in floribus.

*Dermestes semicoleoptratus* Panz. Faun.  
Germ. H. XXIV. tab. 6.

27. *O. abdominale* nitidum, rufum, elytris testaceis, abdomine oculisque nigris; thorace bifoveolato. 639

Long. 1 —  $1\frac{1}{2}$  lin.

Caput thorace duplo minus, linea transversali inter antennis impressum; rufo-testaceum, oculis et mandibulis fuscis; antennis capitis thoracisque longitudine, subfusco-testaceis, pilosellis, articulo primo nitido pallidiore.

Thorax longitudine duplo fere latior, coleoptris angustior et plus duplo breuior; foveis 2 discoidalibus, nec apicem nec basin attingentibus, subarcuatis, conuexitate latus versum spectante, impressus; rufo-testaceus, disco fuscescente.

Coleoptra latitudine duplo longiora, testacea.

Abdomen latum, breue, coleoptris laud duplo longius, ano acuto; nigrum, pectore rufescente.

Pedes testacei.

Habitat in floribus.

## GENVS XI.

## ANTHOPHAGVS.

*Anthophagi*, thorace subquadrato, convexiusculo, basin versus angustiore, coleoptris longis, thorace latioribus, habitu sunt peculiari et a genere praecedente satis distincti. Antennae etiam filiformes bonum praebent characterem distinctivum. — Cel. Latreille in suo *Précis des genres des Insectes*, opere, quod nondum videram, cum Monographiam Micropteriorum ederem, et serius, in sua *Histoire naturelle générale, et particuliere des Crustacés et des Insectes*, *Anthophagos* etiam a reliquis microptervis, sub nomine generali *Lesteva* seiunxit.

1. *A. alpinus* M. p. 188. niger; thorace fusco, marginibus pallidioribus; ore, antennis, coleoptris, pedibusque testaceis.

Statura magnitudine, partiumque forma proportionem et punctura *A. caraboidi* adeo similis est ut vix dubitarem, quin eum statim pro eius varietate haberem, nisi *A. caraboides* insectum apud nos pernulgare esset, ille autem nunquam mihi occurrisset.

*Staph. alpinus* Olivier Ent. St. n. 45.  
tab. VI. f. 55.

Payk.

*Payk. Faun. Suec. St. n. 27.*

*Fabr. Ent. Syst. St. n. 33. — Syst. Eleuth. St. n. 43.*

2. *A. caraboides* M. p. 120.

*Staph. caraboides Olivier Ent. St. n. 26. tab. II. f. 17.*

*Staph. fulvus De Geer Mem. St. n. 12.*

3. *A. testaceus* M. p. 121.

In collectione *Bosciana* varietatem vidi huius *Anthophagi* rufam, capite anoque nigris.

4. *A. intermedius* nigricans, nitidulus; antennis, palpis pedibus obscuro-rufis.

Longitudine, habitu et partium punctura atque proportionem omnino *Anthoph.* praecedentis; exceptis attamen antennis et palpis paulo crassioribus et brevioribus.

Habitat Brunsvigae — *Hellwig.*

Teste *Illigero* hic *Anthophagus* est *Carabus abbreviatus* *Panz.*

5. *A. armiger* M. p. 122.

6. *A. dichrus* M. p. 133.

7. *A. obscurus* M. p. 122.

In collectione *Bosciana* vidi, sub nomine *Staph. bicolor* *Fabr.* varietatem huius speciei, thoracis margine basali summo pallidiore.

Ad ea, quae loco citato de *Staph. tecto* *Payk.* dixi confer *Onalium tectum*.

8. *A.*

8. *A. plagiatus* M. p. 189. et 123.

Long. 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

*Thorax et coleoptra pilis vestita sunt tenuibus, flavo-grisescens.*

Habitat in Suecia, vnde Dom. *Gyllenhal* hunc *Anthophagum* Dom. *Sturm* communicavit, cui collectio mea eum debet.

---



## GENVS XII.

## PIESTVS.

Species noua atque elegans, quae vnica hoc genus condit, forma antennarum et palporum, nec non vitae ratione, cum *Anthopagis* quidem congruit, caractere autem toto externo et partium plurium singularum forma atque proportionem satis ab omnibus micropteris differt.

*Corpus* depressum, lineare.

*Caput* triangulare, thorace triplo minus, punctum; oculis globosiusculis; clypeo obtuso; mandibulis falcatis; antennis filiformibus, dimidio corpore longioribus, pilosellis, articulo primo clauato reliquis crassiore, 2 et 3 clauatis, 4 — 11 cylindricis; palpis filiformibus.

*Thorax* longitudine paulo latior, coleoptris vix angustior sed paulo breuior, punctus, angulis basis truncatis, sulco medio longitudinali integro (vt in *Oxytelo morsitante*), et altero abbreviato in vtroque basis angulo.

*Coleoptra* longitudine paulo latiora, sulcis 12 profundis rectis longitudinalibus parallelis integris impressa.

*Abdomen* obtusiusculum, subtilissimo punctum.

*Pedes*

*Pedes* breues, validi, tibiis ferrato-ciliatis.

1. *P. sulcatus* fuscus, niidus; palpis antennis et pedibus pallidioribus.

*Long.* 2 lin.

*Caput* subtilissime punctum, ruga parua longitudinali inter antennis, fuscum; clypeo palpis et antennis pallidioribus; his pilofellis, praecipue in latere interiore primi articuli, vbi pili in penicillum rigidiusculum compacti esse solent.

*Thorax* subtilissime punctus.

*Pedes* rufescentes.

E collectione *Comitis de Hoffmannsegg*.

Habitat in Brasilia, vbi *Dom. Sieber*, itinerator peritus et de historia naturali bene meritus, indiuidua plura huius speciei legit in quadam *Musae* specie.

---

## GENVS XIII.

## S T E N U S.

*Steni* cum nullo alio genere comparandi et aequae singulares sunt ac *Oxypori*. Corpus crassum, teretiusculum, depile, cicatricosum seu punctis crassis impressum, obscurum; caput magnum, oculis profolientibus, palpis gracilibus longis; thorax teres, medio latior, coleoptris angustior; abdomen subcylindricum durum, ano acuto; pedes graciles cursorii; et multa alia characteres huius generis sunt. — *Caput* plurimis speciebus rugosum est, margine scilicet circa oculos magnos et fronte ipsa, ad modum iugi longitudinalis, eleuatis. Quibusdam hoc ingum satis est distinctum, aliis obsoletum.

1. *St. Iuno* M. p. 154.

Habitat, primo vere, in apricis, in quisiuiliis, sub tegmine graminis et sub lapidibus.

2. *St. biguttatus* M. p. 154.

*St. bipustulatus* Ljungh p. 63. n. 4. meliorem iure ad hanc speciem allegari potest quam *St. biguttatus* Ljungh, de quo haud affirmare possum, num sit varietas huius *Steni*, num propria species.

*Stenum* vidi in collectione *Latreilleana* Parisiis, qui, longitudine lin. 2., colore omnino *St. Iuno*, habitu autem gracili *St. biguttati* erat. Alterum vidi *Stenum* in collectione *Hellwigiana* Brunsvigae nigrum, tarsis fusciscentibus, gutta elytrorum rufa; longitudine *St. biguttati*, statura autem latiore et crassiore; pedibus nigris, tarsis et summo tibiæ apice fusciscentibus; elytrorum gutta disci rufa, maiore et obsoletiore quam in *St. biguttato* communi.

*Geoffroy* Hist. St. n. 24.

*Staph. biguttatus* Fourcr. Ent. St. n. 24. — In his duobus operibus sub vnam eandemque speciem amplectuntur omnes *Steni*, quorum magnitudo duas lineas excedit. *Geoffroy* vnus ex illis est, qui *Stenos* macula elytrorum fulua pro maribus reliquorum *Stenorum* habent, quibus haec macula deest; quod autem minime valet.

3. *St. cordatus* M. p. 198.

4. *St. boops* iugo frontali distincto; totus niger.

Long.  $2\frac{1}{4}$  —  $1\frac{2}{3}$  lin.

Color corporis niger, vix paululum subcinerascens.

Caput, iugo frontali distincto, nigrum, pilis paucissimis cinerascens, vix oculo armato

armato conspicuis, vestitum, palpis rufo-testaceis; antennis, capite thoraceque brevioribus, fuscis, articulo primo obscuriore.

*Thorax* longior quam in speciebus plurimis sequentibus, longitudine elytrorum, ante apicem latior, basin versus angustatus, linea longitudinali distincta impressus.

Habitat in arena humida ad ripas.

*St. Juno Ljungh* p. 60. n. 1.

*Var. 1. St. niger*; palpis pedibusque, exceptis geniculis, quae nigra sunt, testaceis. — Hanc varietatem Dom. *Sturm* mecum communicavit.

*Var. 2. St. niger*; pedibus nigro-fuscis, femoribus basi testaceis; palpis fuscis, anterioribus basi testaceis.

Hae varietates, statura magnitudine partiumque forma proportionem punctura et sculptura cum vero *St. boope* congruentes, forsitan etiam e copula huius *Steni* cum sequente ortae sunt.

5. *St. oculatus* M. p. 155. cinerascens, palpis testaceis; antennis rufo-testaceis, articulo primo nitido nigerrimo; pedibus testaceis, geniculis nigris.

*Caput* cinerascens; clypeo cinereo-pilosello, oculis cinereo-fuscis, palpis pallide-testaceis; antennis, capitis thoracisque longitudine, testaceis, articulo primo nigro.

*Thorax* coleoptris paulo brenior.

*Varietas* antennis obscuro - fuscis, articulo primo nigerrimo nitido, habitat Parisiis — *Desmarest*.

*Varietas* altera, cui Dom. Prof. *Knoch* olim nomen *St. geniculatus* tribuerat, statura paulo graciliore, thorace paulo longiore (longitudine scilicet latitudinem paululum excedente, cum *St. oculato* communi thorax longitudine latitudinis sit) punctura paulo subtiliore, longitudine  $2\frac{3}{4}$  linearum, a *St. oculato* communi differens, ad species intermedias inter hunc et praecedentem *Stenum* pertinere videtur.

*Varietatem* tertiam, cuius specimina plura Dom. *Dahl* Brunsvigae legit, Dom. Prof. *Knoch* olim pro specie peculiari, sub nomine *St. spectator* habuit et mecum communicavit his characteribus distinctivis: "*St. spectator* haud *St. oculati* varietas est, nam semper ab hoc differt latitudine insigniore, tuberculo frontali orbiculato (cum *Steno oculato* linea longitudinalis elevata frontalis sit), coleoptris thorace longioribus, habitatione." Ego autem, collatione specierum ambarum, hos characteres distinctivos nimis subtiles putabam ad sciungendum illos *Stenos* in duas species peculiare. Haec varietas autem, statura quidem minore, attamen punctis aequae crassissim-

impressa est ac *St. oculatus* maior. Serius etiam Prof. cel. *Knoch* differentiam specialem inter *St. oculatum* et *spectatorem* sustulit.

Hanc speciem saepius cum specie sequente socialem locis humidis cepi.

*St. similis* *Ljungh* St. p. 65. n. 5.

6. *St. cicindeloides* M. p. 155.

*St. similis* var.  $\beta$ . *Ljungh* p. 66.

7. *St. clauicornis* M. p. 156. cinereo-niger; antennis palpisque testaceis, basi apiceque nigricantibus; thorace suborbiculato.

*Caput* iugo frontali subobsoleto; antennis testaceis seu rufescentibus, apicem versus fuscescentibus, articulo primo nigro.

*St. buphthalmus* *Ljungh* St. p. 67. n. 7.

8. *St. binotatus* cinereo-niger; antennis palpisque ferrugineis, basi apiceque nigricantibus; thorace elongato.

Differt a specie praecedente, thorace longiore, colore obscuriore palporum et antennarum, punctura subtiliore, et thorace foueolato. — Attamen mihi sunt individua, quae, characterum distinctiuorum ratione, medium tenent inter ambas species, et forsan e copula earum spuria ortum ducunt.

*Long.*  $2\frac{2}{3}$  lin.

*Caput* iugo frontali obsoleto.

*Thorax*



*Thorax* elongatus, medio (sed apici paulo propius) latior; dorso, paulo infra medium, foveis 2 irregularibus impressus.

Habitat Brunsvigae — *Knoch*.

*St. binotatus* *Ljungh* St. p. 66. n. 6.

9. *St. buphthalmus* M. p. 156. totus cinereo-niger; iugo frontali et canalicula thoracis obsoletis.

*Thorax* latitudine paulo longior, medio latior.

*Punctura* crassa, cicatriculosa.

Hanc speciem copiose primo vere, cum pluribus huius generis speciebus, nunquam autem cum *St. biguttato*, in arenosis humidioribus sub gramine legi.

Variat *statura* paulo crassiore vel paulo graciliore.

*Varietatem* alteram, *punctura* paulo subtiliore, colore paulo magis cinereo, Dom. Prof. *Knoch* pro specie peculiari habet et ei nomen *St. canaliculatus* dedit.

10. *St. morio* totus cinereo-niger; canalicula thoracis deficiente.

*Long.*  $1\frac{1}{3}$  lin.

Haec species differt a *St. buphthalmo* non nisi *statura* paulo minore, *antennis* paulo longioribus, et deficiente canalicula thoracis.

Habitat Brunsvigae — *Dahl*.

*St.*

*St. morio* — *Knoch*.

*Varietatem* huius *Steni*, thorace et coleoptris perpaululum brevioribus, Dom. Prof. *Knoch* pro specie peculiari, sub nomine *St. latifrons*, habet. — Dom *Dahl* plures huius varietatis *Stenos* in sylva legit prope Brunsvigam.

11. *St. opticus* niger; iugo frontali et canalicula thoracis deficientibus.

Differt a *St. praecedente*, statura paulo minore, colore nigriore, thorace et coleoptris paulo brevioribus, iugo frontali deficiente.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Color* niger, (haud cinereo-niger, vti plurimis huius generis speciebus).

*Punctura* ratione parvitatatis corporis multo crassior est quam reliquis cospeciebus.

*Caput* fronte plana, vix vestigio obsoleto iugi ad basin capitis.

*Thorax* latitudine paulo longior, interdum linea longitudinali obsoleta impressus.

Captus Brunsvigae hibernans sub muscis ad arborum cortices — *Dahl*.

*St. opticus* — *Knoch*.

12. *St. Argus* subcinereo-niger, antennis palpis pedibusque fuscis; thorace medio latiore; iugo frontali distincto.

Hic *Stenus* distinguitur a *St. optico* punctura crassiore et iugo frontali distincto, (distinctiore

tinctorum quam in omnibus speciebus affinis); a *Steno* sequente thoracis forma et statura maiore.

*Long.*  $1\frac{1}{2}$  lin.

*Color* haud exacte cinereo-niger est, vti v. c. in *St. fuscipede*, *clavicorni* etc. sed nitidior.

*Punctura* est distinctior, licet haud crassior, quam in quibusdam speciebus minorum, cum quibus haec confundi posset.

*Caput* iugo frontali distincto.

*Thorax* latitudine paulo longior, medio latissimus.

*Habitat* sub muscis — *Dahl*.

*St. Argus* — *Knoch*.

13. *St. fuscipes* M. p. 157. cinereo-niger; antennarum palpis pedibusque fuscis; iugo frontali distincto; thorace ante apicem latiore.

*Long.*  $1\frac{1}{4}$  lin.

*Caput* iugo frontali distincto, sed minus distincto quam in *St. Argus* et *circulari*.

*Thorax* latitudine longior, ante apicem, haud exacte in medio, latior, basin versus angustatus.

*Pedes* fuscis; femoribus subrufo-fuscis, geniculis obscuris.

*St. fuscipes* et *St. Argus*, characteribus et descriptionibus his a me datis, inuicem et a reliquis conspeciebus bene quidem distingui possunt;

possunt; quaeritur autem, num omnes huius generis species receptae re vera species sint genuinae? nec forsan vna alteraue nihil aliud sit quam varietas aut species spuria intermedia? *St. fuscipes* et *St. Argus* medium tenere videntur inter *St. opticum* et *St. pallipedem* sequentem; et eis, quae supra, ad Genus *Staphylinorum*, de copula dixi, adhibitis, ortus *St. fuscipedis* et *St. Argus* e copula harum duarum specierum, possibilitati saltem haud repugnare videtur. — Commendo Entomologis observationes diligentes de copula spuria insectorum, quo hypothesis mea experientiis vel probari vel refutari possit.

14. *St. pallipes* M. p. 157.

Stenum mecum communicavit Dom. Sturm huic speciei perassinem, distinctum autem corpore paululum crassiore, i. e. capite paulo latiore, thorace paulo globosiore, coleoptris paulo latoribus; punctura subcrassiore; thorace impressionibus quatuor, armato oculo distinctis, in quadratum dispositis aequilaterale, impresso.

Hic *Stenus*, cuius specimen vnicum Dom. Sturm debeo, forsan peculiaris speciei est.

15. *St. circularis* M. p. 157. cinereo-niger; thorace breui; minutus.

Long.  $\frac{4}{3}$  lin.

Caput

*Caput* iugo fontali distinctissimo; antennis et palpis fusciscentibus; mandibulis testaceis.

*Thorax* latitudine vix paulo longior, medio latissimus, apicem et basin versus angustatus.

*Pedes* nigri, femoribus basi subfusciscentibus.

*St. rotundatus* Ljungh St. p. 67. n. 3.

## GENVS XIV.

### O X Y P O R V S.

Habitus totus seu character totus externus et forma partium quarundam hoc genus optime distinguunt, ita vt nunquam cum vlllo alio genere confundi possit.

1. *O. maior* niger, nitidus; tarsis et elytrorum maculis duabus magnis longitudinalibus testaceis.

*Long.* 5 lin.

*Caput* permagnum, thorace fere duplo maius, nigrum. Antennis fuscis, articulo primo basi nigro.

*Thorax* transuersus, basin versus angustior.

*Elytra* nigra; macula humerali vsque ad medium elytri producta, alteraque suturae propiore, longitudine fere totius elytri, testaceis; striis duabus punctorum et praeterea punctis quibusdam vagis disci impressa.

*Pedes* nigri, tarsis rufescentibus, tibiis anticis sublaescenti-sericantibus.

Habi-

Habitat in America septentrionali — *Knoch*.  
E collectione *Knochiana*.

2. *O. rufus* M. p. 151.  
*Payk. Mon. St. n. X.*
3. *O. lateralis* M. p. 195.
4. *O. caelatus* M. p. 197.
5. *O. maxillofus* M. p. 152.
6. *O. vittatus* M. p. 195.
7. *P. femoralis* M. p. 196.
8. *O. cinctus* M. p. 196.

\*                      \*

Vetustissimum quod vnquam vidi micropteron, reliquum mortuum sed bene conseruatum e temporibus antiquitatis priscae, *Oxyporus* est electro inclusus fossilis, e collectione rerum naturalium cel. *Blumenbachii*. Persuassus autem, descriptionem huius *Oxypori* omnibus naturae inuestigatoribus optatam fore \*), venia vtor possessoris huius *Oxypori* vnici, illamque descriptionem hic addo;

*Long. 7 lin.*

*Caput*

\*) Vtinam *Blumenbachius* multorum quae possidet electro inclusorum insectorum descriptionem et comparationem cum insectis hodiernis affinis ederet. Ingenium viri celeberrimi et de historia naturali iam diu egregie meriti perpensam sane hypothesin de ortu et formatione electri nobis inde impertire posset.

*Caput* quadratum, angulis obtusis, thorace maius — Antennis capitis longitudine, pilosellis; articulo primo longiore; articulis 7 sequentibus dimidia illius longitudine; ultimis haud rite dignoscendis sed, uti videtur, materiae heterogena obductis, qua speciem clauae praebent (antennae alterius pars dimidia deficit). — Oculi haud dignoscendi sunt. — Clypeus exacte ut in *Oxyporis* hodiernis formatus, transuersus, margine anteriore paululum emarginato. — Instrumenta cibaria maximam partem destructa sunt, ita ut forma eorum haud exacte dignosci possit.

*Thorax* transuersus, exacte ut in nostris *Oxyporis* formatus; margine anteriore recto, posteriore rotundato; capitis latitudine sed dimidia eius longitudine.

*Scutellum* haud dignoscendum.

*Coleoptra* paululum e situ naturali remota, thoracis magnitudine; elytris quadratis.

*Abdomen* coleoptris triplo longius, e segmentis 8 conflat.

*Pedes*, numero forma longitudine et proportionem partium, omnino respondent pedibus *Oxypororum* nostrorum; numerus autem articulorum in tarsis haud perspicue videri potest.

*Color* pallide flauus est. Color naturalis verisimile omnino euauit.



# I N D E X

## GENERVM ET SPECIERVM

### HVIVS MONOGRAPHIAE.

*Aleochara* G. VI. p. 144.

14	<i>Aethiopæ</i>	p. 153	56	<i>fuscipes</i>	p. 170
38	<i>alterrans</i>	163	75	<i>graminicola</i>	176
13	<i>analis</i>	153	50	<i>humeralis</i>	169
33	<i>aterrima</i>	162	4	<i>impressa</i>	150
35	<i>atra</i>	—	15	<i>inquinula</i>	153
58	<i>bimaculata</i>	170	62	<i>lanuginosa</i>	171
61	<i>bipunctata</i>	171	57	<i>lata</i>	170
23	<i>Boleti</i>	156	52	<i>levis</i>	169
53	<i>brevipennis</i>	169	48	<i>limbata</i>	167
17	<i>callicera</i>	153	2	<i>linearis</i>	148
1	<i>canaliculata</i>	148	21	<i>longiuscula</i>	155
60	<i>carninora</i>	171	47	<i>lucida</i>	167
46	<i>cincta</i>	166	54	<i>lugens</i>	169
30	<i>cinnamomea</i>	161	31	<i>marginalis</i>	161
22	<i>circellaris</i>	155	68	<i>minuta</i>	174
43	<i>collaris</i>	164	55	<i>moesta</i>	170
12	<i>corticalis</i>	152	69	<i>morion</i>	175
76	<i>deplanata</i>	177	72	<i>nana</i>	176
74	<i>depressa</i>	176	11	<i>nigra</i>	152
3	<i>dimidiata</i>	149	36	<i>nigricollis</i>	163
25	<i>dichroa</i>	158	34	<i>nigritula</i>	162
67	<i>dubia</i>	173	63	<i>nitida</i>	172
18	<i>elongatula</i>	153	40	<i>obfuscata</i>	163
26	<i>erythroptera</i>	158	8	<i>obscura</i>	151
66	<i>excusa</i>	172	27	<i>obscuraella</i>	159
32	<i>flauipes</i>	161	41	<i>opaca</i>	163
9	<i>fracticornis</i>	152	10	<i>picea</i>	152
37	<i>fulgida</i>	163	73	<i>polita</i>	176
64	<i>fumata</i>	172	45	<i>prolixa</i>	165
49	<i>funesta</i>	168	44	<i>pulchra</i>	164
24	<i>Fungi</i>	157	65	<i>pulla</i>	172
		56			70

70	pumilio	p. 175	28	sericans	p. 159
16	pufilla	153	6	fulcata	150
71	pufillima	175	7	fulcatula	151
39	pygmaea	163	20	teres	155
19	reptans	154	29	terminalis	160
5	riularis	150	59	tristis	170
51	ruficornis	169	42	umbrata	163

*Anthophagus* G. XI. p. 220

1	alpinus	p. 220	4	intermedius	p. 221
5	armiger	221	7	obscurus	—
2	caraboides	—	8	plagiatus	222
6	dichrus	—	3	testaceus	221

*Euæsthetus* G. IX. p. 201

1	scaber	p. 202
---	--------	--------

*Lathrobium* G. IV. p. 128

16	badium	p. 135	1	latipes	p. 129
17	bicolor	—	13	lineare	132
6	brunnipes	131	9	longiusculum	131
18	castaneum	135	15	longilum	134
2	depressum	129	11	multipunctum	131
12	elongatum	132	4	pallipes	130
3	fracticorne	130	7	pilosum	131
5	fuscum	—	10	politum	—
8	gracile	131	14	terminatum	134

*Lomechusa* G. VII. p. 178

4	dentata	p. 181	3	paradoxa	p. 180
2	emarginata	179	1	strumosa	179

*Omalius* G. X. p. 203

27	abdominale	p. 219	16	fuscum	p. 211
9	brachypterum	208	15	laene	—
5	brunneum	206	21	macropterum	215
8	castaneum	207	17	nigrum	212
6	crenatum	—	24	ophthalmicum	216
10	cursor	208	22	onatum	215
2	depressum	205	25	pallidum	217
14	florale	210	1	planum	204
		16			3

3 pusillum	p. 205	11 rugosum	p. 208
4 pygmaeum	206	23 striatum	216
18 quadrum	213	19 tectum	213
20 Ranunculi	215	26 testaceum	218
12 rinulare	209	13 Viburni	210
7 rufum	207		

*Oxyporus* G. XIV. p. 234

9 Blumenbachii	p. 235	1 maior	p. 234
4 caelatus	—	5 maxillofus	235
8 cinctus	—	2 rufus	—
7 femoralis	—	6 vittatus	—
3 lateralis	—		

*Oxytelus* G. VIII. p. 183

7 caelatus	p. 191	9 moritans	p. 195
5 carinatus	187	4 nitidulus	186
10 cornutus	195	12 pallipes	197
8 corticinus	192	2 pedicellus	185
3 depressus	185	6 piceus	190
1 fuliginosus	—	11 tricornis	196
13 latipes	198		

*Paederus* G. V. p. 136

9 angustatus	141	8 orbiculatus	141
3 bicolor	138	1 ochraceus	138
4 castaneus	139	11 riparius	143
5 corticinus	—	2 rubricollis	138
7 fragilis	140	13 ruficollis	143
12 littoralis	143	6 vestitus	140
10 littorarius	142		

*Piestus* G. XII. p. 223

1 sulcatus	p. 224
------------	--------

*Staphylinus* G. III. p. 35

126 aeneocephalus	p. 213	38 Anthrax	67
80 acneus	86	120 ater	112
70 agilis	77	74 atratus	84
68 albipes	76	19 atricillus	55
109 alternans	107	20 attenuatus	61
	38		122

122	baltimorensis	112	108	fulgidus	106
32	bimaculatus	63	10	fuliginosus	48
62	binotatus	73	107	fulminans	105
33	bipustulatus	63	106	fulvipennis	104
60	blandus	72	66	fulvipes	75
54	boops	71	43	fumarius	67
50	breuicornis	69	123	fuscatus	112
22	brunneus	57	26	fuscus	59
124	brunnipes	112	99	glaber	100
2	Capucinus	40	100	glabratus	101
42	carbonarius	67	148	hirtus	125
132	castanopterus	116	36	immundus	66
37	celer	66	1	impressus	39
53	cephalotes	71	81	laminatus	86
141	chloropterus	121	129	latebricola	113
147	Chrysis	124	4	lateralis	42
146	chrysocephalus	—	8	laticollis	47
84	cinctulus	89	101	lentus	101
137	cinerascens	117	64	lepidus	74
140	cingulatus	121	94	linearis	97
127	cinnamopterus	113	131	lutarius	115
15	coenofus	51	116	macrocephalus	111
14	corruscus	—	145	maculosus	123
114	cyaneus	110	56	marginatus	71
78	cyanipennis	86	20	maurorufus	56
77	decorus	85	150	maxillofus	126
88	denigrator	92	111	melanocephalus	107
85	dilatatus	89	79	metallicus	86
24	discoideus	58	69	micans	76
63	dubius	74	52	microcephalus	70
41	ebenus	67	9	moestus	47
104	elegans	103	6	molochinus	46
98	elongatus	98	121	morio	112
97	emmesus	—	142	murinus	122
133	erythropterus	116	93	nanus	96
143	femoratus	122	139	nebulosus	121
72	finetarius	80	44	nigrita	68
65	flauopterus	74	90	nigritulus	94
134	fodiens	116	71	nitens	78
61	formosus	72	51	nitidulus	69
135	fossator	117	5	nitidus	42
136	fossor	—	95	ochraceus	97
187	fulgens	91	39	ochropus	67
		108	1		151

151	oculatus	p. 126	119	similis	p. 111
117	olens	111	82	splendens	87
35	opacus	64	89	splendidulus	93
16	palliatu8	53	86	stenoides	90
110	palimula	107	130	stercorarius	115
48	parucornis	69	30	subuliformis	61
91	paluulus	95	18	tenellus	54
125	pedator	113	59	tenuis	72
17	peregrinus	53	29	terminatus	61
112	planatus	108	27	testaceus	60
76	politus	85	57	thoracicus	71
21	praecox	57	118	tomentosus	111
92	procerulus	95	113	tricolor	110
144	pubescens	123	11	tristis	48
96	punctulatus	98	7	Ulmi	47
75	punctus	85	46	umbratilis	69
23	pygmaeus	57	47	umbrinus	—
103	pyropterus	102	83	vagepunctus	88
102	relucens	101	73	varians	82
49	rigidicornis	69	28	ventralis	60
58	ruficollis	71	67	vernalis	75
12	ruficornis	50	138	versicolor	119
105	rufipennis	104	149	villosus	126
40	rufipes	67	45	Virgo	69
34	sanguinolentus	64	115	violaceus	110
53	scintillans	70	3	xantholoma	41
13	scitus	50	128	zonatus	113
25	sericans	59			

*Stenus* G. XIII. p. 225

12	Argus	p. 231	3	cordatus	p. 226
2	biguttatus	225	13	fuscipes	232
8	binotatus	229	1	luno	225
4	boops	226	10	morio	230
9	buphthalmus	230	5	oculatus	227
6	cicindeloides	229	11	opticus	231
15	circularis	233	14	pallipes	233
7	clavicornis	229			

*Tachinus* G. II. p. 22

16	analis	p. 30	11	axillaris	p. 29
14	atricapillus	—	9	bicolor	28
		11			18

18 cernuus	p. 31	17 merdarius	p. 31
15 cinctus	30	8 nanus	28
1 dissimilis	23	12 niger	30
19 formosus	32	5 punctus	27
20 inclinans	33	2 quadripunctulus	24
4 lepidus	26	3 splendidus	24
13 lunulatus	30	6 striatus	27
7 melanocephalus	27	10 tristis	29

*Tachyporus* G. I. p. 1

15 abdominalis	p. 7	29 laticollis	p. 15
10 analis	6	21 limbatus	12
37 batychnus	20	23 marginalis	13
33 bicolor	17	13 marginatus	7
6 bimaculatus	5	27 marginellus	13
5 binotatus	—	31 memnonius	17
4 bipunctatus	—	20 nitidulus	11
39 bipunctulatus	21	38 pallipes	20
19 cappillaricornis	10	2 pedicularius	4
7 cellaris	5	8 pubescens	5
12 chrysomelinus	7	30 pullus	16
24 collaris	13	18 pusillus	9
26 corticinus	—	16 ruficollis	7
9 crassus	6	35 rufipes	17
34 fimbriatus	17	11 saginatus	6
28 finetarius	14	32 signatus	17
1 granulum	3	40 subterraneus	21
36 humeralis	19	22 suturalis	13
25 immaturus	13	17 transversalis	8
14 lateralis	7	3 truncatellus	5

## INDEX SYNONYMORVM.

*Not.* Verbum abbreviatum *auct.* significat, omnes vel plurimos auctores, sub nomine indicato, speciem descripsisse vel eius mentionem fecisse; *M.* significat Monographiam meam Micropteroꝝ de anno 1802.; *MM.* hanc recentiore; numerus paginam.

\* \* \*

### *Aleochara.*

Boleti *M.* varietates *MM.* 152

strumosa *M.* *MM.* 179

tenuis *M.* *MM.* 152

*Astrapaeus M. Panz. MM. 47.*

*Callicerus M. MM. 153.*

### *Carabus.*

abbreviatus *Fabr. M.* 121

### *Omalius.*

brunneum *M. v. 3. MM.* 206

striatum *M. MM.* 186

### *Oxyporus.*

abdominalis *Fabr. M.* 127

analís *Fabr. Panz. M.* 130

bicolor *Rossi M.* 149

bimaculatus *Fabr. M.* 131

bipustulatus *Fabr. Panz. M.* 136

brunneus *Fbr. M.* 142, 143, *MM.* 13

cellaris *Fbr. M.* 131

chrysomelinus *Fbr. Panz. M.* 129

erythropterus *Panz. MM.* 159

humeralis *Schneid. M.* 136

lunulatus *Fabr. Panz. M.* 148

marginatus *Fbr. Panz. M.* 127. *MM.* 20

marginellus *Fabr. M.* 137. 143

—— — *Panz. M.* 136. 143

maxillofus *Fabr. Panz. M.* 152

melanocephalus *Fabr. M.* 145

merdarius *Fbr. M.* 146



*minutus* Fabr. *M.* 126  
*pygmaeus* Fabr. Panz. *M.* 145. 129  
*rufipes* Fabr. Panz. *M.* 125. 139. *MM.* 16. 17. 23  
*rufus* auct. *M.* 151  
*subterraneus* Fabr. *M.* 135  
*suturalis* Panz. *M.* 144  
*testaceus* Fabr. *M.* 142  
*trimaculatus* Fabr. *M.* 145

*Oxytelus.*

*pulcher* M. *MM.* 187

*Paederus.*

*angustatus* auct. *M.* 64. *MM.* 150  
*bicolor* Oliv. *M.* 60  
*biguttatus* Oliv. *M.* 155  
*brunnipes* Fabr. *M.* 57  
*castaneus* M. *MM.* 104  
*dimidiatus* Panz. *M.* 40  
*elongatus* Fabr. Panz. Payk. *M.* 56  
*filiformis* Fabr. Payk. *M.* 54. 55. 57  
*fracticornis* Payk. *M.* 54  
*fulgidus* Panz. Fabr. *M.* 48  
*fulvipennis* Fabr. *MM.* 106. Panz. *M.* 44  
*impressus* Rossi *M.* 69  
*melanocephalus* Fabr. Panz. *MM.* 138. 141  
*orbiculatus* auct. *M.* 63. *MM.* 150  
*proboscideus* Oliv. *M.* 156  
*riparius* auct. *M.* 62  
*ruficollis* auct. *M.* 185  
*testaceus* Oliv. *M.* 44. *MM.* 138  
*tricolor* Fabr. *M.* 46

*Pinophilus* M. *MM.* 129.

*Silpha.*

*minuta* Fabr. *M.* 119

*Staphylinus.*

*aeneocephalus* Payk. *M.* 9  
*aeneus* De Geer, Rossi *M.* 17  
 — Fourcr. *M.* 18  
*affinis* Payk. *M.* 44. *MM.* 104. 138  
*alpinus* Fabr. Oliv. Payk. *M.* 188. 189  
*amoenus* Oliv. *MM.* 86

analis auct. *M.* 149  
 angustatus auct. *M.* 64. Payk. *MM.* 150  
 armatus Panz. *M.* 110  
 aterrimus *M.* *MM.* 94  
 atricapillus auct. *M.* 148. *MM.* 164  
 balteatus Fabr. Faun. Gr. *M.* 3  
 bicolor Fabr. *MM.* 95  
 biguttatus auct. *M.* 155. *MM.* 226  
 bimaculatus Schrank *M.* 145  
 bipunctatus Oliv. *M.* 94. *MM.* 172  
 bipustulatus Fabr. Panz. *M.* 37  
 ———— Rossi *M.* 38. 136  
 ———— Linn. *MM.* 172  
 ———— var. *M.* *MM.* 64  
 blattinus Schrank. *M.* 128  
 bombylius De Geer *M.* 160  
 Boleti auct. *M.* 83  
 brunneus Fabr. Payk. *M.* 114  
 brunnipes Fabr. Oliv. *MM.* 113  
 bupthalmus Rossi Schrank *M.* 156  
 canaliculatus auct. *M.* 69  
 caraboides Payk. *M.* 121  
 ———— Fabr. Linn. *M.* 122  
 carinatus Panz. *M.* 107  
 cellaris Payk. *M.* 131  
 chalconcephalus Fabr. *MM.* 113  
 chloropterus Creutz. Panz. *M.* 167  
 chrysocephalus Fourcr. Oliv. *M.* 13. *MM.* 123. 124  
 chrysomelinus auct. *M.* 129. Rossi *M.* 127. 128. 130  
 cicindeloides Schall *M.* 155  
 cinctus Payk. *M.* 35  
 clauicornis Panz. Rossi, Scopoli *M.* 156  
 ———— Fabr. *M.* 157  
 coerulescens Fourcr. *M.* 7  
 collaris Payk. Oliv. *M.* 72. *MM.* 164  
 concinnus *M.* *MM.* 84  
 contaminatus *M.* *MM.* 64  
 crassicollis *M.* *MM.* 112  
 crassicornis Fabr. *MM.* 152  
 crenatus Fabr. Payk. *M.* 114  
 cruentus Oliv. *M.* 25  
 cupreus Oliv. Rossi *M.* 9. *MM.* 113  
 cyaneus auct. *M.* 6

cyanipennis auct. *M.* 168. *MM.* 85. 86  
 depressus Oliv. Payk. *M.* 103. *MM.* 185  
 dilatatus Fabr. Payk. *MM.* 89  
 dispar Payk. *M.* 127. 128. 129. 130. 146  
 elegans Oliv. *M.* 46. *MM.* 104. 129  
 elongatus Fourcr. *M.* 45. Payk. Schrank *M.* 56. Linn.  
*MM.* 134  
 emarginatus Fabr. Payk. Oliv. *M.* 92. *MM.* 180. 181  
 erythrocephalus Fabr. Oliv. *MM.* 127  
 erythropterus auct. *M.* 10. 11. *MM.* 116  
 erythropus Payk. *MM.* 110  
 fasciatus Fuesl. *M.* 3  
 femoratus Fabr. *MM.* 123  
 flauescens Fabr. Linn. *M.* 70. 137. *MM.* 59  
 flauopterus Fourcr. Oliv. *MM.* 75  
 floralis auct. *M.* 118.  
 fossor auct. *M.* 10.  
 fragilis *M.* *MM.* 61  
 fulgens Fabr. *MM.* 92  
 fulgidus Oliv. *M.* 48  
 ——— Fabr. Payk. *MM.* 106 } *MM.* 45  
 fulvipes Fabr. Panz. *M.* 25. 44. *MM.* 75  
 fulvopterus Fourcr. *M.* 33. *MM.* 46  
 fuscipes auct. *M.* 93. Sturm *M.* 139. Panz. *M.* 141.  
*MM.* 170  
 glaberrimus Payk. *M.* 54  
 globulifer Fourcr. *M.* 5  
 gracilis Payk. *MM.* 142  
 gregarius Scopoli *M.* 62  
 haemorrhoidalis Fbr. Oliv. *MM.* 110  
 hirtus auct. *M.* 160. *MM.* 125  
 impressus Panz. *M.* 35. Oliv. *M.* 73  
 laminatus auct. *M.* 17  
 limbatus Payk. *M.* 70  
 linearis Oliv. *M.* 44. Fabr. *MM.* 98  
 littoreus Linn. Payk. *M.* 145. 146  
 longiceps *M.* *MM.* 98  
 lucidus *M.* *MM.* 82  
 lunulatus Linn. Payk. *M.* 148  
 maior niger De Geer *M.* 4  
 marginalis Schrank. *M.* 136  
 marginatus auct. *M.* 24. Fourcr. *M.* 138  
 maxillofus auct. *M.* 3

melano-

melanocephalus Payk. *M.* 145., 146. Oliv. *MM.* 207  
 melanurus Schrank *M.* 99  
 merdarius Oliv. *M.* 149  
 minor niger De Geer *M.* 5  
 minutus Oliv. *MM.* 186  
 Morio *M.* *MM.* 111  
 moritans Payk. *M.* 109  
 murinus auct. *M.* 15  
 nanus Payk. *M.* 99  
 nebulosus auct. *M.* 14. Fourcr. *M.* 3  
 nigricollis Payk. *M.* 85  
 nigrofulvus Fourcr. *M.* 151  
 nitens Schrank *M.* 5  
 nitidulus Fabr. Oliv. *M.* 126  
 nitidus auct. *M.* 33. Panz. *M.* 46  
 — var. 6, 8, 13 *MM.* 40, 54, 55  
 obscurus Payk. *M.* 123.  
 obtusus Fbr. Schrank, Rossi *M.* 130  
 oculatus Fbr. Oliv. *MM.* 127. Götze *M.* 155  
 olens auct. *M.* 4  
 ophthalmicus Scopoli *M.* 7  
 orbiculatus Payk. *M.* 63  
 pallidipennis Panz. *M.* 109  
 piceus auct. *M.* 106. Schrank *M.* 103  
 picipennis Payk. *M.* 33  
 plagiatus Fabr. Payk. *M.* 123. 189  
 planus Payk. *M.* 112  
 politus auct. *M.* 18. Linn. *M.* 20. Panz. *M.* 21  
 pubescens auct. *M.* 13. Payk. *M.* 131., *MM.* 123., 124  
 punctato-striatus Payk. *M.* 147  
 punctatus Fourcr. *M.* 57  
 punctulatus Fabr. Payk. *MM.* 99  
 quadratus Payk. *M.* 57. *MM.* 131  
 riparius auct. *M.* 62  
 rivularis auct. *M.* 117  
 ruficollis Payk. *M.* 185  
 rufipes auct. *M.* 138. Payk. *M.* 137. 143  
 rufus auct. *M.* 141  
 rugosus Fbr. *MM.* 208. Oliv. *M.* 116. Schrank *M.* 106  
 saxatilis Rossi *M.* 33  
 similis auct. *M.* 15. *MM.* 111. 112  
 socialis Payk. Oliv. *M.* 83. *MM.* 157  
 fordidus *M.* *MM.* 82

*spinipes* Pontopp. *M.* 138  
*splendens* auct. *M.* 16  
*stercorarius* Oliv. *M.* 12  
*striatus* Oliv. *M.* 147  
*strumosus* Fabr. Payk. *M.* 92. *MM.* 182  
*subterraneus* auct. *M.* 135  
*fulcatus* Oliv. Payk. *M.* 74. Fourcr. *M.* 107  
*tectus* Payk. *M.* 123  
*tenuis* Fabr. *M.* 40  
*teffellatus* Fourcr. *MM.* 121  
*testaceus* Payk. *MM.* 60  
*thoracicus* Fourcr. *MM.* 143  
*tricolor* Payk. *M.* 46. *MM.* 104  
*tricornis* Payk. Oliv. *M.* 110  
*trilobus* Oliv. *M.* 109  
*trimaculatus* Payk. *M.* 145  
*tristis* Fabr. *M.* 34. *MM.* 49  
*Ulmii* Rossi, Oliv. *M.* 200  
*ulmineus* Fabr. *MM.* 47  
*varians* auct. *M.* 20. Payk. *M.* 37  
*viduatus* Fabr. *MM.* 123  
*violaceus* Oliv. *MM.* 92

*Stenus.*

*binotatus* Ljungh *MM.* 230  
*bipustulatus* Ljungh *MM.* 225  
*buphthalmus* Ljungh *MM.* 229  
*Juno* Payk. *M.* 154, 155. Ljungh *MM.* 227  
*rotundatus* Ljungh *MM.* 234  
*similis* Ljungh *MM.* 229

*Tachinus.*


Fam. I. *M.* *MM.* 1  
 Fam. II. *M.* *MM.* 22  
*castaneus* *M.* *MM.* 15  
*sordidus* *M.* *MM.* 15

*Tachyporus.*

Fam. I. *M.* *MM.* 22  
 Fam. II. *M.* *MM.* 1  
*marginatus* *M.* *MM.* 13


---











JUL -- 1987

